

## INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

### Mucomyst brusetabletter 200 mg

acetylcystein

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk).

#### **Oversigt over indlægssedlen**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucomyst
3. Sådan skal du tage Mucomyst
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

#### **1. Virkning og anvendelse**

Mucomyst er et slimløsende middel, som bruges ved hoste med sejt slim. Mucomyst er til voksne og børn over 5 år.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Mucomyst for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

#### **2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucomyst**

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

#### **Tag ikke Mucomyst**

- hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mucomyst (angivet i afsnit 6)
- hvis du for nylig har hostet blod op.

#### **Advarsler og forsigtighedsregler**

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mucomyst.

### **Brug til børn**

Du må ikke bruge Mucomyst til børn under 5 år uden lægens anvisning.

### **Vær ekstra forsigtig med at tage Mucomyst**

- hvis du har astma eller tidligere har haft sammentrækninger i luftvejene (bronkospasmer)
- hvis du har eller har haft mavesår.

### **Brug af anden medicin sammen med Mucomyst**

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, bør du kontakte din læge.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

### **Brug af Mucomyst sammen med mad og drikke**

Du kan tage Mucomyst sammen med mad og drikke.

### **Graviditet og amning**

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

#### *Graviditet*

Du må kun tage Mucomyst efter lægens anvisning.

#### *Amning*

Erfaringer med Mucomyst savnes. Der er ingen information om udskillelse af acetylcystein i modermælk. Spørg lægen.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Mucomyst påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

### **Mucomyst indeholder natrium og lactose**

Dette lægemiddel indeholder 99,26 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. tablet. Dette svarer til 5 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

### **3. Sådan skal du tage Mucomyst**

Tag altid Mucomyst nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg apotekspersonalet.

### **Den anbefalede dosis er:**

**Voksne:** 1 brusetablet 3 gange daglig.

### **Brug til børn og unge**

**Børn over 5 år:** 1 brusetablet 2 gange daglig.

Du må kun bruge Mucomyst til børn under 5 år efter aftale med en læge.

### **Brugsanvisning**

Du skal opløse brusetabletten i et ½ glas vand. Tag ikke Mucomyst sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende slim, som skal hostes op. Det kan forstyrre nattesøvn.

### **Hvis du har taget for mange Mucomyst brusetabletter**

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Mucomyst brusetabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning.

### **Hvis du har glemt at tage Mucomyst**

Hvis du har glemt en dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men fortsætte med din sædvanlige dosering.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

## **4. Bivirkninger**

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

### **Alvorlige bivirkninger**

**Ikke almindelige bivirkninger** (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Bronchospasme (kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød).

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

**Sjældne bivirkninger** (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Angioødem (udslæt, nældefeber og hævelser). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

### **Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:**

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner, hvor der har været symptomer i huden, vejrtrækningsbesvær, alvorlig åndenød og blodtryksfald.

### **Ikke alvorlige bivirkninger**

**Meget almindelige bivirkninger** (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Kvalme, diarré.

**Ikke almindelige bivirkninger** (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Mavesmerter.

**Sjældne bivirkninger** (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede: Udslæt, kløe, nældefeber.

#### Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk), ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på [dkma@dkma.dk](mailto:dkma@dkma.dk) eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## 5. Opbevaring

Opbevar Mucomyst utilgængeligt for børn. Opbevar Mucomyst i original emballage, tæt tillukket, da lægemidlet ikke tåler fugt.

Brug ikke Mucomyst efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

### **Mucomyst indeholder:**

- **Aktivt stof:** acetylcystein.
- **Øvrige indholdsstoffer:** citronsyre vandfri, natriumhydrogencarbonat, saccharinnatrium (E 954), natriumcarbonat vandfri, lactose vandfri, mannitol, citronessens, natriumcitrat, dihydrat, natriumcyclamat (E 952).

### **Udseende**

Mucomyst er en rund, hvid brusetablet. Tabletten har ingen prægning.

### **Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

Meda AS  
Solvang 8  
3450 Allerød  
Mail: [info@meda.dk](mailto:info@meda.dk)  
Tlf. 4452 8888

### **Fremstiller**

Hermes Arzneimittel GmbH  
Hans-Urmiller-Ring 52  
82515 Wolfratshausen  
Tyskland

**Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018.**