

Indlægsseddel: Information til brugeren

Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

2,4- dichlorbenzylalkohol 1,2 mg/ Amylmetakresol 0,6 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger som lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils Citrus Sukkerfri
3. Sådan skal du bruge Strepsils Citrus Sukkerfri
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1. Virkning og anvendelse

Strepsils Citrus Sukkerfri sugetabletter virker smertelindrende og har bakteriedræbende effekt. Strepsils Citrus Sukkerfri anvendes mod øm og irriteret hals til voksne og børn over 6 år.

Lægen kan have givet dig Strepsils Citrus Sukkerfri for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils Citrus Sukkerfri

Brug ikke Strepsils Citrus Sukkerfri

hvis du er allergisk over for 2,4-dichlorbenzylalkohol og/eller amylmetakresol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Strepsils Citrus Sukkerfri, hvis lægen har fortalt dig, at du lider af intolerance over for nogle sukkerarter. Produktet kan have en mild afførende effekt. Kalorieindhold: 2,3 kcal/g maltitol (eller isomaltitol)

Brug af anden medicin sammen med Strepsils Citrus Sukkerfri

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge Strepsils Citrus Sukkerfri under graviditet. Som med al medicin skal man være forsigtig med at tage dette produkt under graviditet, og søge medicinsk rådgivning om nødvendigt.

Der findes ingen eller begrænset mængde data om, hvorvidt Strepsils Citrus Sukkerfri kan anvendes af gravide.

Amning

Du kan bruge Strepsils Citrus Sukkerfri, selvom du ammer. Det vides ikke om 2,4-dichlorbenzylalkohol, amylmetakresol eller nedbrydningsstoffer heraf udskilles i modermælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Fertilitet

Der findes ingen tilgængelige data om, hvorvidt Strepsils Citrus Sukkerfri påvirker fertiliteten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Strepsils Citrus Sukkerfri påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Strepsils Citrus Sukkerfri indeholder maltitol, flydende og isomalt, hvor advarsel er påkrævet.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Maltitol, flydende og isomalt kan have en mild afførende effekt. Kalorieindhold: 2,3 kcal/g maltitol (eller isomaltitol)

Strepsils Citrus Sukkerfri indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. sugetablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

Strepsils Citrus Sukkerfri indeholder benzylalkohol, citral, citronellol, d-limonen, geraniol og linalool

Dette lægemiddel indeholder duftstof med benzylalkohol, citral, citronellol, d-limonen, geraniol og linalool. Benzylalkohol, citral, citronellol, d-limonen, geraniol og linalool kan medføre allergiske reaktioner.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

3. Sådan skal du bruge Strepsils Citrus Sukkerfri

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Til anvendelse i mundhulen. Strepsils Citrus Sukkerfri skal opløses langsomt i munden.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 sugetablet hver 2.-3. time. Tag ikke flere end 12 sugetabletter i en 24 timers periode. Den laveste effektive dosis bør bruges i kortest mulig tid.

Brug til børn

Børn over 6 år:

Som ovenfor til voksne.

Børn 6-11 år:

Lægemidlet bør administreres under en voksens opsyn.

Børn under 6 år:

Bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre.

Hvis du har brugt for mange Strepsils Citrus Sukkerfri

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Strepsils Citrus Sukkerfri end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Ved overdosering er der risiko for at få ondt i maven

Hvis du har glempt at bruge Strepsils Citrus Sukkerfri

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er overfølsomhedsreaktioner. Irritation af slimhinden kan udvikles ved længere tids brug.

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

- Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme i form af udslæt, nældefeber og hævelser, akut vejrtrækningsbesvær og for lavt blodtryk med besvimelsesanfald. Prikkende eller brændende fornemmelse eller hævelser i mundhule eller svælg. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. En smertefuld tunge kan forekomme. Ubehag/gener i munden samt halsirritation og føleforstyrrelse i munden. Udslæt.

Meget sjældne bivirkninger: Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

- Kvalme samt sure opstød / halsbrand

Ikke kendt hyppighed (kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data)

- Mavesmerter

Hyppighed, type og sværhedsgrad af bivirkninger forventes at være den samme for børn over 6 år, som for voksne

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Strepsils Citrus Sukkerfri utilgængeligt for børn.

Opbevar Strepsils Citrus Sukkerfri i original emballage.

Opbevar ikke Strepsils Citrus Sukkerfri ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Strepsils Citrus Sukkerfri efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter indeholder: Aktive stoffer: 2,4-dichlorbenzylalkohol og amylmetakresol. Øvrige indholdsstoffer: Isomalt (E953), maltitol, flydende (E965), vinsyre (E334), citronaroma, saccharinnatrium (E954)

Udseende og pakningsstørrelser

Strepsils Citrus Sukkerfri er en hvid til lysegul, rund sugetablet, med et S trykt på hver side af sugetabletten.

Strepsils Citrus Sukkerfri findes i blisterpakninger med 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48 og 72 sugetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Tel.: 4444 9701

Fremstiller

RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,
Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol,
Nederlandene

Denne indlægsseddel blev sidst ændret marts 2021