

Indlægsseddel: Information til brugeren

Apovit® B-combin stærk, filmovertrukne tabletter

calciumpantothenat, nicotinamid, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin og thiaminhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller de anvisninger som lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
- Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Apovit B-combin stærk
3. Sådan skal du tage Apovit B-combin stærk
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Apovit B-combin stærk er et B-vitaminprodukt til forebyggelse og behandling af B-vitaminmangel.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Apovit B-combin stærk

Tag ikke Apovit B-combin stærk, hvis du

- er allergisk over for calciumpantothenat, nicotinamid, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin og thiaminhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
- har en leversygdom
- har mavesår

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Apovit B-combin stærk.

Apovit B-combin stærk skal anvendes med forsigtighed, hvis du:

- har sukkersyge
- har galdevejslidelser
- har urinsur gigt
- tidligere har haft gulsot, en leversygdom eller mavesår

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Apovit B-combin stærk.

Vær opmærksom på at Apovit B-combin stærk kan misfarve urinen.

Alkohol kan hæmme optagelsen af B₁-vitamin (thiamin).

Brug af anden medicin sammen med Apovit B-combin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin mod sukkersyge (i tabletform)
- medicin for Parkinsons syge (levodopa)
- medicin mod kræft (cisplatin)

Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte behandling.

Brug af Apovit B-combin sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Apovit B-combin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Alkohol kan hæmme optagelsen af B₁-vitamin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må gerne tage Apovit B-combin stærk i de anbefalede mængder.

Amning

Du må gerne tage Apovit B-combin stærk. Nedsat mælkeproduktion kan forekomme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Apovit B-combin stærk påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Apovit B-combin stærk indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Apovit B-combin stærk

Tag altid Apovit B-combin stærk nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 – 3 tabletter daglig. Drik et glas vand til.

Brug til børn

Apovit B-combin stærk bør ikke anvendes til børn under 2 år.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Kontakt lægen.

Hvis du har taget for mange Apovit B-combin stærk

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Apovit B-combin stærk, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tegn på overdosering kan være føleforstyrrelser, røde prikker på huden, kvalme, opkastninger og diaré, forandringer i øjets nethinde og/eller skade på leveren.

Hvis du har glemt at tage Apovit B-combin stærk

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 1.000 behandlede):

Påvirkning af følesans på hænder og fødder, kvalme, forværring af mavesår.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 10.000 behandlede):

Hovedpine, mavepine, diaré, svimmelhed, søvnløshed, kraftsløshed, irritabilitet, sløret syn, lysfølsomhed, forværring af uren hud, udslæt og rødmen, brystspænding og brystforstørrelse, påvirkning af mælkeproduktion ved amning. Forhøjet glukose i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S,

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Apovit B-combin stærk utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Apovit B-combin stærk indeholder

De aktive stoffer er calciumpantothenat, nicotinamid, pyridoxinhydrochlorid (vitamin B₆), riboflavin (vitamin B₂) og thiaminhydrochlorid (vitamin B₁). De øvrige indholdsstoffer er hypromellose (E 464), lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), propylenglycol (E1520), riboflavin (E101) og talcum (E 553b).

Farvestof: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Apovit B-combin stærk er en rund, buet, gul tablet.

Apovit B-combin findes i pakningsstørrelser à 100 og 250 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S

Delta Park 45

2665 Vallensbæk Strand

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o.

12 Księstwa Łowickiego ST.

99-420 Łyszkowice

Polen

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2020