

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vivag® plus, hårde vaginalkapsler

Mælkesyre bakterier: Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus

Vivag® plus er et naturlægemiddel.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 8 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Vivag® plus
3. Sådan skal du bruge Vivag® plus
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Vivag® plus er et naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af kløe, svie, tørhedsfølelse, lugt og/eller let øget udflåd pga. ubalance i den normale bakterieflora i skeden. Vivag® plus tilføjer skeden levende mælkesyrebakterier, som formerer sig naturligt og øger surhedsgraden, dvs. sænker pH-værdien i skeden. Hermed begrænses vækstmulighederne for uønskede bakterier, hvilket er vigtigt for at forebygge og genoprette en ubalance i den naturlige bakterieflora i skeden. De anvendte bakteriestammer er naturligt forekommende i skeden. Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Vivag® plus for noget andet, så skal du altid følge lægens anvisning. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 8 dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Vivag® plus

Brug ikke Vivag® plus:

- hvis du er allergisk over for mælkesyrebakterier eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vivag® plus angivet i punkt 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Vivag® plus.

Hvis symptomerne ikke forsvinder inden for 1 uge og hvis symptomerne forværres, anbefales kontakt til egen læge.

Børn

Bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Vivag® plus

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Vivag[®] plus sammen med andre lægemidler eller naturlægemidler.

Brug af Vivag[®] plus sammen med mad og drikke

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Vivag[®] plus sammen med nogen former for mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger Vivag[®] plus.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vivag[®] plus påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Vivag[®] plus

Brug altid Vivag[®] plus nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne

Behandling: 1 vaginalkapsel hver aften inden sengetid i 6-8 dage.

Forebyggende (umiddelbart efter menstruation): 1 vaginalkapsel hver aften inden sengetid i 4-6 dage.

Efter antibiotikabehandling: 1 vaginalkapsel hver aften inden sengetid i 6-8 dage.

Vask altid hænderne omhyggeligt inden kapslen indføres i skeden. Kapslen føres med en finger så langt op i skeden som muligt.

Brug til børn

Vivag[®] plus bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Hvis du har brugt for mange Vivag[®] plus

Kontakt læge, skadestue eller apotek, hvis du har taget flere Vivag[®] plus, end der står her, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Vivag[®] plus

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Vivag[®] plus

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der er ikke kendskab til bivirkninger inden for den godkendte anvendelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Vivag® plus utilgængeligt for børn.
Brug ikke Vivag® plus efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Brug ikke Vivag® plus hvis der er synlige tegn på nedbrydning.
Må ikke opbevares over 25° C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1 Vivag® plus vaginalkapsel indeholder:

- Aktive bestanddele:

Lactobacillus gasseri:

Mindst 10⁸ levende mælkesyrebakterier pr. kapsel.

Lactobacillus rhamnosus:

Mindst 10⁸ levende mælkesyrebakterier pr. kapsel.

- Øvrige indholdsstoffer:

Lactitolmonohydrat, majsstivelse, gelatine, xanthangummi, glucose (vandfri), magnesiumstearat, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Hårde hvide gelatinekapsler med hvidt pulver.

Pakningsstørrelse: 10 stk. vaginalkapsler i aluminiumsrør med tørremiddel i låg.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Axellus A/S
Industrigrenen 10
2635 Ishøj

Fremstiller

Orkla Care A/S
Vassingerødvej 3-7
3504 Lyngby

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2017