

Indlægsseddel: Information til patienten

Emadine® 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder. emedastin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Emadine
3. Sådan skal du bruge Emadine
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Emadine er et lægemiddel til behandling af sæsonbetinget øjenallergi (allergisk konjunktivitis). Det virker ved at nedsætte den allergiske reaktions styrke.

Øjenallergi. Visse partikler (allergener) som pollen, husstøv eller dyrehår kan være årsag til allergiske reaktioner, som medfører kløe, rødme og hævelse af øjenomgivelserne. Kontakt lægen, hvis du ikke får det bedre, eller hvis du får det værre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Emadine

Brug ikke Emadine

- **hvis du er allergisk** overfor emedastin eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i afsnit 6.

Spørg din læge til råds.

Advarsler og forsigtighedsregler

- **Brug ikke Emadine til børn under 3 år.**
- **Emadine anbefales ikke** til patienter over 65 år, da der ikke er udført kliniske studier på denne aldersgruppe.
- **Emadine** kan ikke anbefales til patienter med nyre- eller leverproblemer.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Emadine.

Brug af anden medicin sammen med Emadine.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du bruger andre øjendråber samtidig med, at du bruger Emadine, skal du følge vejledningen, der er anført sidst i afsnit 3 ”Sådan skal du bruge Emadine”.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dit syn kan blive kortvarigt sløret efter at du har brugt Emadine. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, før dit syn er klart igen.

3. Sådan skal du bruge Emadine

Brug altid Emadine nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis til voksne og børn over 3 år er: **en dråbe i øjet to gange om dagen.**


Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brug kun Emadine i øjnene.


Se modsatte side for yderligere information.

Vend>


3. Sådan skal du bruge Emadine (fortsat)



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Den anbefalede dosis

< se side 1.

Brug ikke en enkelt-dosis beholder du allerede har åbnet. Brug heller ikke nogen af de ubrugte enkelt-dosis beholdere fra en foliepose, som blev åbnet for mere end en uge siden.

- Åbn en foliepose og tag en række med 5 enkelt-dosis beholdere.
- **Brug ikke opløsningen hvis den er grumset eller uklar.**
- Hold rækken i den øverste del af den lange, flade ende og adskil en enkelt-dosis beholder ved at trække den mod dig selv, mens du holder fast i de andre. Enkelt-dosis beholderen skal ”knækkes” fri fra de andre (figur 1).
- Behold enkelt-dosis beholderen og put resten tilbage i folieposen.
- Sørg for at du har et spejl tilgængeligt og vask dine hænder.
- Hold beholderens lange, flade ende mellem din tommel- og pegefinger og åbn den ved at dreje den anden ende af (figur 2).

- Læn hovedet tilbage. Træk dit øjenlåg ned med en ren finger, indtil der dannes en lomme mellem øjenlåget og dit øje. Dråben skal placeres her.
- Hold beholderen mellem din tommelfinger og andre fingre mens den åbne ende peger nedad.
- Placer enkelt dosisbeholderens spids tæt på øjet. Brug et spejl hvis det hjælper.
- **Enkelt dosisbeholderens spids må ikke berøre øjet, øjenlåget, det omgivende område eller andre overflader.** Det kan forurene øjendråberne.
- Tryk forsigtigt på enkelt dosisbeholderen så én dråbe frigøres i lommen mellem øjenlåget og øjet (se figur 3).
- **Hvis din læge har bedt dig bruge dråberne i begge øjne,** gentages proceduren for det andet øje med den samme enkelt dosisbeholder.
- **Smid enkelt dosisbeholderen med eventuelle rester væk med det samme.**
- **Smid ubrugte enkelt dosisbeholdere væk én uge efter at folieposen er åbnet selv om enkelt dosisbeholderne stadigvæk er forseglede.**

Hvis du ved et uheld sluger eller indsprøjter Emadine skal du omgående kontakte din læge. Der kan være risiko for forstyrret hjerterytme.

Hvis dråben ikke rammer øjet må du prøve igen.

Hvis du får dryppet for meget i dine øjne, skyl det da ud, helst med sterilt saltvand eller, hvis dette ikke er tilgængeligt, med varmt vand. Dryp ikke flere dråber i øjet før næste planlagte dosis.

Hvis du har glemt at bruge Emadine, tag den ordinerede dosis så hurtigt som muligt og fortsæt herefter med den normale dosis. **Du må ikke tage en dobbeltdosis** som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du anvender andre øjendråber, så vent mindst 10 minutter mellem drypning med Emadine og de andre øjendråber. Øjensalve skal bruges til sidst.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Med mindre bivirkningerne er alvorlige, kan man fortsætte med at bruge dråberne. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget du føler dig usikker på.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 10 brugere)

- Reaktionen i øjet: øjensmerter, kløe i øjet, røde øjne

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 100 brugere)

- Reaktionen i øjet: hornhindelidelse, unormal følelse i øjet, øget tåreproduktion, trætte øjne, øjenirritation, sløret syn, farvning af hornhinden, tørre øjne.
- Generelle bivirkninger: hovedpine, søvnbesvær, sinushovedpine, dårlig smag i munden, udslæt

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

- Generelle bivirkninger: øget hjerterytme (puls)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Emadine efter den udløbsdato, der står på flasken og kartonen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Kassér enkelt dosisbeholderen umiddelbart efter brug

Kassér de ikke anvendte enkelt dosisbeholdere 7 dage efter åbning af folieposen

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

5. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Emadine indeholder

- Aktivt stof: emadastin 0,5 mg/ml som difumarat.
- Øvrige indholdsstoffer: trometamol, natriumchlorid, hypromellose, rensset vand. Små mængder saltsyre og/eller natriumhydroxid kan være tilsat for at justere pH

Udseende og pakningsstørrelser

Emadine er en væske (opløsning), der fås i enkelt dosisbeholdere af plastik indeholdende 0,35 ml. 5 enkelt dosisbeholdere leveres i en foliepose. Emadine fås i pakninger med 30 eller 60 stk. Begge pakningsstørrelser markedsføres ikke nødvendigvis i alle lande.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irland

Fremstiller

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rijksweg 14,
B-2870 Puurs,
Belgien

Hvis du vil ønske yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Danmark

Novartis Healthcare A/S
Tlf: +45 39 16 84 00

Ísland

Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Norge

Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2018

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside [http: www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu)