

## INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

### Elocon® 1mg/g salve mometasonfuroat

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Elocon til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

#### Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Elocon
3. Sådan skal du bruge Elocon
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

#### 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Elocon indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
- Elocon dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.
- Du kan bruge Elocon til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.
- Lægen kan have givet dig Elocon for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

#### 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ELOCON

##### Brug ikke Elocon

- Hvis du er allergisk over for det mometasonfuroat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Elocon salve (angivet i pkt. 6).
- Hvis du har betændelse i huden, som skyldes parasit- og svampeinfektion (f.eks. candida eller dermatofyter), bakterie infektion (f.eks. børnesår eller en hudlidelse med dannelse af pus i huden)
- Hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næse, kinder, hage og pande (rosacea).
- Hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- Hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus f.eks. forkølelsessår, skoldkopper, vorter, kønsvorter eller en sjælden hudsygdom med gullige hårde svulster.
- Hvis du har turberkulose eller syfilis.
- På bumser eller områder med bumser.
- På tynd hud, der let går i stykker/skør hud.
- På sår eller hud fyldt med sår.
- På friktionsudslæt.
- På hudreaktion efter vaccination.
- På kløe ved endetarmen eller på kønsdele.
- Til børn under 1 år med hudlidelser, f.eks. eksem eller bleeksem.

##### Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Elocon.

**Vær ekstra forsigtig med at bruge Elocon**

Vær opmærksom på følgende:

- Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
- Du bør ikke bruge Elocon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, hvor brugen skal begrænses til 5 dage ad gangen, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- Elocon skal anvendes med forsigtighed til børn fra 2 år og ikke længere end 3 uger, uden aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Elocon anbefales ikke til børn under 2 år.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
- Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- Du bør ikke bruge Elocon rundt om øjnene eller på øjenlågene, pga. meget sjælden risiko for synstab eller grå stær.
- Undgå at få Elocon i øjnene.
- Hvis du har brugt Elocon i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Elocon i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Elocon creme, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Elocon salve.
- Elocon anbefales ikke til behandling af psoriasis pga. mulighed for forværrelse af sygdom, udvikling af tolerance, risiko for udvikling af en bestemt type psoriasis, med pushholdige blærer, samt mulighed for allergi.

### **Brug af anden medicin sammen med Elocon**

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Elocon sammen med anden medicin.

### **Graviditet og amning**

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

#### ***Graviditet:***

Hvis du er gravid, må du kun bruge Elocon efter aftale med lægen.

#### ***Amning:***

Hvis du ammer, må du kun bruge Elocon efter aftale med lægen.

Du bør ikke bruge Elocon på brystet mens du ammer.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Elocon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

**Elocon salve indeholder propylenglycolmonopalmitostearat, der kan give irritation af huden.**

## **3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ELOCON**

### **Den sædvanlige dosis er**

Voksne: Påsmør et tyndt lag 1 gang dagligt.

Salven bruges på meget tør, skællt og sprukket hud.

**Børn:** Du må kun bruge Elocon til børn efter aftale med en læge.

Når du har fået den ønskede virkning af Elocon, bør du gradvist trappe ud af behandlingen efter vejledning fra din læge.

Vask hænder efter påsmøring, medmindre du skal behandle hænderne. Du kan eventuelt bruge handsker til påsmøring.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.  
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

### **Hvis du har brugt for meget Elocon**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Elocon, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet.

Tak pakningen med.

I sjældne tilfælde efter langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger (se pkt. 4 Bivirkninger).

### **Hvis du har glemt at bruge Elocon**

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Smør et tyndt lag Elocon på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.

## **4. BIVIRKNINGER**

Elocon salve kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kommer især, hvis du bruger lufttæt forbindelse og ved lang tids behandling.

### **Alvorlige bivirkninger ved brug af Elocon**

**Sjældne bivirkninger** (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

- Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.

### **Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt**

- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadecomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

### **Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Elocon**

**Ikke almindelige bivirkninger** (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

- Betændelse i det behandlede område.
- Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker.
- Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme på næse, kinder, pande og hage (steroid-rosacea).
- Små, punktformede eller større blødninger i huden.

**Sjældne bivirkninger** (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

- Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
- Overfølsomhed (mometasonfuroat).

**Meget sjældne bivirkninger** (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

- Betændelse i hårsækkene.
- Brændende følelse.
- Kløe.

### **Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt**

- Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden og bylder.
- Udvidelse af de små blodkar i huden.
- Rødme.
- Udslæt med bumser.
- Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelseløshed i huden.
- Smerte eller reaktion fra det behandlede område.
- Kontakteksem.
- Nedsat pigment i huden.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

### **Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen**

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med en læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk), eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## **5. OPBEVARING**

Opbevar Elocon utilgængeligt for børn.

Brug ikke Elocon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## **6. PAKNINGSTØRRELSER OG YDERLIGERE INFORMATION**

### **Elocon salve 1mg/g indeholder:**

Det aktive stof i Elocon salve er mometasonfuroat 1 mg/g.

De øvrige indholdsstoffer er: Hvid blød paraffin; hexylenglycol; propylenglycolmonopalmitostearat; koncentreret phosphorsyre; rensat vand; hvid bivoks.

### **Udseende og pakningsstørrelser**

#### **Udseende**

Elocon salve er en hvid/råhvid, ugenomsigtig salve.

#### **Pakningsstørrelser**

Tuber a 20 g, 30 g, 50 g og 100 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### **Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

#### **Indehaver af markedsføringstilladelsen**

Merck Sharp & Dohme B.V., Box 581, 2003 PC Haarlem, Holland

**Fremstiller**

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgien

**Repræsentant i Danmark**

MSD Danmark ApS, Lautrupbjerg 4, 2750 Ballerup, tlf. 4482 4000, dkmail@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2013