

Terbinatin Nordic Drugs

TERBINAFIN NORDIC DRUGS 250 mg TABLETTER

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen.

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Terbinatin Nordic Drugs til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse

- Virkning og anvendelse
- Vigtig information, som du skal læse, før du tager Terbinatin Nordic Drugs
- Sådan skal du tage Terbinatin Nordic Drugs
- Bivirkninger
- Opbevaring
- Yderligere information

Terbinatin Nordic Drugs indeholder

Det virksomme indholdsstof i Terbinatin Nordic Drugs er: Terbinatinhydrochlorid svarende til terbinatin 250 mg.

De øvrige indholdsstoffer er: magnesiumstearat, vandfri kolloid silica, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose og croscarmelloseatrium.

Markedsføring i Danmark:

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn, Sverige

Fremstiller:

Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd., 6 Riverview Rd, Beverley, HU17 0LD, Storbritannien

Repræsentant i Danmark:

Nordic Drugs Danmark, Halmtovet 29, 1700 København V

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Udseende

Terbinatin Nordic Drugs 250 mg tabletter er runde, hvide, flade tabletter med skrå kant, præget med "R250" på den ene side og med kærv på den anden side.

Virkemåde

Terbinatin Nordic Drugs er et svampemiddel.

Medicinen anvendes til

Behandling af svampeinfektioner i hud og negle, som skyldes terbinatinfølsomme svampe.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION, SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU TAGER TERBINAFIN NORDIC DRUGS

Tag ikke Terbinatin Nordic Drugs hvis

- Du er overfølsom over for terbinatin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Terbinatin Nordic Drugs
- Du har meget nedsat nyrefunktion
- Du har meget nedsat leverfunktion

Særlige forholdsregler

Hvis du har eller har haft en leversygdom, bør du rådføre dig med din læge inden behandling med Terbinatin Nordic Drugs.

Hvis du har psoriasis, bør du rådføre dig med din læge inden behandling med Terbinatin Nordic Drugs.

Hvis du får feber eller ondt i halsen under behandlingen, bør du kontakte lægen. Det kan være nødvendigt at afbryde behandlingen med Terbinatin Nordic Drugs.

Hvis du får hudkløe, vedvarende kvalme, appetitløshed, træthed, gulsot, opkastninger, udmattelse, mavesmerter, mørkfarvet urin eller lys afføring, skal du kontakte lægen. Det kan være nødvendigt at afbryde behandlingen med Terbinatin Nordic Drugs.

Brug af Terbinatin Nordic Drugs sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Terbinatin Nordic Drugs sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Terbinatin Nordic Drugs

Ingen relevante informationer.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Du må kun tage Terbinatin Nordic Drugs efter lægens anvisning.

Amning: Hvis du ammer, må du ikke tage Terbinatin Nordic Drugs, da Terbinatin Nordic Drugs udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Terbinatin Nordic Drugs kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Terbinatin Nordic Drugs, og/eller Terbinatin Nordic Drugs kan påvirke virkningen af andre lægemidler.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Det er specielt vigtigt, at lægen ved, om du får medicin mod:

- Depression eller andre psykiske sygdomme
- Før højt blodtryk eller problemer med hjertet
- Mavesår (hvis medicinen indeholder cimetidin)
- Infektioner (hvis medicinen indeholder rifampicin)

Hvis du bruger p-piller, kan du få menstruationsforstyrrelser (gennembrudsblødning, uregelmæssig menstruationscyklus).

3. SÅDAN SKAL DU TAGER TERBINAFIN NORDIC DRUGS

Dosering

Tabletterne må ikke deles, med mindre hele dosis tages. Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1 ½ dl).

Voksne: 250 mg én gang dagligt.

Ældre: Samme dosis som angivet under "Voksne".

Børn: Det anbefales ikke at anvende Terbinatin Nordic Drugs til børn og unge.

Nedsat nyrefunktion: Det er her nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisning.

Hudinfektioner

Normal behandlingstid:

Svampeinfektion på fødder	2-6 uger
Svampeinfektion i lysken	2-4 uger
Ringorm på mave, bryst eller ryg	2-4 uger

1513256

Negleinfektioner

Behandlingstiden plejer at være 6-12 uger, men for nogle patienter kan behandlingen strække sig over 6 måneder.

Der kan gå flere uger efter endt behandling, før symptomerne på svampeinfektion er helt forsvundet.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Terbinatin Nordic Drugs

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Terbinatin Nordic Drugs, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Har du glemt at tage Terbinatin Nordic Drugs

Glemmer du at tage en dosis, fortsættes med almindelig dosering. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Terbinatin Nordic Drugs kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Fordøjelsesbesvær (mæthedfølelse, nedsat appetit, kvalme, lettere mavesmerter, diarré)
- Udslæt, nældefeber
- Hovedpine
- Utilpashed, træthed
- Ledsmerter, muskelsmerter

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1,000 patienter):

- Tab af smagssans eller ændret smagssans, som normaliseres nogen tid efter endt behandling.
- Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10,000 patienter):*
- Følelse af myrekryben, brænden, kløe, soven og prikken i huden
- Nedsat følesans
- Svimmelhed
- Alvorlige allergiske reaktioner, væskeophobning
- Serum sygdoms lignende reaktion
- Nedsat leverfunktion (forhøjelse af enzym værdier, gulsot, galdeophobning i galde-gange, leverbetændelse).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10,000 patienter):

- Svimmelhed
- Påvirkning af blodets sammensætning
- Forværret psoriasis
- Forværring af psykiske lidelser som depression, angst
- Alvorlige hudreaktioner (Stevens-Johnson syndrom (feber og blæreformet udslæt), alvorlig afskalning af hudens øverste lag, overfølsomhed af huden for lys, hårtab)
- Menstruationsforstyrrelser

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. OPBEVARING

- Opbevar Terbinatin Nordic Drugs utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Terbinatin Nordic Drugs ved over 25°C.
- Plastbeholder: Opbevar Terbinatin Nordic Drugs i originalemballagen, da lægemidlet er lysfølsomt.
- Blisterpakning: Opbevar Terbinatin Nordic Drugs i den ydre karton, da lægemidlet er lysfølsomt.
- Anvend ikke Terbinatin Nordic Drugs efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Afløber altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret april 2006

1513256

NORDIC
DRUGS

TEMPLE Packaging Pvt. Ltd. Tel:- 28476601, Email:- temple@bom4.vsnl.net.in			
Proof No - 1 Date :- 03.07.2006			
Actual Size :- 140 x 280 mm			
Fold-1 :- 140 x 40 mm			
Substrate :- 60gsm Maplithopaper			
Colours :- Black			
Note - This approval will be considered for final printing. Please recheck for corrections indicated earlier, in this proof also.			
Prepared by :	Checked by :	Profile Checked :	Approved by :