

Imodium 0,2 mg/ml oral opløsning

(loperamidhydrochlorid)

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen.

- Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Læge har ordineret Imodium oral opløsning til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.
- Ønsker du mere information, så kontakt din læge eller apoteket.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Imodium oral opløsning.
3. Sådan skal du bruge Imodium oral opløsning.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE:

Lægemiddelform:

Oral opløsning. Imodium oral opløsning er en rød, klar og let tykflydende væske.

Lægemiddelgruppe / virkemåde:

Imodium oral opløsning virker mod diaré. Imodium gør, at føden kommer langsommere gennem tarmene. Dette øger optagelsen af vand fra tarmen, så afføringen bliver fastere og ikke så hyppig.

Hvad anvendes Imodium oral opløsning til ?



Imodium oral opløsning anvendes mod diaré.

Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION, SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU TAGER IMODIUM ORAL OPLØSNING.

Tag ikke Imodium oral opløsning hvis:



- Du er overfølsom overfor det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Imodium.
- Du har forstoppelse eller er oppustet.
- Du har perioder med voldsomme smerter i maven og evt. opkastninger.
- Du har blodig afføring eller feber.
- Du har kronisk betændelse i tyktarmen.

Særlige forholdsregler:



Du mister væske, når du har diaré. Du skal derfor drikke rigeligt vand, tilsat sukker og salte. Dette er især vigtigt for børn. Du kan købe en særlig sukker-salt blanding på apoteket. Hvis behandlingen med Imodium oral opløsning ikke har hjulpet på diaréen efter 48 timer, skal du standse behandlingen og kontakte lægen. Du skal også holde op med behandlingen, hvis du får forstoppelse.

Brug Imodium oral opløsning sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Imodium sammen med mad og drikke.

Vigtig information om hjælpestoffer / øvrige indholdsstoffer i Imodium oral opløsning

Imodium indeholder:

- Alkohol: Denne medicin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis.
- Ponceau 4R (E 124): Kan medføre allergiske reaktioner.
- Propyl- og methylparahydroxybenzoat henholdsvis E 216 og E 218: Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

Vigtig information om hjælpestoffer / øvrige indholdsstoffer i Imodium oral opløsning

Imodium indeholder lactose: Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning:



Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Imodium oral opløsning efter lægens anvisning.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Imodium. Imodium bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed



Imodium oral opløsning kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin



Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal først med lægen, hvis du er i behandling med:

- et kombinationspræparat til behandling af blærebetændelse (sulfathizol+trimethoprim).
 - Ritonavir (et lægemiddel mod HIV).
- Disse lægemidler kan nedsætte kroppens omsætning af det aktive stof i Imodium.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE IMODIUM ORAL OPLØSNING.



Dosering:



Børn:

Startdosis er 100 mikrogram pr kg, derefter 50 mikrogram pr kg efter hver løs afføring. Barnet må højst få 300 mikrogram pr kg dagligt.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.



Hvordan tager du Imodium oral opløsning?

Brugsanvisning:

1. Det børnesikrede låg skrues af ved at trykke skruelåget ned (1), holde det nede og dreje det mod uret (2).
2. Giv den orale opløsning i medfølgende doseringsbæger. 1 ml svarer til 0,2 mg loperamidhydrochlorid.
3. Låget skrues fast på flasken efter brug.



Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for meget Imodium oral opløsning?

Du skal kontakte lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Imodium, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for meget Imodium, kan du få et eller flere af følgende symptomer: Forstoppelse, nedsat urinudskillelse, besværet åndedræt, besvær med styre bevægelserne, sløvhed.

Har du glemt at tage Imodium oral opløsning?

Hvis du har glemt at tage en dosis Imodium oral opløsning, tag den da, så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER



Imodium oral opløsning kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

- **Sjældne bivirkninger** (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), pludseligt hududslæt, hævelse omkring mund og øjne, åndedrætsbesvær, brystmerter, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Svært blæreforment udslæt med høj feber og betændelse ved en eller flere kropsåbninger eller andre alvorlige hudsymptomer. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

- **Meget sjældne bivirkninger** (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Svær forstoppelse som kan give voldsom udspiling af tyktarmen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

- **Almindelige bivirkninger** (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Forstoppelse, mavesmerter, kvalme.
- **Mindre almindelige bivirkninger** (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hovedpine, dosighed, svimmelhed, mundtørhed, oppustethed, opkastninger.
- **Sjældne bivirkninger** (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Nældefeber, vandladningsbesvær.

Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl altid din læge eller apoteket, hvis du får bivirkninger, der bliver ved eller medfører uacceptable gener. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

Hvordan opbevares Imodium oral opløsning?



- Opbevar Imodium utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Imodium ved over 25°C.
- Anvend ikke Imodium efter den udløbsdato, der er angivet på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Imodium oral opløsning indeholder:



- Det aktive lægemiddelstof er loperamidhydrochlorid 0,2 mg/ml.
- De øvrige indholdsstoffer er: glycerol, saccharinnatrium, metylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), hindbæraroma, ribsaroma, ponceau 4R (E 124), ethanol, citronsyremonohydrat, rensset vand.

Ansvarlig for markedsføringen i Danmark:

Registreringsindehaver:
JANSSEN-CILAG A/S
Hammerbakken 19
3460 Birkerød
E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller:
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
B-2340 Beerse
Belgien

Revideret november/2005



JANSSEN-CILAG

JANSSEN-CILAG

T&D Prepress

Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - Fax CPM: +32 14605157

LEAFLET Imodium

Market : DK

Article Number : **960068**

Sickcode : 132

Dimensions : 134x204 (B/I/004/V1)

Operator : KEI

Pointsize : 6,8 pt

File Name : 960068.indd (mac)

L A B

■ Black

Date : 1. 23-01-2006

2. 30-01-2006

3. 07-02-2006

4.

5.