

Indlægsseddel: Information til brugeren

Eltroxin® 50 mikrogram og 100 mikrogram tabletter Levothyroxinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Eltroxin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Eltroxin
3. Sådan skal du tage Eltroxin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tyroxin er et hormon, der dannes i skjoldbruskkirtlen (thyroidea), og som regulerer stofskiftet. Eltroxin indeholder levothyroxin, der er et syntetisk fremstillet skjoldbruskkirtelhormon med samme effekt som naturligt tyroxin.

Eltroxin anvendes ved nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (myksødem) og ved nogle tilfælde af forstørret skjoldbruskkirtel (struma).

Lægen kan have givet dig Eltroxin for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Eltroxin

Tag ikke Eltroxin, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for levothyroxinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- har nedsat funktion af binyrerne eller hypofysen og ikke er i behandling herfor.
- har øget stofskifte og ikke er i behandling herfor.
- har forhøjet blodtryk og ikke er i behandling herfor.
- har akut blodprop i hjertet eller anden akut hjertesygdom.

Vær ekstra forsigtig med at tage Eltroxin

Tal med lægen inden du tager Eltroxin, hvis du

- er over 50 år.
- har en hjertesygdom eller har hjertekramper.
- har diabetes.
- er i overgangsalderen og har øget risiko for knogleskørhed.
- har symptomerne træthed, kuldsværhed, tør og fortykket hud, hårtab, langsom puls (symptomer på hypothyreose).
- har nedsat stofskifte som led i en anden hormonsygdom.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Eltroxin kan ændre virkningen af anden medicin, og anden medicin kan ændre virkningen af Eltroxin. Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin mod for højt kolesterol (colestyramin, colestipol, clofibrat, simvastatin, lovastatin),
- medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, barbiturater),
- smertestillende medicin (acetylsalicylsyre),
- medicin mod væskeophobning og for højt blodtryk (furosemid),
- hormontilskud eller hvis du tager p-piller (østrogen) eller medicin med indhold af testosteron,
- medicin mod diabetes,
- medicin mod depression (tricykliske antidepressiva, sertralin),
- medicin mod mavesår (antacida, sucralfat),
- kalktilskud,
- jernholdig medicin og jerntilskud,
- blodtrykssænkende medicin (betablokkere),
- medicin til forebyggelse af blodpropper,
- medicin mod hjertesvigt (amiodaron),
- medicin mod forhøjet stofskifte (propylthiouracil),
- binyrebarkhormoner (kortisol),
- sojaholdige produkter,
- medicin mod malaria (proguanil, chloroquin),
- metadon,
- medicin mod kræft (tamoxifen, 5-fluoruracil, imatinib),
- medicin mod for højt kalium i blodet (kayexalat),
- jodholdigt kontrastmiddel som anvendes i forbindelse med røntgenundersøgelse.

Brug af Eltroxin sammen med mad og drikke

Eltroxin skal tages på tom mave, da mad kan nedsætte virkningen af Eltroxin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Eltroxin efter aftale med lægen.

Amning

Du kan tage Eltroxin, selvom du ammer.

Små mængder af det aktive stof udskilles i modermælken, og du skal derfor fortælle, at du tager Eltroxin, hvis barnet skal have taget blodprøver i ammeperioden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Eltroxin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Eltroxin

Tag altid Eltroxin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Eltroxin bør tages på tom mave med et glas vand fx en halv time før morgenmad. Eltroxin må ikke deles eller knuses.

Voksne: Den sædvanlige startdosis er 50-100 mikrogram daglig, som øges med 50 mikrogram i intervaller på 4 til 6 uger. Dette kan kræve doser på 100-200 mikrogram daglig. Det er vigtigt, at din dosis øges langsomt for at undgå bivirkninger.

Hvis du er over 50 år og har en hjertesygdom, kan lægen anbefale, at du tager 50 mikrogram hver anden dag.

Børn: Særlig doseringsvejledning for børn. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for meget Eltroxin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Eltroxin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få hjertebanken, angst, rastløshed, irritabilitet, forvirring, svedtendens, forstyrrelse i hjerterytmen, ophidselse, uro, ufrivillige bevægelser, store pupiller, meget hurtigt åndedræt, feber, kramper og hovedpine.

Hvis du har glemt at tage Eltroxin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Eltroxin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Forhøjet tryk i hjernen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Krampeanfald.
- Hjertesvigt.
- Blodprop i hjertet.

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Hurtig hjerterytme. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Forstyrrelser i hjerterytmen. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Smerter i brystet. Kontakt læge eller skadestue.
- Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Muskelsvaghed. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Symptomer på overdosering som følge af forøget hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen (hvis dosis ved start af behandling øges for hurtigt). Tal med lægen.
- Irritabilitet.
- Ophidselse, rysten, hovedpine, rastløshed, søvnløshed.
- Hjertebanken.
- Rødme, hedeture, svedtendens, hårtab.
- Forøget appetit, mavesmerter, kvalme, diarré, opkastning.
- Overfølsomhedsreaktioner i form af hududslæt og kløe.
- Uregelmæssig menstruation, infertilitet.
- Træthed, varmeintolerant, feber.
- Meget voldsomt væggtab.

Bivirkningerne forsvinder ofte når dosis nedsættes

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.meldenbivirkning.dk>.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Eltroxin ved temperaturer over 30 °C.

Opbevar Eltroxin i original beholder, tæt tillukket.

Brug ikke Eltroxin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Eltroxin 50 mikrogram og 100 mikrogram tabletter indeholder:

Aktivt stof: Levothyroxinnatrium.

Øvrige indholdsstoffer: MikrokrySTALLinsk cellulose, pregelatineret stivelse, talcum, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Eltroxin tabletter er runde, hvide og hvælvede på begge sider.

50 mikrogram tabletten er mærket "GS 11E" på den ene side og "50" på den anden.

100 mikrogram tabletten er mærket "GS 21C" på den ene side og "100" på den anden.

Pakningsstørrelse

Eltroxin fås som 100 stk. pakninger for begge styrker.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Glaxo Wellcome, Bad Oldesloe, Tyskland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2009

GSK logo