

## Indlægsseddel: Information til brugeren

### Imigran® 25 mg suppositorier (stikpiller) Sumatriptan

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

#### **Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imigran suppositorier
3. Sådan skal du bruge Imigran suppositorier
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

#### **1. Virkning og anvendelse**

Imigran suppositorier er til anvendelse i endetarmen og indeholder lægemidlet sumatriptan, der tilhører en gruppe af lægemidler, der hedder triptaner (*også kaldet 5-HT<sub>1</sub>-receptoragonister*).

#### **Imigran suppositorier bruges til behandling af migræne hovedpine.**

Migræne skyldes sandsynligvis en midlertidig udvidelse af blodkarrene i hovedet. Imigran suppositorier menes at nedsætte denne udvidelse af blodkarrene. Dette afhjælper hovedpine og andre symptomer på migræne, herunder kvalme, opkastning og følsomhed over for lys og lyd.

#### **2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imigran suppositorier**

##### **Brug ikke Imigran:**

- **hvis du er allergisk** over for sumatriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Imigran (angivet i punkt 6)
- **hvis du har hjerteproblemer**, herunder forsnævring af blodkar (*iskæmisk hjertesygdom*), bryst smerter (*angina*) eller tidligere har haft et hjerteanfald
- **hvis du har problemer med blodcirkulationen i benene** og dette forårsager krampelignende smerter, når du går (*perifer vaskulær lidelse*)
- **hvis du har haft et slagtilfælde** eller et mindre slagtilfælde (*transitorisk iskæmisk attack eller TIA*)
- **hvis du har forhøjet blodtryk**. Du kan muligvis bruge Imigran, hvis dit blodtryk kun er lidt forhøjet og er under behandling
- **hvis du lider af en alvorlig leversygdom**
- **hvis du samtidig bruger anden migræne medicin**, herunder lægemidler, der indeholder ergotamin, stoffer der ligner ergotamin, herunder methysergid, eller andre triptaner/5-HT<sub>1</sub>-receptoragonister

- **hvis du samtidig bruger antidepressive lægemidler** af typen monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere), eller hvis du har brugt disse lægemidler inden for de sidste 2 uger.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig: **Kontakt lægen og brug ikke Imigran suppositorier.**

### **Advarsler og forsigtighedsregler**

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Imigran.

### **Hvis du har andre risikofaktorer:**

- **hvis du er storryger** eller **bruger nikotinpræparater** og specielt
- **hvis du er mand over 40 år**, eller
- **hvis du er kvinde efter overgangsalderen**

I meget sjældne tilfælde er alvorlige hjertetilfælde set efter brug af Imigran, også selvom der ikke tidligere var set tegn på hjertelidelse. Hvis noget af ovenstående gælder for dig, kan det betyde, at du har større risiko for at udvikle hjertelidelser: **Kontakt lægen, så du kan få kontrolleret din hjertefunktion**, før du bruger Imigran.

**Hvis du har oplevet krampeanfald** eller har andre risikofaktorer, der kan give større sandsynlighed for krampeanfald, f.eks. skader i hovedet eller alkoholisme: **Kontakt lægen, så lægen kan overvåge dig tættere.**

**Hvis du lider af nyre- eller leversygdom: Kontakt lægen, så lægen kan overvåge dig tættere.**

**Hvis du er allergisk over for antibiotika af typen sulfonamider** er du måske også allergisk over for Imigran. Hvis du ved, at du er allergisk over for antibiotika, men ikke ved, om det er sulfonamider: **Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Imigran.**

**Hvis du tager antidepressive midler af typen SSRI'er** (*selektive serotonin genoptagshæmmere*) eller **SNRI'er** (*serotonin-noradrenalin genoptagshæmmere*): **Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Imigran.** Se også 'Brug af anden medicin sammen med Imigran' nedenfor.

### **Hvis du ofte bruger Imigran**

Hyppig brug af Imigran kan forværre din hovedpine. **Kontakt lægen, hvis dette gælder for dig.** Lægen kan muligvis anbefale, at du stopper med at bruge Imigran.

### **Hvis du oplever smerter eller trykken for brystet efter brug af Imigran**

Disse bivirkninger kan være intense, men er oftest forbigående. Hvis disse bivirkninger er vedvarende eller bliver værre: **Søg straks lægehjælp.** Punkt 4 i denne indlægsseddel indeholder mere information om mulige bivirkninger.

### **Brug af anden medicin sammen med Imigran**

**Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin** eller har gjort det for nylig.

Nogle typer af medicin må ikke tages sammen med Imigran, og andre typer af medicin kan forårsage bivirkninger, hvis de tages sammen med Imigran. **Kontakt lægen, hvis du tager:**

- **Ergotamin**, der også bruges til behandling af **migræne**, eller stoffer, der ligner ergotamin, herunder methysergid (se punkt 2). Brug ikke Imigran på samme tid som disse lægemidler. Du skal stoppe med at tage disse lægemidler mindst 24 timer før du tager Imigran. Vent mindst 6 timer efter du har taget Imigran med at tage lægemidler, der indeholder ergotamin eller stoffer der ligner ergotamin.
- **Andre triptaner/5-HT<sub>1</sub>-receptor agonister** (f.eks. naratriptan, rizatriptan og zolmitriptan), der også bruges til behandling af **migræne** (se punkt 2). Brug ikke Imigran på samme tid som disse

lægemidler. Du skal stoppe med at tage disse lægemidler mindst 24 timer før du tager Imigran. Vent mindst 24 timer efter du har taget Imigran med at tage andre triptaner/5-HT<sub>1</sub>-receptor agonister.

- **SSRI'er** (*selektive serotonin genoptagshæmmere*) eller **SNRI'er** (*serotonin-noradrenalin genoptagshæmmere*), der bruges til behandling af **depression**. Brug af Imigran samtidig med denne gruppe lægemidler kan forårsage serotonin syndrom (symptomerne kan være rastløshed, forvirring, svedtendens, hallucinationer, øgede reflekser, muskelkramper, kulderystelser, hurtige hjerteslag og rysten). Hvis du oplever dette, bør du straks kontakte lægen.
- **MAO-hæmmere** (*monoaminoxidase-hæmmere*), der bruges til behandling af **depression**. Brug ikke Imigran, hvis du har taget disse inden for de sidste 2 uger.
- **Perikum** (*Hypericum perforatum*) – Brug af naturlægemidler indeholdende perikum samtidig med brug af Imigran kan forøge risikoen for bivirkninger.

### Graviditet og amning

**Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid**, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Der er kun begrænset information angående sikkerheden ved brug af Imigran under graviditet. Indtil nu er der ikke noget, der tyder på, at der er en øget risiko for medfødte defekter. Din læge vil diskutere med dig, om du bør tage Imigran eller ej, mens du er gravid.

**Du bør ikke amme dit barn i 12 timer efter brug af Imigran.** Brystmælk, malket ud i denne periode, skal smides ud og må ikke gives til dit barn.

### Trafik- og arbejdssikkerhed

Døshed kan ses som følge af migrænen eller dens behandling med Imigran. **Hvis du er påvirket, bør du ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner.**

## 3. Sådan skal du bruge Imigran suppositorier

**Brug kun Imigran efter dit migræneanfald er begyndt.**

**Brug ikke Imigran til at prøve at forebygge et anfald.**

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

### Dosis

- **Den sædvanlige dosis for voksne mellem 18 år og 65 år** er ét Imigran 25 mg suppositorium. Brug ikke mere end to suppositorier inden for 24 timer. Imigran bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år og ældre over 65 år.

### Hvornår skal man bruge Imigran

- **Brug Imigran, så snart du mærker migrænen**, selv om lægemidlet kan bruges når som helst under anfaldet.

### Hvis symptomerne på migræne vender tilbage

- Du kan tage en dosis igen efter 2 timer, men **brug ikke mere end to suppositorier inden for 24 timer.**

### Vejledning i brug af Imigran suppositorier

- Gå på toilettet, hvis du trænger.
- Vask hænder.
- Tag suppositoriet ud af blisterpakningen.
- Det kan være lettere at indføre suppostoriet, hvis du sætter dig på hug eller bøjer dig fremover.
- Indfør suppositoriet i endetarmen (rectum).
- Vask hænder.

- Undgå at gå på toilettet den første time derefter.

#### **Hvis den første dosis ikke virker**

**Du må ikke tage en ekstra dosis** eller andre Imigran produkter mod det samme anfald. Hvis Imigran ikke hjælper dig: **Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds.**

#### **Hvis du har brugt for meget Imigran**

**Du kan blive syg, hvis du tager for meget Imigran. Hvis du har taget mere end to suppositorier inden for 24 timer: Kontakt lægen for rådgivning.**

**Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket**, hvis du har taget mere af Imigran, **end der står i** denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

**Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.**

## **4. Bivirkninger**

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle symptomer kan være relateret til migrænen.

#### **Allergiske reaktioner: Søg straks lægehjælp**

De følgende bivirkninger er set, men den nøjagtige hyppighed kendes ikke.

- **Symptomer på allergisk reaktion omfatter udslæt, nældefeber (kløende udslæt), hvæsende vejrtrækning, hævede øjenlåg, ansigt eller læber, og tilfælde af anafylaktisk shock.**

Hvis du får nogen af disse symptomer, lige efter du har taget Imigran: **Tag ikke mere. Kontakt straks lægen.**

#### **Almindelige bivirkninger** (kan forekomme hos **op til 1 ud af 10** personer):

- smerter, følelse af tyngde, trykken eller smerter i bryst, hals eller andre steder på kroppen, eller følelsesforstyrrelser, herunder følelsesløshed, prikken og fornemmelse af varme eller kulde. Kan være intenst, men er normalt forbigående.

Hvis disse symptomer fortsætter eller bliver værre (især brystsmerterne): **Søg straks lægehjælp.** Hos et lille antal patienter kan disse symptomer skyldes et hjerteanfald.

#### **Andre almindelige bivirkninger:**

- kvalme eller opkastning, selv om disse reaktioner kan være på grund af selve migrænen
- træthed eller døsighed
- svimmelhed, følelse af svaghed eller hedesure
- forbigående blodtryksstigning
- åndenød
- muskelsmerter.

#### **Meget sjældne bivirkninger** (kan forekomme hos **op til 1 ud af 10.000** personer):

- ændringer i leverfunktionsprøver. Skal du have taget blodprøve, bør du fortælle lægen eller sundhedspersonalet, at du bruger Imigran.

#### **Nogle patienter kan få følgende bivirkninger:**

- krampeanfald, rystelser, muskeltremor, nakkestivhed
- synsforstyrrelser såsom flimren, nedsat syn, dobbeltsyn, synstab og i nogle tilfælde permanente skader (synsforstyrrelser kan dog skyldes selve migrænen)
- hjerteproblemer. Langsomme eller hurtige hjerteslag eller ændringer i hjerterytmen, brystsmerter (*angina*) eller hjerteanfald

- bleg, blåfarvet hud og/eller smerte i fingre, tær, ører, næse eller kæbe ved kulde eller stress (*Raynauds sygdom*)
- følelse af at skulle besvime (blodtryk falder muligvis)
- smerte i nedre venstre side af maven og blodig diarré (*iskæmisk colitis*)
- diarré
- ledsmerter
- angstfølelse
- ekstrem svedtendens.

### **Indberetning af bivirkninger**

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)  
E-mail: [sst@sst.dk](mailto:sst@sst.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

### **5. Opbevaring**

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

### **6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger**

#### **Imigran suppositorier indeholder:**

- **Aktivt stof:** Sumatriptan (25 mg).
- **Øvrige indholdsstoffer:** Witepsol W32 (hårdfedt).

#### **Udseende og pakningsstørrelser**

Imigran suppositorier er hvide, glatte og torpedoformede.

Imigran suppositorier findes i kartoner indeholdende suppositorier individuelt pakket i blister. Imigran suppositorier findes i pakninger af 2, 4, 6, 12, 18 eller 30 suppositorier.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

#### **Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

##### **Indehaver af markedsføringstilladelsen**

GlaxoSmithKline Pharma A/S  
Nykær 68

DK-2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

**Fremstiller**

Farmaclair

Hérouville Saint-Clair

Frankrig

**Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navn:**

**Imigran:** Danmark, Finland, Grækenland, Holland, Italien, Sverige, Tyskland og Østrig.

**Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2015.**