

## Indlægsseddel: Information til brugeren

### Beconase<sup>®</sup> 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension

Beclometasondipropionat som monohydrat

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3-4 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

#### Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase
3. Sådan skal du bruge Beconase
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

### 1. Virkning og anvendelse

Beconase næsespray indeholder et hormon, som forhindrer hævelse og irritation i næsen på grund af allergi med kløe, tilstoppet og/eller løbende næse.

Beconase næsespray kan bruges til forebyggelse af høfeber og allergisk helårssnue.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Beconase for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3-4 dage.

### 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Beconase næsespray virker mod de fleste tilfælde af høfeber, men hvis du er meget udsat (f.eks. i pollensæsonen), kan du have brug for yderligere behandling. Tal med lægen.

#### Brug ikke Beconase

- hvis du er allergisk over for beclometasondipropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Beconase (angivet i punkt 6.1).

#### Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Beconase, hvis du:

- har betændelse i næsen eller bihulerne. Betændelse i næsen eller bihulerne kan behandles samtidig med du bruger Beconase næsespray
- har sår, en nylig skade eller er blevet opereret i næsen

- hvis du får tabletbehandling med binyrebarkhormon. Du må ikke skifte til Beconase næsespray uden at tale med lægen først.

### **Brug af anden medicin sammen med Beconase**

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Der kan forekomme systemiske bivirkninger (bivirkninger der påvirker hele kroppen) ved brug af næsespray, der indeholder binyrebarkhormon, specielt ved brug af høje doser gennem længere perioder. Det er langt mindre sandsynligt, at disse bivirkninger forekommer ved brug af næsespray indeholdende binyrebarkhormon, end ved oral (taget gennem munden) behandling med binyrebarkhormon. Disse bivirkninger kan variere fra patient til patient og mellem forskellige lægemidler med binyrebarkhormon.

### **Graviditet og amning**

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Beconase.

#### **Graviditet**

Hvis du er gravid, må du kun bruge Beconase næsespray efter aftale med lægen.

#### **Amning**

Hvis du ammer, må du kun bruge Beconase næsespray efter aftale med lægen.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Beconase næsespray påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

### **Beconase næsespray indeholder benzalkoniumchlorid**

Kan medføre åndedrætsbesvær.

## **3. Sådan skal du bruge Beconase**

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Beconase må kun anvendes i næsen.

#### Voksne over 18 år:

Den anbefalede dosis er 2 pust i hvert næsebor 2 gange daglig.

Du må ikke bruge mere end 8 pust daglig.

Beconase næsespray skal bruges hver dag for at opnå den bedste virkning.

Virkningen indtræder efter 12-24 timer (efter nogle ganges anvendelse) og der er fuld virkning efter 3-4 dage.

Beconase næsespray må højst anvendes i 3 måneder uden lægens anvisning.

#### Brug til børn:

Beconase næsespray må ikke anvendes til børn uden lægens anvisning.

Beconase næsespray skal omrystes før brug, da det er en vandig opslæmning (suspension).

### **Brugsanvisning:**



1.

Tag den klare beskyttelseshætte af og **ryst flasken**.

Hold flasken lodret som vist på tegningen.

**Første gang du skal bruge sprayen, eller hvis den har stået ubrugt i nogen tid:** Pres pumpen ned et par gange ved tryk på den hvide krave, indtil der kommer forstøvet væske ud.



2.  
Puds næsen forsigtigt. Bøj hovedet let forover. Hold flasken lodret og før studsens ind i det ene næsebor. Luk det andet med et let tryk med en finger.  
Tryk pumpen ned én gang og træk **samtidig** vejret igennem næsen – ikke så kraftigt, at medicinen kan smages.  
Ånd ud gennem munden.  
Tag 1 pust i hver indånding. Gentag behandlingen i det andet næsebor.  
Tør næsestudsens af og sæt **altid** beskyttelseshætten på igen.

#### **Rengøring:**

Fjern beskyttelseshætten og træk den hvide krave forsigtigt af. Vask begge dele under den kolde vandhane. Lad dem tørre og sæt dem sammen igen.

Hvis næsestudsens er tilstoppet, skal du fjerne beskyttelseshætten, skrue pumpedelen af og lægge den i blød i lunkent vand. Lad den derefter tørre og skru den på flasken igen.

Brug aldrig en nål eller noget skarpt til at få hul eller gøre det lille hul i næsestudsens større. Det ødelægger spraymekanismen.

#### **Hvis du har brugt for meget Beconase**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Beconase næsespray, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

#### **Hvis du har glemt at bruge Beconase**

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Det er vigtigt, at du tager den dosis, der står på etiketten fra apoteket, eller som aftalt med lægen. Du bør kun tage så meget som lægen har anbefalet; tager du mere eller mindre, kan dine symptomer blive værre.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

## **4. Bivirkninger**

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

#### **Almindelige bivirkninger** (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

- Ubehagelig lugt og smag
- Tørhed og irritation i næse og svælg
- Næseblod.

#### **Meget sjældne bivirkninger** (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

- Overfølsomhedsreaktioner med pludseligt udslæt, kløe, nældefeber, rødme, hævelser (øjne, ansigt, læber, hals) og vejrtrækningsbesvær. Kan være livsfarligt - ring 112
- Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue
- Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen
- Gennemboring af næseskillevæggen
- Forhøjet tryk i øjet
- Uro og rastløshed
- Rødt, rundt fuldmåneansigt, kropsfedme (Cushingoide træk)
- Nedsat vækst hos børn og unge.

### **Indberetning af bivirkninger**

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)  
E-mail: [dkma@dkma.dk](mailto:dkma@dkma.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## **5. Opbevaring**

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Brug ikke Beconase næsespray efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Beconase næsespray må kun anvendes 3 måneder efter anbrud.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## **6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger**

### **Beconase næsespray indeholder:**

Aktivt stof: Beclometasondipropionat som monohydrat.

Øvrige indholdsstoffer: Renset vand, fortyndet saltsyre, vandfri glucose, mikrokrystallinsk cellulose, carmellosenatrium, phenylethylalkohol, benzalkoniumchlorid, polysorbat 80.

### **Udseende og pakningsstørrelser**

#### **Udseende**

Beconase er en suspension (opslæmning), som skal omrystes før brug.

#### **Pakningsstørrelser**

Beconase næsespray indeholder 200 doser (pust) i plastflaske.

### **Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

#### **Indehaver af markedsføringstilladelsen**

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: [dk-info@gsk.com](mailto:dk-info@gsk.com)

#### **Fremstiller**

GlaxoWellcome, Aranda de Duero, Spanien.

**Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2015**