

## INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

### Terbinafin ratiopharm 10 mg/g creme terbinafin

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.**

- Du kan få Terbinafin ratiopharm uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Terbinafin ratiopharm.
- Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk).

#### **Indholdsfortegnelse:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terbinafin ratiopharm
3. Sådan skal du bruge Terbinafin ratiopharm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

### **1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

Terbinafin ratiopharm er et svampemiddel til behandling af hudinfektion, som skyldes svamp. Terbinafin ratiopharm virker fungicidt, dvs. det dræber svampe.

Terbinafin ratiopharm anvendes til følgende svampeinfektioner på huden: fodsvamp, ringorm, kutan candidiasis og pityriasis versicolor.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

### **2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE TERBINABIN RATIOPHARM**

#### **Brug ikke Terbinafin ratiopharm**

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for terbinafin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

#### **Vær ekstra forsigtig med at bruge Terbinafin ratiopharm**

Terbinafin ratiopharm bør ikke anvendes til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg samt negle uden lægens anvisning.

#### **Brug af anden medicin**

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Terbinafin ratiopharm, og /eller Terbinafin ratiopharm kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette, så spørg lægen eller på apoteket.

## **Graviditet og amning**

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Terbinafin ratiopharm bør kun anvendes under graviditet på tvingende indikation på grund af begrænset klinisk erfaring.

Terbinafin ratiopharm må ikke bruges under amning, og børn bør ikke komme i kontakt med behandlet hud.

## **Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Terbinafin ratiopharm**

Terbinafin ratiopharm indeholder cetostearylalkohol og cetylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

## **3. SÅDAN SKAL DU BRUGE TERBINAFIN RATIOPHARM**

Tag altid Terbinafin ratiopharm efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

### **Dosering**

#### Voksne og børn over 12 år:

Rens og tør de inficerede områder, før cremen påføres i et tyndt lag umiddelbart omkring og på de inficerede steder. Behandlingstiden for de forskellige indikationer er følgende:

Fodsvamp:	1 gang dagligt i 1 uge
Ringorm:	1 gang dagligt i 1 uge
Kutan candidiasis:	1 gang dagligt i 1 uge
Piryriasis versicolor:	2 gange dagligt i 1 uge

Symptomerne vil ofte forsvinde i løbet af få dage, men det er vigtigt at overholde hele behandlingstiden for at undgå en genopblussen af infektionen. Vær opmærksom på, at der kan gå et par uger, inden huden ser helt normal ud.

Hvis lægen foreskriver en anden dosis end angivet her, skal lægens anvisning følges.

Der er intet som tyder på, at ældre patienter kræver en anden dosering eller oplever bivirkninger, som er anderledes end hos yngre patienter.

Børn: Der må kun bruges Terbinafin ratiopharm til børn (under 12 år) efter lægens anvisning.

### **Hvis du har taget for meget Terbinafin ratiopharm**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Terbinafin ratiopharm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

## **4. BIVIRKNINGER**

Terbinafin ratiopharm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Rødme, kløe og svien kan forekomme.

Allergisk reaktion såsom kløe, udslæt, blæreudslæt og nældefeber er set i ganske få tilfælde. Hvis en allergisk reaktion opstår, skal lægen kontaktes og behandlingen skal afbrydes.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted.

## **5. OPBEVARING**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar Terbinafin ratiopharm i den originale emballage.

Brug ikke Terbinafin ratiopharm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Holdbarheden efter åbning er 28 dage.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## **6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**

**Terbinafin ratiopharm 10 mg/g creme** indeholder:

- Aktivt stof: terbinafinhydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: natriumhydroxid, benzylalkohol, cetostearylalkohol, cetylalkohol, cetylpalmitat, isopropylmyristat, polysorbat 60, sorbitanmonostearat og rensat vand.

### **Udseende og pakningsstørrelser**

Aluminiumtube med polyethylenhætte.

Pakningsstørrelser: 7,5 g, 15 og 30 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### **Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland.

Lokal repræsentant:

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm. Tlf.: 45 46 06 60.

Fremstiller:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

**Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2007.**