

INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lamisil kutanspray, opløsning

Terbinafinhydrochlorid 10 mg/g

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Lamisil kutanspray, opløsning uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Lamisil kutanspray, opløsning.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 1 uge.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lamisil kutanspray, opløsning
3. Sådan skal du bruge Lamisil kutanspray, opløsning
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Lamisil kutanspray er et svampemiddel til behandling af hudinfektioner, som skyldes svamp. Lamisil kutanspray virker fungicidt, dvs. at det dræber svampe. Lamisil kutanspray anvendes til følgende svampeinfektioner på huden: Fodsvamp, ringorm, lyskesvamp og til en hudsygdom kaldet skælsyge (pityriasis versicolor).

Lægen kan have givet dig Lamisil kutanspray, opløsning for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE LAMISIL KUTANSPRAY, OPLØSNING

Brug ikke Lamisil kutanspray, opløsning

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Lamisil kutanspray, opløsning

- til patienter med beskadiget hud, hvor alkohol kan forårsage irritation, såsom hudlæsioner, der er tydeligt betændte, eller på følsomme steder på kroppen.
- kan forårsage irritation, hvis den kommer i kontakt med øjnene. Kommer lægemidlet ved et uheld i øjnene, skal du straks skylle grundigt med rindende vand
- er ikke beregnet til at bruge i ansigtet
- til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg samt negle uden forudgående aftale med din læge
-

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du kan bruge Lamisil kutanspray sammen med anden medicin.

Lamisil kutanspray indeholder alkohol. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Lamisil kutanspray uden først at tale med lægen eller apoteket.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Lamisil kutanspray efter aftale med lægen, da der kun er begrænset erfaring med brugen under graviditet.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke bruge Lamisil kutanspray når du ammer, da terbinafin går over i modermælken.

Børn bør ikke komme i kontakt med det hudområde, der er i behandling med Lamisil kutanspray, herunder brystet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lamisil kutanspray påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lamisil kutanspray, opløsning

Lamisil kutanspray indeholder alkohol (ethanol). Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Lamisil kutanspray uden først at tale med lægen eller apoteket.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE LAMISIL KUTANSPRAY, OPLØSNING

Hvis din læge har ordineret Lamisil kutanspray til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl om noget, så spørg lægen eller på apoteket.

Sprayflasken skal holdes lodret ved brug enten med dysen opad eller nedad. Ved brug af sprayen første gang, skal pumpen aktiveres nogle få gange (sædvanligvis op til 3 gange), før sprayen er klar til brug.

Rens og tør de områder hvor du har svamp. Påfør lægemidlet i et tyndt lag. Vær opmærksom på, at hele området med svamp er dækket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Behandlingstiden er for de fleste typer svamp er 1 gang dagligt i 1 uge.

Behandlingstiden er for pityriasis versicolor er 2 gange dagligt i 1 uge.

Symptomerne vil ofte forsvinde i løbet af få dage, men det er vigtigt at overholde hele behandlingstiden for at undgå at svampeinfektionen kommer igen. Hvis du ikke kan se, at din hud er i bedring efter en uge, skal du tale med din læge.

Vær opmærksom på, at der kan gå et par uger, inden huden ser helt normal ud.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Du må kun bruge Lamisil kutanspray til børn efter aftale med en læge.

Hvis du har brugt for meget Lamisil kutanspray

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Lamisil kutanspray, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tak pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Lamisil kutanspray

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Lamisil kutanspray kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget sjældne bivirkninger (*forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede*): Rødme, kløe og svie kan forekomme. Her kan behandlingen fortsættes.

Ved allergiske reaktioner i form af udslæt, blæreudslæt eller nældefeber bør behandlingen stoppes.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Lamisil spray ved almindelig temperatur. Efter åbning, opbevar ikke ved temperaturer over 30°C
- Uåbnet: Brug ikke Lamisil kutanspray efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned
- Efter åbning: Kan anvendes i 12 uger

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lamisil kutanspray, opløsning 10 mg/g indeholder:

- Aktivt stof: Terbinafinhydrochlorid 10 mg/g.
- Øvrige indholdsstoffer: Vand, rensat. Ethanol 96%. Propylenglycol. Macrogolcetostearylether.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Klar farveløs, til svagt gulligt væske

Pakningsstørrelser: 15 ml sprayflaske i hvid plast.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S
Lyngbyvej 172
2100 København Ø

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2009