

Fucidine® 250 mg, filmovertrukne tabletter

Natriumfusidat

L80024A-02

Fucidine® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Fucidine til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidine
3. Sådan skal du tage Fucidine
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucidine indeholder natriumfusidat, der er et antibiotikum. Fucidine forhindrer bakterierne i at formere sig.

Du kan tage Fucidine mod betændelse, når bakterierne er følsomme over for natriumfusidat.

Lægen kan have givet dig Fucidine for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidine

Tag ikke Fucidine

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for natriumfusidat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du er i behandling med kolesterolsænkende medicin (statiner f.eks. simvastatin, atorvastatin)

Vær ekstra forsigtig med at tage Fucidine

- Tal med lægen, inden du tager Fucidine, hvis du har arvelig galactoseintolerans, Lapp Lactase deficiency eller glucose/galactosemalabsorption.
- Bør ikke anvendes af gravide den sidste måned før forventet fødsel på grund af risiko for kernikterus.
- Bør ikke anvendes til nyfødte på grund af risiko for udvikling af kernikterus.
- Vær opmærksom på følgende. Hvis du har nedsat leverfunktion eller galdestase eller er i samtidig behandling med andre farmaka, der hovedsageligt udskilles via galden, bør din leverfunktion kontrolleres jævnligt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager:

- medicin mod tuberkulose eller meningitis (rifampicin).
- medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin).
- binyrebarkhormoner (dexametason).
- medicin mod for højt fedt i blodet (statiner f.eks. simvastatin, atorvastatin).
- blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon).
- medicin mod HIV og aids (proteasehæmmere f.eks. ritonavir, saquinavir).
- medicin efter transplantation (ciclosporin).
- naturlægemidler, der indeholder hyperikum.

Det kan være nødvendigt at justere dosis.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Fucidine, og Fucidine kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Fucidine sammen med mad og drikke

Du kan tage Fucidine sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

- Du må ikke tage Fucidine i den sidste måned før forventet fødsel. Tal med lægen.

Amning:

- Hvis du ammer, må du ikke tage Fucidine, da Fucidine går over i modermælken. Tal med lægen.
- Du må ikke tage Fucidine, hvis du ammer, da dit barn kan få bivirkninger. Tal med lægen.
- Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Fucidine er nødvendig de første 2 måneder efter fødslen. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidine påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucidine

Fucidine tabletter indeholder lactose. Kontakt derfor lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Fucidine

Dosering

Voksne: 2 tabletter (500 mg) 3 gange dagligt.

Børn: Dosis afhænger af barnets vægt. Barnet skal have 30 mg/kg i døgnet fordelt ud på 3 doser. F.eks. skal et barn, der vejer 25 kg have 1 tablet 3 gange dagligt. Følg lægens anvisning.

Betændelse i hud og underhud

Voksne: Dosis afhænger af, hvor alvorlig betændelsen er. Du skal tage 1-2 tabletter (250-500 mg) 2 gange dagligt. Følg lægens anvisning.

Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Tag altid Fucidine nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Hvis du har taget for mange Fucidine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Fucidine tabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du tager flere tabletter end anbefalet, risikerer du at få diaré, kvalme og opkastning og andre gener fra mave eller tarmen samt evt. gulsot.

Hvis du har glemt at tage Fucidine

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Fucidine

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. Bivirkninger

Fucidine kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt).

Hypigheden ikke kendt

- Nedsat nyrefunktion. Akut nyresvigt er set hos patienter med gulsot, specielt når der også er andre sygdomme, der kan påvirke nyrerne.
- Alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse) der medfører opløsning af tværstribet muskulatur (eksempler på tegn og symptomer er: muskel -svaghed, -hævelse og smerte, nyresvigt, mørkfarvet urin og uregelmæssig hjerterytme). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Diaré, opkastning og kvalme.
- Halsbrand og sure opstød. Mavesmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Appetitmangel. Svimmelhed, hovedpine, uklart syn.
- Gulsot. Tal med lægen.
- Søvnliggende sløvhedstilstand. Kraftesløshed, døsighed.

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt evt. med blærer, nældefeber og kløe.

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Forandringer i blodet. Det kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder og blå mærker, blegthed, træthed, feber og infektioner. Det ses især ved behandling i mere end 15 dage og kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Hypigheden ikke kendt

- Svamp i mundhulen og i skeden.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Fucidine efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Fucidine, 250 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Det virksomme stof er: Natriumfusidat.

De øvrige indholdsstoffer er:

Titandioxid (E171), laktose, mikrokrySTALLINSK cellulose, crosopovidon, gelatine, magnesiumstearat, kolloid vandfrit silica, talkum og hypromellose.

Pakningsstørrelser

Fucidine, 250 mg, filmovertrukne tabletter markedsføres i pakninger á 20 stk., 40 stk., 96 stk. og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af:

Abacus Medicine ApS

Vesterbrogade 149

DK-1620 København V

Tel: +45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 08.2009