

# Persantin® 100 mg, overtrukne tabletter

## Dipyridamol

L80026A-02

Persantin® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.

### Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Persantin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

### Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Persantin
3. Sådan skal du tage Persantin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

## 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Persantin nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen, og forhindrer derved dannelsen af blodpropper.

Du kan tage Persantin sammen med anden blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin) til forebyggelse af blodpropper, hvis du har haft en blodprop i hjertet.

Lægen kan have givet dig Persantin for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

## 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PERSANTIN

### Tag ikke Persantin

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for dipyridamol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

### Vær ekstra forsigtig med at tage Persantin

Tal med lægen inden behandling med Persantin, hvis du har:

- Alvorlig hjerte- eller karsygdom.
- En sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis).

Hvis du skal have foretaget en undersøgelse af din hjertefunktion, skal du inden undersøgelsen fortælle lægen, at du tager Persantin. Det kan have betydning for resultaterne.

### Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager:

- Medicin mod muskelsygdom (myasthenia gravis).
- Medicin mod forhøjet blodtryk.
- Medicin mod uregelmæssig hjerterytme (adenosin). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
- Medicin mod astma eller KOL (theophyllin, xantiner).
- Anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin eller acetylsalicylsyre).

### Brug af Persantin sammen med mad og drikke

Du kan tage Persantin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

### Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

#### Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Persantin. Tal med lægen.

#### Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Persantin, da dipyridamol går over i modermælken. Tal med lægen.

### Trafik- og arbejdssikkerhed

Persantin kan give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

### Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Persantin

Persantin indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

## 3. SÅDAN SKAL DU TAGE PERSANTIN

Tag altid Persantin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

### Den sædvanlige dosis er

#### Voksne

Du skal tage 1 tablet 4 gange dagligt.

#### Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

#### Børn

Børn må kun få Persantin 100 mg tabletter efter lægens anvisning.

### Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

### Hvis du har taget for mange Persantin tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Persantin tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få symptomer som varmekfølelse, rødmen, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine. Du kan også få fald i blodtrykket, hurtigt åndedræt, hurtig puls, smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklens, bevidstløshed, mavebesvær, svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle, blødningstendens og gulfarvning af huden.

### Hvis du har glemt at tage Persantin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

### Hvis du holder op med at tage Persantin

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Persantin.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

## 4. BIVIRKNINGER

Persantin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

### Alvorlige bivirkninger

**Ikke almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 til 10 ud af 1.000 patienter.

- Åndenød, angst, brystsmerte med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemuskel eller blodprop i hjertet. Ring 112.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Øget blødning under eller efter operation. Kontakt lægen eller skadestue.

**Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Åndenød pga. overfølsomhed. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbensbuen på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

### Ikke alvorlige bivirkninger

**Almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Kvalme, hovedpine, svimmelhed, diarré.

**Ikke almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Opkastning.
- Muskelsmerter.
- Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Hædture.

**Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring evt. 112.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemeddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemeddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemeddelstyrelsens netsted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk).

## 5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Persantin tabletter ved almindelig temperatur. Tag ikke Persantin efter den udløbsdato, der står på kartonen eller etiketten. Udløbsdato (Anv. før:) er sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Persantin 100 mg, overtrukne tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Dipyridamol
- Øvrige indholdsstoffer: Vandfrit calciumhydrogenphosphat, majsstivelse, magnesiumstearat, saccharose, talkum, akaciegummi, titandioxid (E 171), macrogol 6000, hvid bivoks, carnaubavoks, opløselig stivelse, kolloid silica.

### Pakningsstørrelser

Persantin fås i blisterpakninger med 50 stk, 96 stk og 100 stk tabletter samt i glas med 100 stk tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen

Abacus Medicine ApS  
Vesterbrogade 149  
DK-1620 København V  
Tel: +45 70 22 02 12  
e-mail: [kundeservice@abacusmedicine.com](mailto:kundeservice@abacusmedicine.com)

### Ompakket og frigivet af

Abacus Medicine ApS  
Vesterbrogade 149  
DK-1620 København V

**Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2008**