

**Indlægsseddel: Information til brugeren**

**Mucolysin® 600 mg brusetabletter**

acetylcystein

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

**Oversigt over indlægssedlen**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin
3. Sådan skal du tage Mucolysin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

**1. Virkning og anvendelse**

Mucolysin er et slimløsnende middel, som bruges ved hoste med sejt slim.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

**2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin**

**Tag ikke Mucolysin:**

- hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
- hvis du for nylig har hostet blod op.

Du må ikke bruge Mucolysin til børn under 14 år uden lægens anvisning.

**Advarsler og forsigtighedsregler**

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mucolysin:

- hvis du har astma eller tidligere har haft sammentrækninger i luftvejene (bronkospasmer).
- hvis du har eller har haft mavesår.
- hvis du er særlig følsom over for histamin.

Vær opmærksom på følgende:

Mucolysin kan give alvorlige hudreaktioner. Hvis du får forandringer i hud og slimhinder, skal du kontakte din læge og stoppe behandlingen med Mucolysin.

### **Brug af anden medicin sammen med Mucolysin**

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge:

- hvis du er i behandling med oralt antibiotika. Disse to lægemidler bør tages med mindst 2 timers mellemrum.
- hvis du tager hostestillende medicin.
- hvis du er i behandling med nitroglycerin (glycetyltrinitrat).

### **Brug af Mucolysin sammen med mad og drikke**

Du kan tage Mucolysin med eller uden mad.

### **Graviditet og amning**

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du bør ikke tage Mucolysin, hvis du er gravid eller ammer. Tal med lægen.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Mucolysin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

### **Mucolysin indeholder natrium**

Mucolysin indeholder 139 mg natrium svarende til 6 mmol pr. dosis (brusetablet). Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

### **Mucolysin indeholder lactose og sorbitol (E420)**

Denne medicin indeholder lactose og sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

## **3. Sådan skal du tage Mucolysin**

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne:

½ brusetablet (300 mg) 2 gange daglig eller 1 brusetablet 1 gang daglig.

Børn:

Unge over 14 år: ½ brusetablet (300 mg) 1 gang daglig.

Du må ikke bruge Mucolysin til børn under 14 år.

Brugsanvisning:

Du skal opløse brusetabletten i et halvt glas vand.

Tag ikke Mucolysin sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende slim, som skal hostes op, hvilket kan forstyrre nattesøvn.

### **Hvis du har taget for meget Mucolysin**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mucolysin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Symptomer på overdosering kan være kvalme og opkastning.

#### **Hvis du har glemt at tage Mucolysin**

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

#### **Hvis du holder op med at tage Mucolysin**

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

### **4. Bivirkninger**

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

#### **Alvorlige bivirkninger**

**Sjældne bivirkninger:** Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede:

- Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue.

**Meget sjældne bivirkninger:** Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede:

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.

#### **Ikke alvorlige bivirkninger**

**Ikke almindelige bivirkninger:** Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede:

- Mundbetændelse, mavesmerter, diarré, opkastning, halsbrand og kvalme.
- Hovedpine og feber.
- Overfølsomhedsreaktioner (hududslæt og hævelser, kløe, nældefeber, hududslæt, åndenød, hurtig puls og nedsat blodtryk). Kan blive alvorligt. Kontakt evt. læge. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.
- Susen for ørerne (tinnitus).

**Sjældne bivirkninger:** Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede:

- Blødninger i forbindelse med administration af acetylcystein, delvist i form af overfølsomhedsreaktioner.

#### **Indberetning af bivirkninger**

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S

Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk).  
E-mail: [dkma@dkma.dk](mailto:dkma@dkma.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

### **5. Opbevaring**

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

- **Plastrør:** Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale beholder, for at beskytte mod fugt.
- **Folieposer:** Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringen.

Tag ikke Mucolysin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## **6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger**

### **Mucolysin 600 mg brusetabletter indeholder**

- **Aktivt stof:** acetylcystein.
- **Øvrige indholdsstoffer:** Citronsyre, vandfri; natriumhydrogencarbonat, natriumcarbonat, vandfri, mannitol (E421), lactose, vandfri, askorbinsyre, saccharinnatrium (E954), natriumcyclamat (E952), natriumcitrat. Smag: sorbitol (E420), mannitol (E421), gluconolacton, maltodextrin, silica, kolloid vandfri, skovbærearoma, vanillin, brombærearoma.

### **Udseende og pakningsstørrelser**

#### **Udseende**

Mucolysin er en hvid, rund brusetablet med delekærv på den ene side og med en glat overflade.

#### **Pakningsstørrelser**

10, 20, 50 og 100 brusetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### **Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

*Indehaver af markedsføringstilladelsen:*

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

*Fremstiller:*

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39079 Barleben, Tyskland

**Denne indlægsseddel blev senest revideret 28. juni 2016**