

## INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

### Fexofenadin Orifarm filmovertrukne tabletter 120 mg

Fexofenadinhydrochlorid

#### Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer

Du kan få Fexofenadin Orifarm uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Fexofenadin Orifarm.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

#### Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fexofenadin Orifarm
3. Sådan skal du tage Fexofenadin Orifarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

### 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

#### Virkemåde

Fexofenadinhydrochlorid, det aktive stof i din medicin, tilhører den gruppe af lægemidler, der kaldes antihistaminer.

#### Medicinen anvendes til

Fexofenadin Orifarm 120 mg tabletter anvendes for at lindre symptomer som nysen, løbende næse og næsekløe, kløe i øjnene, tårer i øjnene og rødme, som typisk optræder i forbindelse med høfeber (allergisk rhinitis).

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Fexofenadin Orifarm for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

### 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYDER AT TAGE FEXOFENADIN ORIFARM

#### Tag ikke Fexofenadin Orifarm:

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for fexofenadinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fexofenadin Orifarm.

Dette lægemiddel anbefales ikke til børn under 12 år.

#### Vær ekstra forsigtig med at tage Fexofenadin Orifarm:

- hvis du er ældre.
- hvis du har nyre- eller leverproblemer.

- hvis du har eller nogensinde har haft en hjertesygdom, da denne type medicin kan føre til hurtig eller uregelmæssig hjerterytme.

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager dette lægemiddel.

### **Brug af anden medicin**

Hvis du tager et middel mod mavebesvær, som indeholder aluminium eller magnesium, anbefales det, at du venter ca. 2 timer fra du har taget et sådant lægemiddel til du tager Fexofenadin Orifarm. Midlet mod mavebesvær kan reducere den mængde af lægemiddel, der optages, og kan påvirke virkningen af Fexofenadin Orifarm.

Koncentrationen af fexofenadinhydrochlorid i blodet kan stige, hvis du tager fexofenadinhydrochlorid sammen med erythromycin eller ketoconazol eller sammen med en enkeltdosis af en kombination af lopinavir og ritonavir. Det er muligt, at bivirkningerne øges.

Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal brugen af dette lægemiddel ophøre tre dage før du testen skal foretages.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder både medicin som er købt med og uden recept.

### **Brug af Fexofenadin Orifarm sammen med mad og drikke**

Fexofenadin Orifarm skal tages med et glas vand.

### **Graviditet og amning**

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

#### *Graviditet*

Hvis du er gravid, må du kun tage Fexofenadin Orifarm efter aftale med lægen.

#### *Amning*

Hvis du ammer, må du ikke tage Fexofenadin Orifarm, da Fexofenadin Orifarm går over i modermælken. Tal med lægen.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Det er usandsynligt, at Fexofenadin Orifarm påvirker din evne til at køre bil eller til at betjene maskiner. Der kan dog være sjældne undtagelser, så du skal sikre dig, at du er årvågen og klar, inden du kører bil eller udfører opgaver, som kræver din fulde koncentration.

## **3. SÅDAN SKAL DU TAGE FEXOFENADINHYDROCHLORID ORIFARM**

Hvis din læge har ordineret Fexofenadin Orifarm til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

#### *Dosering*

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl)

Den sædvanlige dosis er 1 tablet én dag dagligt til voksne og børn på 12 år eller derover.

Hvis du føler, at virkningen af Fexofenadin Orifarm er for kraftig eller for svag, skal du rådføre dig med lægen eller apoteket.

#### **Hvis du har taget for mange Fexofenadin Orifarm**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Fexofenadin Orifarm tabletter, end der er angivet i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Blandt symptomerne på overdosering er svimmelhed, dødsighed, træthed og mundtørhed.

#### **Hvis du har glemt at tage Fexofenadin Orifarm**

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

### **4. BIVIRKNINGER**

Fexofenadin Orifarm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne, som er beskrevet herunder, forekommer hos patienter, der tager fexofenadin, og de er angivet som enten almindelige, ikke almindelige eller sjældne.

Kontakt omgående lægen og stop med at tage Fexofenadin Orifarm, hvis du oplever hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg og får problemer med at trække vejret, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion.

*Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):*

- Hovedpine, dødsighed, svimmelhed.
- Kvalme

*Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):*

- Træthed

*Det vides ikke hvor mange der vil opleve følgende bivirkninger:*

- Allergiske hudreaktioner såsom eksem, nældefeber og kløe, uventede hævelser (ødem), trykken for brystet, kortåndethed og rødmen. Hvis der opstår symptomer på anafylaktiske reaktioner (for eksempel hævelse eller åndedrætsbesvær) eller alvorlige hudreaktioner, skal du søge læge.
- Søvnbesvær, nervøsitet, mareridt eller overdrevne drømme.
- Hurtigt hjerteslag, føle sit hjerteslag
- Diarre
- Udslæt, nældefeber, kløe

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

## 5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Tag ikke Fexofenadin Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

### **Fexofenadin Orifarm 120 mg filmovertrukne tabletter indeholder:**

Aktivt stof: fexofenadinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, majsstivelse, povidon og magnesiumstearat. Tablettens filmovertræk indeholder hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogoler, jernoxid, gul (E172) og jernoxid, rød (E172).

### **Udseende og pakningsstørrelser**

#### Udseende

Fexofenadin Orifarm 120 mg tabletter er ferskenfarvede ovale filmovertrukne tabletter, glatte på begge sider.

#### Pakningsstørrelser

Fexofenadin Orifarm fås i pakningsstørrelser med 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 eller 200 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### **Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

Orifarm Generics A/S  
Energivej 15  
5260 Odense S, Danmark  
[info@orifarm.com](mailto:info@orifarm.com)

### **Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:**

Danmark	Fexofenadin Orifarm
Norge	Fexofenadin Copyfarm
Sverige	Fexofenadin Orifarm
Tyskland	Fexofenaderm 120 mg Filmtabletten

### **Denne indlægsseddel blev sidst revideret**

08/2011

Den nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlægsseddel.dk](http://www.indlægsseddel.dk).