

Info-Table - Version 02		
MERCK		
IDENTIFICATION OF THE COMPONENT		
ERP component code:		
56368123		
Local product name:		
CETROTIDE		
Strength(s):		
250 mcg		
TECHNICAL DATA		
Packaging site:	Baxter	
Technical layout ref.:	PIL_605x316mm V02	
FONT SIZE		
Regul. text min. font size:	9 pt	
BARCODE		
Barcode type:	Laetus	
Alpha numeric content:	410	
Spotmark:	No	
TRACEABILITY (VERSIONS)		
Vx	Date	Designer
01	05.11.2018	Rajkumar M
02	n/a	n/a
03	n/a	n/a
COLOURS		
Printed colour(s)	Black	
Technical information(s)	Keyline	

Bipacksedel: Information till användaren



Cetrotide 0,25 mg

pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

cetorelixacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dinas.

Om du får biverkringar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkringar som inte nämnats i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cetrotide är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cetrotide
3. Hur du använder Cetrotide
4. Eventuella biverkringar
5. Hur Cetrotide ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Hur Cetrotide ska blandas och injiceras



56368123

Varningar och försiktighet

Allergier

Om du för läkare innan du använder Cetrotide om du har en pågående allergisk reaktion eller tidigare har haft allergiska reaktioner.

Ovariellt hyperstimuleringsyndrom (OHSS)

Cetrotide används tillsammans med andra läkemedel som stimulerar äggstockarna att utveckla fler ägg som kan lösgöras. Medan eller efter du fått dess läkemedel kan du utveckla ovariell hyperstimuleringsyndrom (OHSS). Detta sker när foliklarna utvecklas för mycket och blir storা cystor.

Eventuella tecken på detta som du ska vara uppmärksam på och vad du ska göra om detta inträffar, se avsnitt 4 "Eventuella biverkringar".

Användning av Cetrotide under fler än en cykel

Erfarenheten av användning av Cetrotide under fler än en cykel är begränsad. Din läkare kommer att noggrant gå igenom fördelarna och riskerna för dig om du behöver ta Cetrotide under fler än en cykel.

Leverjukdom

Tala om för läkare innan du använder Cetrotide om du har en leverjukdom. Cetrotide har inte undersökts hos patienter med leverjukdom.

Njurjukdom

Tala om för läkare innan du använder Cetrotide om du har en njurjukdom. Cetrotide har inte undersökts hos patienter med njurjukdom.

Barn och ungdomar

Cetrotide är inte avsett att användas av barn och ungdomar. Om du får biverkringar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkringar som inte nämnats i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cetrotide är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cetrotide
3. Hur du använder Cetrotide
4. Eventuella biverkringar
5. Hur Cetrotide ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Hur Cetrotide ska blandas och injiceras

Graviditet och amning

Använt inte Cetrotide om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller om du är ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Cetrotide förväntas inte påverka din förstånd om framförda fordon och använda maskiner.

3. Hur du använder Cetrotide

Använt alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådråga läkare om du är osäker.

Hur du använder detta läkemedel

Detta läkemedel är endast avsett att injiceras strax under huden på magen (subkutan). Välj olika delar av magen varje dag för att minska hviduritration.

• Din läkare måste övervaka din första injektion. Din läkare eller sjuksköterska visar dig hur du ska bereda och injicera läkemedlet.

Cetrotide-pulvert i injektionsflaskan och det sterila vattnet (spädningsvätskan) i den förfyllda sprutan har samma utgångsdatum. Det finns angivet på etiketterna och på förpackningen.

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Öppnat läkemedlet kan förvaras i originalförpackningen vid rumstemperatur (vid högst 30 °C) i upp till 3 månader.

• Du börjar med att använda ett annat läkemedel dag 1 i din behandlingscykel. Du börjar sedan använda Cetrotide några dagar senare. (Se nästa avsnitt "Hur mycket du ska använda".)

Hur mycket du ska använda

Injicera innehållet i 1 injektionsflaska (0,25 mg Cetrotide) en gång om dagen. Det är bäst att använda läkemedlet vid samma tid varje dag med 24 timmar mellan varje dos.

• Du kan välja mellan att injicera varje morgon eller varje kväll. Om du injiceras varje morgon: Börja din injektioner dag 5 eller dag 6 av behandlingscykeln. Din läkare informerar dig om exakt datum och tid. Du ska använda detta läkemedel till och med den morgon som dinna ägg tas ut (ovulationsinduktion).

ELLER

• Om du injiceras varje kväll: Börja din injektioner dag 5 av behandlingscykeln. Din läkare informerar dig om exakt datum och tid. Du ska använda detta läkemedel till och med den kväll innan dinna ägg tas ut (ovulationsinduktion).

2. Vad du behöver veta innan du använder Cetrotide

Använt inte Cetrotide

• om du är allergisk mot cetorelixacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

• om du är allergisk mot läkemedel som liknar Cetrotide (några andra peptidhormoner)

• om du är gravid eller ammar

• om du har en allvarlig njurjukdom.

Använt inte Cetrotide om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker ska du tala med läkare innan du använder detta läkemedel.

4. Eventuella biverkringar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkringar, men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner

Cetrotide används tillsammans med andra läkemedel som stimulerar äggstockarna att utveckla fler ägg som kan lösgöras. Medan eller efter du fått dess läkemedel kan du utveckla ovariell hyperstimuleringsyndrom (OHSS). Detta sker när foliklarna utvecklas för mycket och blir storा cystor.

Eventuella tecken på detta som du ska vara uppmärksam på och vad du ska göra om detta inträffar, se avsnitt 4 "Eventuella biverkringar".

Användning av Cetrotide under fler än en cykel

Erfarenheten av användning av Cetrotide under fler än en cykel är begränsad. Din läkare kommer att noggrant gå igenom fördelarna och riskerna för dig om du behöver ta Cetrotide under fler än en cykel.

Leverjukdom

Tala om för läkare innan du använder Cetrotide om du har en leverjukdom. Cetrotide har inte undersökts hos patienter med leverjukdom.

Njurjukdom

Tala om för läkare innan du använder Cetrotide om du har en njurjukdom. Cetrotide har inte undersökts hos patienter med njurjukdom.

Barn och ungdomar

Cetrotide är inte avsett att användas av barn och ungdomar. Om du får biverkringar, tala med läkare eller apotekspersonal.

Andra biverkringar

Vanliga (kan drabba upp till 1000 individer):

• Lindrig och kortvarig hviduritration kan uppstå vid injektionsstället.

• Långvarigt förtöjning, andringssvårigheter eller värsl. Du har eventuellt fått en allvarlig, livshotande allergisk reaktion mot läkemedlet. Detta är mindre vanligt (kan drabba upp till 1 av 1000 individer).

Om du upplever någon av de ovan nämnda biverkringarna ska du sluta att använda Cetrotide och omedelbart kontakta din läkare.

5. För in nälen i huden

Håll sprutan med den gråa nälen uppåt och kontrollera om det finns några luftbubblor.

Avglänsa luftbubblorna genom att knacka försiktigt på sprutan tills all luft samlas överst - tryck sedan in kolven långsamt tills

Rör inte den gråa nälen och låt inte nälen komma i kontakt med något.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Miten Cetrotide sekotetaan käyttövalmiaksi ja miten injektio pistetään

Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, D-64293 Darmstadt, Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

7. Täcka injektionsstället

Välj ett injektionsställe på magen, helst i närbild av naveln. Välj olika delar av magen varje dag för att minska hviduritration.

Tävla huden runt det valda injektionsstället med den andra alcoholfuktade kompressen - använd cirkelrelfreiser.

• Låt huden runt det valda injektionsstället med den andra alcoholfuktade kompressen - använd cirkelrelfreiser.

• Tryck långsamt i den gråa nälen helt i huden med en vinkel på ca 45 till 90 grader - släp sedan huden.

8. Mitä Cetrotide on ja mihin sitä käytetään

Mitä Cetrotide on

Cetrotide sisältää setoreliksiasetati-nimistä lääkeainetta, joka estää munasoluun irtoamisen munasjärvä (ovulaatio) kuukausikkien aikana.

• Låt huden runt det valda injektionsstället med den andra alcoholfuktade kompressen - använd cirkelrelfreiser.

• Håll sprutan med den gråa nälen uppåt och rör inte nälen.

• Tryck hårt i den gråa nälen tills nälen är helt i huden.

• Låt huden runt det valda injektionsstället med den andra alcoholfuktade kompressen - använd cirkelrelfreiser.

• Tryck hårt i den gråa nälen tills nälen är helt i huden.

• Låt huden runt det valda injektionsstället med den andra alcoholfuktade kompressen - använd cirkelrelfreiser.

• Tryck hårt i den gråa nälen tills nälen är helt i huden.

• Låt huden runt det valda injektionsstället med den andra alcoholfuktade kompressen - använd cirkelrelfreiser.

• Tryck hårt i den gråa nälen tills nälen är helt i huden.

• Låt huden runt det valda injektionsstället med den andra alcoholfuktade kompressen - använd cirkelrelfreiser.

• Tryck hårt i den gråa nälen tills nälen är helt i huden.</p

MERCK		
IDENTIFICATION OF THE COMPONENT		
ERP component code:	56368123	
Local product name:	CETROTIDE	
Strength(s):	250 mcg	
TECHNICAL DATA		
Packaging site:	Baxter	
Technical layout ref:	PIL_605x316mm V02	
FONT SIZE		
Regul. text min. font size:	9 pt	
BARCODE		
Barcode type:	Laetus	
Alpha numeric content:	410	
Spotmark:	No	
TRACEABILITY (VERSIONS)		
Vx	Date	Designer
01	05.11.2018	Rajkumar M
02	n/a	n/a
03	n/a	n/a
COLOURS		
Printed colour(s)	Black	
Technical information(s)	Keyline	

- yksi **harmaa** injektioneula, jolla lääkevalmiste pistetään vatsasi ihon alle.

- kaksi alkoholilla kostutettua puhdistustynnyriä.

Kuiva-aineen ja veden sekoittaminen valmiiksi lääkevalmisteeksi

1. Irrota injektiopullon korkki

- Alla on kumitulppa. Jätää se injektiopulloon.
- Pyyhi kumitulppa ja metallirengas toisella alkoholilla kostutettua puhdistustynnyriä.

2. Veden lisääminen esitytystä ruiskusta injektiopullossa olevaan kuiva-aineeseen

- Ota keltainen neula pakauksestaan.
- Poista esitytystä ruiskun suojuus ja kierrä keltaisen neula kiinni ruiskuun. Poista neulan suojuus.
- Paina keltaisen neula injektiopullon kumitulpan keskipohjan läpi.
- Ruiskuta vesi injektiopulloon painamalla hitaasti ruiskun mäntää. Älä käytä muunlaita vettä.
- Jätää ruisku kiinni kumitulppaan.

3. Kuiva-aineen ja veden sekoittaminen injektiopullossa

- Pidä huolellisesti kiinni ruiskusta ja injektiopullossa samalla kun liukuttelee pulloa kevyesti kuiva-aineen ja veden sekoittamiseksi keskenään. Kun ne ovat sekoituneet, liuoxi on kirkasta eliä siinä hiukkasia.
- Älä ravista, jotta lääkeeseen ei muodostu kuplia.

4. Ruiskun täyttämisen uudelleen injektiopullossa olevalla lääkevalmisteella

- Käännä injektiopullo ylösalaisin. Vedä lääkevalmiste injektiopullossa ruiskuun vetämällä ruiskun mäntää varovasti taaksepäin. Älä vedä mäntätulppalia varustettua mäntää kokonaan ulos. Jos vedät mäntätulppalia varustetun mänän vahingossa kokonaan ulos, hävitä annos, koska se ei ole enää sterili, ja valmista uusi annos (alota vähintään 1 t.
- Jos injektiopulloon jää lääkevalmistetta, vedä keltaista neulaa ulospäin, kunnes neulan pää on juuri ja juuri kumitulpan sisältä. Voit seurata neulan ja nesteen liikkettä katsomalla sivulta kumitulpassa olevan lopen läpi.
- Varmista, että vedät injektiopullon koko sisällön ruiskuun.
- Kiinnitä keltaisen neulan suojuus takaisin paikoilleen. Kierrä keltaisen neulaa irti ruiskusta ja aseta ruisku pöydälle.

Pistokohdan valmistelu ja lääkkeen pistäminen

1. Ilmakuplien poistaminen

- Ota **harmaa** neula pakauksestaan. Kierrä harmaa neula kiinni ruiskuun ja poista neulan suojuus.
- Pidä ruisku siten, että harmaa neula osittain ylöspäin, ja tarkista näkyvä ilmakupla.
- Poistaakesi ilmakuplat, näppäytä sormella kevyesti ruiskua, kunnes ilma kerääntyy sen kärkeen. Paina sitten mäntää hitaasti sisään, kunnes kaikki ilmakuplat ovat tulleet ulos.
- Älä kosketa harmataa neulaa, äläkä anna annostaan koskettaa mitään pintoja.

2. Pistokohdan puhdistaminen

- Valitse pistoskohta vatsan alueelta, mieleltaan navan läheisyydestä. Valitse joka päivä eri kohta vatsan alueelta iho-ärsytyksen vähenemiseksi.
- Puhdistaa valitsemasi pistokohdan iho toisella alkoholilla kostutettua puhdistustynnyriä. Suorita puhdistus pyörivin liikkein.

3. Ihoon pistäminen

- Pidä ruiskua toisessa kädessä kynästötellä.
- Kohota pistokohdan ihoa niipistämällä kevyesti pistoskohtaan ympäriltä toisella kädellä, ja pidä huolettu tukivastii tassaa ässennossa.
- Pistä harmaa neula hitaasti noin 45–90 astetta kulmassa kokonaan ihoon sisään ja päästä iho sitten otteestasi.

4. Lääkevalmisteen pistäminen

- Vedä varovasti ruiskun mäntä ulospäin. Jos ruiskuun ilmaantuu verta, jatka kohdasta 5.
- Jos ruiskuun ei ilmaannu verta, ruiskuta lääke painamalla mäntää **hitasti** sisään.
- Kun ruisku on tyhjä, vedä harmaa neula hitaasti noin 45–90 astetta kulmassa kokonaan ihoon sisään ja päästä iho sitten otteestasi.
- **2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Cetrotide**

Brug ikke Cetrotide

- hvis du er allergisk over for cetrorelixacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cetrotide (angivet i punkt 6).

- hvis du er allergisk over for lægemidler, der ligner Cetrotide (alle andre peptidhormoner).

- hvis du er gravid eller ammer.

- hvis du lider af nyresygdomme i svær grad.

- pese kådet ja aloita alusta käyttäen uutta injektiopullossa ja esitytystä ruiskuun.

6. Hävitäneen ja veden sekoittaminen valmiiksi lääkevalmisteeksi

1. Irrota injektiopullon korkki

- Alla on kumitulppa. Jätää se injektiopulloon.
- Pyyhi kumitulppa ja metallirengas toisella alkoholilla kostutettua puhdistustynnyriä.

2. Veden lisääminen esitytystä ruiskusta injektiopullossa olevaan kuiva-aineeseen

- Ota keltainen neula pakauksestaan.
- Poista esitytystä ruiskun suojuus ja kierrä keltaisen neula kiinni ruiskuun. Poista neulan suojuus.
- Paina keltaisen neula injektiopullon kumitulpan keskipohjan läpi.
- Ruiskuta vesi injektiopulloon painamalla hitaasti ruiskun mäntää. Älä käytä muunlaita vettä.
- Jätää ruisku kiinni kumitulppaan.

3. Kuiva-aineen ja veden sekoittaminen injektiopullossa

- Pidä huolellisesti kiinni ruiskusta ja injektiopullossa samalla kun liukuttelee pulloa kevyesti kuiva-aineen ja veden sekoittamiseksi keskenään. Kun ne ovat sekoituneet, liuoxi on kirkasta eliä siinä hiukkasia.
- Älä ravista, jotta lääkeeseen ei muodostu kuplia.

4. Ruiskun täyttämisen uudelleen injektiopullossa olevalla lääkevalmisteella

- Käännä injektiopullo ylösalaisin. Vedä lääkevalmiste injektiopullossa ruiskuun vetämällä ruiskun mäntää varovasti taaksepäin. Älä vedä mäntätulppalia varustettua mäntää kokonaan ulos. Jos vedät mäntätulppalia varustetun mänän vahingossa kokonaan ulos, hävitä annos, koska se ei ole enää sterili, ja valmista uusi annos (alota vähintään 1 t.
- Jos injektiopulloon jää lääkevalmistetta, vedä keltaista neulaa ulospäin, kunnes neulan pää on juuri ja juuri kumitulpan sisältä. Voit seurata neulan ja nesteen liikkettä katsomalla sivulta kumitulpassa olevan lopen läpi.
- Varmista, että vedät injektiopullon koko sisällön ruiskuun.
- Kiinnitä keltaisen neulan suojuus takaisin paikoilleen. Kierrä keltaisen neulaa irti ruiskusta ja aseta ruisku pöydälle.

Pistokohdan valmistelu ja lääkkeen pistäminen

1. Ilmakuplien poistaminen

- Ota **harmaa** neula pakauksestaan. Kierrä harmaa neula kiinni ruiskuun ja poista neulan suojuus.
- Pidä ruisku siten, että harmaa neula osittain ylöspäin, ja tarkista näkyvä ilmakupla.
- Poistaakesi ilmakuplat, näppäytä sormella kevyesti ruiskua, kunnes ilma kerääntyy sen kärkeen. Paina sitten mäntää hitaasti sisään, kunnes kaikki ilmakuplat ovat tulleet ulos.
- Älä kosketa harmataa neulaa, äläkä anna annostaan koskettaa mitään pintoja.

2. Pistokohdan puhdistaminen

- Valitse pistoskohta vatsan alueelta, mieleltaan navan läheisyydestä. Valitse joka päivä eri kohta vatsan alueelta iho-ärsytyksen vähenemiseksi.
- Puhdistaa valitsemasi pistokohdan iho toisella alkoholilla kostutettua puhdistustynnyriä. Suorita puhdistus pyörivin liikkein.

3. Ihoon pistäminen

- Pidä ruiskua toisessa kädessä kynästötellä.
- Kohota pistokohdan ihoa niipistämällä kevyesti pistoskohtaan ympäriltä toisella kädellä, ja pidä huolettu tukivastii tassaa ässennossa.
- Pistä harmaa neula hitaasti noin 45–90 astetta kulmassa kokonaan ihoon sisään ja päästä iho sitten otteestasi.

4. Lääkevalmisteen pistäminen

- Vedä varovasti ruiskun mäntä ulospäin. Jos ruiskuun ilmaantuu verta, jatka kohdasta 5.
- Jos ruiskuun ei ilmaannu verta, ruiskuta lääke painamalla mäntää **hitasti** sisään.
- Kun ruisku on tyhjä, vedä harmaa neula hitaasti noin 45–90 astetta kulmassa kokonaan ihoon sisään ja päästä iho sitten otteestasi.
- **2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Cetrotide**

Brug ikke Cetrotide

- hvis du er allergisk over for cetrorelixacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cetrotide (angivet i punkt 6).

- hvis du er allergisk over for lægemidler, der ligner Cetrotide (alle andre peptidhormoner).

- hvis du er gravid eller ammer.

- hvis du lider af nyresygdomme i svær grad.

- pese kådet ja aloita alusta käyttäen uutta injektiopullossa ja esitytystä ruiskuun.

6. Hävitäneen ja veden sekoittaminen valmiiksi lääkevalmisteeksi

1. Irrota injektiopullon korkki

- Alla on kumitulppa. Jätää se injektiopulloon.
- Pyyhi kumitulppa ja metallirengas toisella alkoholilla kostutettua puhdistustynnyriä.

2. Veden lisääminen esitytystä ruiskusta injektiopullossa olevaan kuiva-aineeseen

- Ota keltainen neula pakauksestaan.
- Poista esitytystä ruiskun suojuus ja kierrä keltaisen neula kiinni ruiskuun. Poista neulan suojuus.
- Paina keltaisen neula injektiopullon kumitulpan keskipohjan läpi.
- Ruiskuta vesi injektiopulloon painamalla hitaasti ruiskun mäntää. Älä käytä muunlaita vettä.
- Jätää ruisku kiinni kumitulppaan.

3. Kuiva-aineen ja veden sekoittaminen injektiopullossa

- Pidä huolellisesti kiinni ruiskusta ja injektiopullossa samalla kun liukuttelee pulloa kevyesti kuiva-aineen ja veden sekoittamiseksi keskenään. Kun ne ovat sekoituneet, liuoxi on kirkasta eliä siinä hiukkasia.
- Älä ravista, jotta lääkeeseen ei muodostu kuplia.

4. Ruiskun täyttämisen uudelleen injektiopullossa olevalla lääkevalmisteella

- Käännä injektiopullo ylösalaisin. Vedä lääkevalmiste injektiopullossa ruiskuun vetämällä ruiskun mäntää varovasti taaksepäin. Älä vedä mäntätulppalia varustettua mäntää kokonaan ulos. Jos vedät mäntätulppalia varustetun mänän vahingossa kokonaan ulos, hävitä annos, koska se ei ole enää sterili, ja valmista uusi annos (alota vähintään 1 t.
- Jos injektiopulloon jää lääkevalmistetta, vedä keltaista neulaa ulospäin, kunnes neulan pää on juuri ja juuri kumitulpan sisältä. Voit seurata neulan ja nesteen liikkettä katsomalla sivulta kumitulpassa olevan lopen läpi.
- Varmista, että vedät injektiopullon koko sisällön ruiskuun.
- Kiinnitä keltaisen neulan suojuus takaisin paikoilleen. Kierrä keltaisen neulaa irti ruiskusta ja aseta ruisku pöydälle.

Pistokohdan valmistelu ja lääkkeen pistäminen

1. Ilmakuplien poistaminen

- Ota **harmaa** neula pakauksestaan. Kierrä harmaa neula kiinni ruiskuun ja poista neulan suojuus.
- Pidä ruisku siten, että harmaa neula osittain ylöspäin, ja tarkista näkyvä ilmakupla.
- Poistaakesi ilmakuplat, näppäytä sormella kevyesti ruiskua, kunnes ilma kerääntyy sen kärkeen. Paina sitten mäntää hitaasti sisään, kunnes kaikki ilmakuplat ovat tulleet ulos.
- Älä kosketa harmataa neulaa, äläkä anna annostaan koskettaa mitään pintoja.

2. Pistokohdan puhdistaminen

- Valitse pistoskohta vatsan alueelta, mieleltaan navan läheisyydestä. Valitse joka päivä eri kohta vatsan alueelta iho-ärsytyksen vähenemiseksi.
- Puhdistaa valitsemasi pistokohdan iho toisella alkoholilla kostutettua puhdistustynnyriä. Suorita puhdistus pyörivin liikkein.

3. Ihoon pistäminen

- Pidä ruiskua toisessa kädessä kynästötellä.
- Kohota pistokohdan ihoa niipistämällä kevyesti pistoskohtaan ympäriltä toisella kädellä, ja pidä huolettu tukivastii tassaa ässennossa.
- Pistä harmaa neula hitaasti noin 45–90 astetta kulmassa kokonaan ihoon sisään ja päästä iho sitten otteestasi.

4. Lääkevalmisteen pistäminen

- Vedä varovasti ruiskun mäntä ulospäin. Jos ruiskuun ilmaantuu verta, jatka kohdasta 5.
- Jos ruiskuun ei ilmaannu verta, ruiskuta lääke painamalla mäntää **hitasti** sisään.
- Kun ruisku on tyhjä, vedä harmaa neula hitaasti noin 45–90 astetta kulmassa kokonaan ihoon sisään ja päästä iho sitten otteestasi.
- **2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Cetrotide**

Brug ikke Cetrotide

- hvis du er allergisk over for cetrorelixacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cetrotide (angivet i punkt 6).

- hvis du er allergisk over for lægemidler, der ligner Cetrotide (alle andre peptidhormoner).

- hvis du er gravid eller ammer.

- hvis du lider af nyresygdomme i svær grad.

- pese kådet ja aloita alusta käyttäen uutta injektiopullossa ja esitytystä ruiskuun.

6. Hävitäneen ja veden sekoittaminen valmiiksi lääkevalmisteeksi

1. Irrota injektiopullon korkki

- Alla on kumitulppa. Jätää se injektiopulloon.
- Pyyhi kumitulppa ja metallirengas toisella alkoholilla kostutettua puhdistustynnyriä.

2. Veden lisääminen esitytystä ruiskusta injektiopullossa olevaan kuiva-aineeseen

- Ota keltainen neula pakauksestaan.
- Poista esitytystä ruiskun suojuus ja kierrä keltaisen neula kiinni ruiskuun. Poista neulan suojuus.
- Paina keltaisen neula injektiopullon kumitulpan keskipohjan läpi.
- Ruiskuta vesi injektiopulloon painamalla hitaasti ruiskun mäntää. Älä käytä muunlaita vettä.
- Jätää ruisku kiinni kumitulppaan.

3. Kuiva-aineen ja veden sekoittaminen injektiopullossa

- Pidä huolellisesti kiinni ruiskusta ja injektiopullossa samalla kun liukuttelee pulloa kevyesti kuiva-aineen ja veden sekoittamiseksi keskenään. Kun ne ovat sekoituneet, liuoxi on kirkasta eliä siinä hiukkasia.
- Älä ravista, jotta lääkeeseen ei muodostu kuplia.

4. Ruiskun täyttämisen uudelleen injektiopullossa olevalla lääkevalmisteella

- Käännä injektiopullo ylösalaisin. Vedä lääkevalmiste injektiopullossa ruiskuun vetämällä ruiskun mäntää varovasti taaksepäin. Älä vedä mäntätulppalia varustettua mäntää kokonaan ulos. Jos vedät mäntätulppalia varustetun mänän vahingossa kokonaan ulos, hävitä annos, koska se ei ole enää sterili, ja valmista uusi annos (alota vähintään 1 t.
- Jos injektiopulloon jää lääkevalmistetta, vedä keltaista neulaa ulospäin, kunnes neulan pää on juuri ja juuri kumitulpan sisältä. Voit seurata neulan ja nesteen liikkettä katsomalla sivulta kumitulpassa olevan lopen läpi.
- Varmista, että vedät injektiopullon koko sisällön ruiskuun.
- Kiinnitä keltaisen neulan suojuus takaisin paikoilleen. Kierrä keltaisen neulaa irti ruiskusta ja aseta ruisku pöydälle.

Pistokohdan valmistelu ja lääkkeen pistäminen

1. Ilmakuplien poistaminen

- Ota **harmaa** neula pakauksestaan. Kierrä harmaa neula kiinni ruiskuun ja poista neulan suojuus.
- Pidä ruisku siten, että harmaa neula osittain ylöspäin, ja tarkista näkyvä ilmakupla.
- Poistaakesi ilmakuplat, näppäytä sormella kevyesti ruiskua, kunnes ilma kerääntyy sen kärkeen. Paina sitten mäntää hitaasti sisään, kunnes kaikki ilmakuplat ovat tulleet ulos.
- Älä kosketa harmataa neulaa, äläkä anna annostaan koskettaa mitään pintoja.

2. Pistokohdan puhdistaminen

- Valitse pistoskohta vatsan alueelta, mieleltaan navan läheisyydestä. Valitse joka päivä eri kohta vatsan alueelta iho-ärsytyksen vähenemiseksi.
- Puhdistaa valitsemasi pistokohdan iho toisella alkoholilla kostutettua puhdistustynnyriä. Suorita puhdistus pyörivin liikkein.

3. Ihoon pistäminen

- Pidä ruiskua toisessa kädessä kynästötellä.
- Kohota pistokohdan ihoa niipistämällä kevyesti pistoskohtaan ympäriltä toisella kädellä, ja pidä huolettu tukivastii tassaa ässennossa.
- Pistä harmaa neula hitaasti noin 45–90 astetta kulmassa kokonaan ihoon sisään ja päästä iho sitten otteestasi.

4. Lääkevalmisteen pistäminen

- Vedä varovasti ruiskun mäntä ulospäin. Jos ruiskuun ilmaantuu verta, jatka kohdasta 5.
- Jos ruiskuun ei ilmaannu verta, ruiskuta lääke painamalla mäntää **hitasti** sisään.
- Kun ruisku on tyhjä, vedä harmaa neula hitaasti noin 45–90 astetta kulmassa kokonaan ihoon sisään ja päästä iho sitten otteestasi.</