

Creon® 10.000, hårde enterokapsler

Creon® 25.000, hårde enterokapsler

Creon® 40.000, hårde enterokapsler

Pankreatin

L90147A-01

- Creon® er et registreret varemærke, der tilhører Abbott Products GmbH.

Læs denne indlægsseddel grundigt.

Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Creon® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Creon®.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indlægssedlen kan også hentes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon®
3. Sådan skal du tage Creon®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

- Creon® indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Du kan tage Creon ved sygdomme i bugspytkirtlen (pancreas).
- Hvis din læge har sagt, at du skal tage Creon® for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon®

Tag ikke Creon®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for pankreatin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for svineprotein eller andre svineprodukter.
- Hvis du har akut betændelse i bugspytkirtlen (pancreas).

Vær ekstra forsigtig med at tage Creon®

Tal med lægen, inden du tager Creon®, hvis du

- har svær forstoppelse
- har en ikke-fungerende tarm
- har betændelse i tarmen.

Hvis du har cystisk fibrose, må du kun tage Creon® efter lægens anvisning.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Creon® sammen med mad og drikke

- Det er bedst at tage Creon® i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun tage Creon® efter aftale med lægen.

Amning:

- Du kan tage Creon®, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

- Creon® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Creon®

Kapslerne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Du bør desuden indtage rigelig væske (2-3 liter) hver dag i de perioder, hvor du bruger Creon®. Du kan synke kapslerne hele, eller du kan åbne dem, og bruge granulatet som drys på f.eks. ymer. Granulatet skal indtages straks derefter. Du må ikke tygge eller knuse granulatet.

Dosering

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Creon® 10.000: 1-2 enterokapsler til de 3 hovedmåltider.

Creon® 25.000 og 40.000: 1 enterokapsel til de 3 hovedmåltider.

Behandlingen starter med lav dosis og bliver derefter justeret til dit behov. Du må kun ændre din dosis i samråd med lægen.

Børn: Du må kun bruge Creon® til børn under 15 år efter aftale med en læge.

Hvis din læge har ordineret Creon® til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har taget for mange Creon®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Creon® end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge. Dette gælder især børn.

Hvis du har glemt at tage Creon®

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Creon®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Creon® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Bindevævsforandringer i tyktarmen hos patienter med cystisk fibrose. Forsnævninger af tyktarmen og blod i afføringen. Kontakt lægen.

Hypigheden er ikke kendt:

- Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blodig afføring. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Mavesmerter.
- Ikke almindelige bivirkninger** (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
- Forstoppelse, diarré, kvalme, opkastning, unormal afføring.
- Allergiske reaktioner. Kontakt læge.

Hypigheden er ikke kendt:

- Vægttab,
- Irritation ved endetarmen
- Luftafgang fra tarmen

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Creon® ved temperaturer over 25 °C.
- Tag ikke Creon® efter den udløbsdato (Exp), der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. Opbevar Creon® i original beholder da det er følsomt for fugt.
- Tag brug ikke Creon®, hvis de viser tydelige tegn på nedbrydning.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skralde-spanden.

6. Yderligere oplysninger

Creon® 10.000, hårde enterokapsler indeholder:

- Pankreatin svarende til
- amylase 8.000 EP-enheder
 - lipase 10.000 EP-enheder
 - protease 600 EP-enheder

Creon® 25.000, hårde enterokapsler indeholder:

- Pankreatin svarende til
- amylase 18.000 EP-enheder
 - lipase 25.000 EP-enheder
 - protease 1.000 EP-enheder

Creon® 40.000, hårde enterokapsler indeholder:

- Pankreatin svarende til
- amylase 25.000 EP-enheder
 - lipase 40.000 EP-enheder
 - protease 1.600 EP-enheder

Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 4000, hypromellosephthalat, cetylalkohol, triethylcitrat, dimeticon, gelatine, jernoxid (E172), titandioxid (E171) og natriumlaurylsulfat.

Pakningsstørrelser

Creon® fås i:
Creon® 10.000 pakninger med 100 enterokapsler.
Creon® 25.000 pakninger med 100 enterokapsler.
Creon® 40.000 pakninger med 100 enterokapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af:

Abacus Medicine A/S
Vesterbrogade 149
DK-1620 København V.
Tel: +45 70 22 02 12
e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 01.2011