

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Colifoam® 100 mg/dosis, rektalskum

Hydrocortisonacetat

05-2013
P079782-4

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Colifoam® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Colifoam®
3. Sådan skal du bruge Colifoam®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Colifoam®, rektalskum er et svagt virkende binyrebarkhormon, som bruges til behandling af betændelse i endetarmens slimhinder (Proctitis).

Lægen kan have givet dig Colifoam® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE COLIFOAM®

Brug ikke Colifoam® hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for hydrocortisonacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer (se "Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Colifoam®").
- har forstoppelse.
- har hul i eller bylder på tarmvæggen.
- har svampe, virus- eller bakterieinfektioner i endetarmen.
- er blevet opereret i tarmen for nylig.
- lider af omfattende fistler (rørformede kanaler mellem organer eller fra de indre organer f.eks. tarmen til huden).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Colifoam®

Tal med din læge, hvis du

- er barn.
- bruger Colifoam i længere tid.
- har mave-tarmlidelser.
- har infektion hvor årsagen ikke er fundet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Colifoam® efter aftale med lægen.

Amning

Du kan bruge Colifoam®, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Colifoam® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Colifoam®

Colifoam® indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) som kan give allergiske reaktioner, samt propylenglykol som kan give irritation af huden.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE COLIFOAM®

Brug altid Colifoam® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn


100 mg (1 fyldt dosisapplikator, ca. 5 ml) i endetarmen 2-3 gange dagligt i to til tre uger. Derefter hver anden dag i to til tre uger.

Brugsanvisning


1. Ryst beholderen kraftigt i ca. 30 sekunder før brug.




2. Det blå stempel trækkes ud til målestregen, ca. 1 cm fra kanten af sprøjten.




3. Sæt beholderens mundstykke lodret på sprøjten.




4. Tryk forsigtigt beholderens mundstykke ned, så skummet fylder ca. 1/4 af sprøjten og slip derefter mundstykket.




5. Vent et par sekunder til skummet ikke udvides mere.



6. Gentag processen, tryk/vent til skummet udvides og netop når målestregen. Tryk ikke vedvarende for at fylde sprøjten på én gang.



7. Før sprøjtespidsen ind i endetarmen og tryk stemplet i bund så sprøjten tømmes.



OBS! Beholderen må aldrig bruges direkte i endetarmen.

Rengøring:

Sprøjten skilles ad efter brug og rengøres grundigt.

Husk

Der er normalt luftlommer i skummet. Ved korrekt brug giver beholderen ca. 14 doser.

Hvis du har brugt for meget Colifoam® rektalskum

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Colifoam® rektalskum end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Colifoam®

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Colifoam®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Colifoam® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne til meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter.

- Diarré.
- Lokal brændende følelse.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Colifoam® ved almindelig temperatur.

Beskyt beholderen mod sollys, temperaturer over 50 °C og under 0 °C, da beholderen indeholder en brandfarlig drivgas.

Efter brug må beholderen ikke brændes eller punkteres.

Brug ikke Colifoam® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Colifoam® 100 mg/dosis rektalskum indeholder:

Aktivt stof: Hydrocortisonacetat.

Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, stearylalkohol ethoxyleret, polyoxyethylen (10), stearylether, cetylalkohol, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), trolamin, renset vand, isobutanol, propan.

Pakningsstørrelse

Colifoam® 100 mg/dosis fås i en pakningsstørrelse á 20,8 gram rektalskum.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Colifoam® er et registreret varemærke, der tilhører Meda AB.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2013.