

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Elocom®
3. Sådan skal du bruge Elocom®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Elocom® indeholder et stærkt binyrebarkhormon. Elocom® dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslet, eksem eller psoriasis.

Du kan bruge Elocom® til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Elocom®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Elocom® hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for mometasonfuroat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Elocom® (angivet i afsnit 6).
- har betændelse i huden, som skyldes bakterier eller svampe, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
- har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næse, kinder, hage og pænde (rosacea).
- har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- har bumser, eller på områder med bumser.
- har tynd og skrøbelig hud (hudatrofi).
- har kløe ved endetarmsåbning eller kønsdele.
- har udslet opstået ved gnidning på huden.
- har sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper, helvedesild, vorter forårsaget af papillomavirus, kønsvorter og andre vorter).
- har svampeinfektion (candida eller dermatofyter).
- har tuberkulose.
- har syfilis.
- har reaktioner efter vaccine.
- har hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.
- har sår på huden eller hud der er i stykker.

Advarsler og forsigtighedsregler

- Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.

- Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er tegn på betændelse i huden.
- Du bør ikke anvende Elocom® i og omkring øjnene.
- Bør ikke anvendes til børn under 2 år.
- Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Elocom® hvis

- huden bliver mere irriteret, rødt, eller klør og svier.
- huden er betændt og der ikke sker en tydelig bedring.
- præparatet anvendes i hovedbunden eller i ansigtet.
- du har kløe i og omkring kønsdelene.

Brug af anden medicin sammen med Elocom®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Elocom® sammen med anden medicin.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Elocom®. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Elocom® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Elocom® påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Elocom® indeholder propylenglycolmonostearat og stearylalkohol

Elocom® indeholder propylenglycolmonostearat, der kan give irritation af huden. Elocom® indeholder stearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Elocom® creme

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er Voksne

Påsmøres i et tyndt lag en gang dagligt.

Børn og unge

Du må kun bruge Elocom® til børn og unge efter lægens anvisning.

Når du har fået den ønskede virkning af Elocom®, bør du gradvist trappe ud af behandlingen efter vejledning fra din læge.

Vask hænder efter påsmøring, med mindre du skal behandle hænderne.

Du kan eventuelt bruge handsker til påsmøring.

Undgå at få Elocom® i øjnene.

Hvis du har brugt for meget Elocom® creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Elocom® creme, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Elocom® 0,1% creme.

Ved overdreven eller langvarig brug af Elocom® kan der ses symptomer som:

Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken.

Hvis du har glemt at bruge Elocom®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Elocom®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Ny betændelse kan opstå på det behandlede område.
- Tynd hud, der let går i stykker/skør hud.
- Strækmærker.
- Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
- Små punktformede eller større blødninger i huden pga. bristede blodkar.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Langvarig brug af meget store doser kan føre til hæmning af binyrebarkfunktionen.
- Øget behåring hos kvinder, evt. skægvekst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
- Overfølsomhed over for mometasonfuroat.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Betændelse i hårsække.
- Brændende følelse, prikken/svie, kløe.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Sløring af infektion, forværring af infektion, infektion, bylder.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelseløshed i huden.
- Tydelige små blodkar i huden.
- Rødmen af huden.
- Kontaktteksem.
- Lyse pletter på huden (mindre pigment).
- Smerter eller anden reaktion på applikationsstedet.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Elocom® utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Elocom® ved almindelig temperatur.

Brug ikke Elocom® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Anv. før) er den sidste dag i den foregående måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Elocom® indeholder:

Aktivt stof: Mometasonfuroat 1 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer: Hvid vaselin; hvid voks; propylenlycolmonostearat; stearylalkohol og ceteareth-20; hexylenglycol; aluminiumstivelseoctenylsuccinat; phosphorsyre; fosfatidylcholin, hydrogeneret (fra soja); titandioxid (E 171) og rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvidt creme i aluminiumstube, med åbningsspids i skruelåget.

Pakningsstørrelser

Elocom® creme fås i pakningsstørrelser á 60 g og 120 (2x60) g.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Elocom® creme er et registreret varemærke, der tilhører Merck Sharp & Dohme Corp.

Elocom® creme svarer til Elocon® creme.

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2014