

# Citalopram EuroPharma 30 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram (som hydrobromid)

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, Du vil vide.
- Lægen har ordineret Citalopram EuroPharma til dig personligt. Lad derfor være med at give Citalopram EuroPharma til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

**Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram EuroPharma
3. Sådan skal du tage Citalopram EuroPharma
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

**1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

Citalopram EuroPharma er et middel mod depression. Det tilhører en gruppe af medicin, som kaldes SSRI. Citalopram EuroPharma øger mængden af et vigtigt stof (serotonin) i hjernen. Mangel på det er en af årsagerne til de fleste depressioner.

Du kan få Citalopram EuroPharma til:

- behandling af depression.
- forebyggelse af tilbagevendende depression.
- behandling af panikangst.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

**2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CITALOPRAM EUROPHARMA**

**Tag ikke Citalopram EuroPharma**

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for citalopram, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Citalopram EuroPharma.
- Hvis du tager pimozid (medicin mod sindsslidelser).
- Hvis du tager linezolid (et antibiotikum).
- Hvis du tager en type medicin kaldet MAO-hæmmere, som også bruges md depression (isocarboxazid eller moclobemid) eller mod Parkinsons sygdom (mere end 10 mg selegilin dagligt eller rasagilin).
- Hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af hvordan hjertet fungerer).
- Hvis du tager medicin mod et hjerterytme problem eller der kan påvirke hjerterytmen.

Se også afsnittet "Brug af anden medicin" nedenfor.

Du må først tage Citalopram EuroPharma 2 uger efter, du er stoppet med at tage en MAO-hæmmer. Dog kan du begynde behandlingen med Citalopram EuroPharma et døgn efter, du er stoppet med at tage moclobemid. Efter at du er stoppet med Citalopram EuroPharma, skal der gå 1 uge, før du tager MAO-hæmmere.

**Vær ekstra forsigtig med at tage Citalopram EuroPharma**

Tal med lægen inden du tager Citalopram EuroPharma, hvis:

- Du har selvmordstanker, eller ønsker om, at gøre skade på dig selv.
- Du har dårlig lever.
- Du har meget dårlige nyrer.
- Du har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald.
- Du har diabetes, da Citalopram EuroPharma kan påvirke din blodglukose. Du bør måle din

blodglukose hyppigt og evt. tale med lægen om ændret behandling.

- Du lider af mani eller har haft mani.
- Du let kommer til at bløde eller tidligere har haft blødningsforstyrrelser (blødning fra hud eller slimhinder, mave, tarm eller livmoder).
- Du tager medicin, der påvirker blodets evne til at størkne (f.eks. acetylsalicylsyre og warfarin).
- Du tager naturmedicin, som indeholder perikon (*Hypericum perforatum*).
- Du får elektrochokbehandling (ECT).
- Du har nedsat natrium i blodet – det gælder især ældre i behandling med vanddrivende medicin.
- Du har tendens til nogle særlige forandringer i hjertekurven (EKG, forlængelse af QT-intervallet).
- Du er ældre.
- Hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nyligt har haft et hjerteanfald.
- Hvis du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diaré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).
- Hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.

Citalopram EuroPharma bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, med mindre lægen skønner det er nødvendigt.

Kontakt lægen, hvis:

- Du får feber, muskelstivhed eller rysten, forvirring, irritation, sygelig opstemthed og uro. Tilstanden er sjælden, men kan være livsfarlig. Kontakt derfor straks læge eller skadestue.
- Du får en manisk episode (sygelig opstemthed og uro).
- Du bliver rastløs på en ubehagelig måde i de første uger af behandlingen.
- Du får kramper eller din epilepsi bliver værre.

Du bør være opmærksom på følgende:

- Hvis du er under 18 år, har du en øget risiko for bivirkninger, som selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed f.eks. i form af truende eller voldelig adfærd, trodsighed samt vrede, hvis du tager Citalopram EuroPharma, eller anden medicin af samme type (SSRI). Lægen vurderer, hvad der er den bedste behandling for dig.
- Du bør undgå at drikke alkohol, når du tager Citalopram EuroPharma.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Citalopram EuroPharma. Det kan påvirke prøveresultaterne.

**Selvmodstanker og forværring af din depression eller angst**

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

- Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv
- Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, **bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.**

**Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende** om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan

eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.

**Afvænnings symptomer set ved ophør med selektive serotoninoptagshæmmere (SSRI)**

Du kan opleve afvænnings symptomer, når du holder op med at tage Citalopram EuroPharma, især hvis det sker brat. (se "Sådan skal du tage Citalopram EuroPharma" og "Bivirkninger"). Dette er almindeligt, når behandlingen afbrydes. Risikoen er størst, hvis man har taget Citalopram EuroPharma i lang tid eller i høje doser, eller hvis dosis nedsættes for hurtigt. De fleste mennesker oplever, at symptomerne er milde og forsvinder af sig selv inden for to uger. Dog kan de hos nogle patienter være mere alvorlige eller længerevarende (2-3 måneder eller mere).

Kontakt lægen, hvis du får alvorlige afvænnings symptomer, når du holder op med at tage Citalopram EuroPharma. Lægen vil måske ordinere, at du tager tabletterne igen og derefter afbryder behandlingen mere gradvist.

**Brug af anden medicin**

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Citalopram EuroPharma sammen med følgende medicin kan give alvorlige bivirkninger:

- Medicin mod sindsslidelser (pimozid). Du må ikke bruge Citalopram EuroPharma sammen med Pimozid.
- Medicin mod depression (non-selektive monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), der indeholder phenazin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid og tranlylcypromin som det aktive stof). Hvis du har taget et af disse midler, skal der gå 14 dage, før du begynder at tage Citalopram EuroPharma. Efter ophør med Citalopram EuroPharma skal der gå 7 dage, før du begynder at tage disse midler.
- Anden medicin mod depression (reversible, selektive MAO-A hæmmere, der indeholder moclobemid). Du må ikke bruge Citalopram EuroPharma sammen med moclobemid.
- Antibiotika (linezolid).
- Medicin mod Parkinsons sygdom. Du må ikke tage mere end 10 mg selegilin dagligt eller rasagilin.

TAG IKKE Citalopram EuroPharma hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazin derivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacilin, moxifloxacilin, erytromycin IV, pentamidin, malaria behandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastine). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

Tal med din læge, hvis du bruger:

- Medicin mod mani og depression (lithium).
- Visse proteindrikke mod nedsat appetit eller kosttilskud, som indeholder aminosyren tryptophan.
- Medicin mod migræne (f.eks. sumatriptan).
- Medicin mod stærke smerter (tramadol).
- Medicin mod smerter/gigtmedicin (acetylsalicylsyre, NSAID).
- Medicin til rygeafvænnning (bupropion).
- Medicin mod malaria (mefloquin).
- Medicin mod for meget mavesyre og mavesår (cimetidin, omeprazol, esomeprazol og lansoprazol). Virkningen

- og bivirkninger af Citalopram EuroPharma kan blive øget.
- Naturlægemidler, som indeholder prikbladet perikon (*Hypericum perforatum*). Der er øget risiko for bivirkninger ved samtidig brug af Citalopram EuroPharma.
- Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin og dipyrindamol), da der er en øget risiko for blødningsforstyrrelser.
- Hjertemedicin og medicin for blodtrykket (flecainid, propafenon og metoprolol).
- Anden medicin mod depression (f.eks. fluvoxamin, imipramin, desipramin, clomipramin og nortriptylin).
- Medicin mod sindsslidelser (f.eks. haloperidol, perphenazin, zuclophenitxol).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Citalopram EuroPharma, og Citalopram EuroPharma kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

**Brug af Citalopram EuroPharma sammen med mad og drikke**

Du kan tage Citalopram EuroPharma i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Citalopram EuroPharma øger ikke virkningen af alkohol. Du bør dog ikke drikke alkohol, mens du er i behandling med Citalopram EuroPharma.

**Graviditet og amning**

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

**Graviditet**

Hvis du er gravid, må du kun tage Citalopram EuroPharma efter aftale med lægen. Fortæl det til lægen, hvis du er gravid, eller hvis du mener, at du er gravid.

Hvis du tager Citalopram EuroPharma i den sidste del af graviditeten kan det nyfødte barn få alvorlige bivirkninger eller abstinenser bl.a. åndenød, kramper, sløvhed, søvnbesvær, blåfarvning af hud og slimhinder pga. iltmangel, regelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, temperatursvingninger, besvær med fødeindtagelse, opkastning, lavt blodsukker (mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og koma), øget muskelspænding, nedsat kraft i musklerne, stærke reflekser, rysten anspændthed, irritabilitet, konstant gråd, døsigheid. Bivirkningerne forekommer typisk indenfor 24 timer efter fødslen.

Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Citalopram EuroPharma. Når medicin som Citalopram EuroPharma tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.

Du bør ikke stoppe behandlingen brat under graviditet. Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen.

**Amning**

Hvis du ammer, må du ikke tage Citalopram EuroPharma, da det går over i modermælken. Tal med lægen.

**Trafik- og arbejdssikkerhed**

Citalopram EuroPharma kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Du bør derfor ikke køre bil, motorcykel eller cykel, eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du føler dig svimmel eller søvrig, når du begynder at tage medicinen. Vent med at køre bil mv. til disse virkninger er aftaget.

## Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Citalopram EuroPharma

Citalopram EuroPharma indeholder lactose. Kontakt lægen, inden du begynder at tage Citalopram EuroPharma, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

### 3. SÅDAN SKAL DU TAGE CITALOPRAM EUROPHARMA

Tag altid Citalopram EuroPharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Der er stor forskel på, hvor meget den enkelte patient skal tage. Det afhænger bl.a. af hvor alvorlig din sygdom er.

#### Voksne

##### *Depression*

Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt.

##### *Panikangst*

Startdosis er 10 mg dagligt i den første uge inden dosis kan øges til 20 mg dagligt. Dosis kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt.

##### *Tvangstanker (OCD)*

Startdosis er 20 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt.

#### Ældre (over 65 år)

Startdosis bør reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20 mg dagligt. Ældre patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg dagligt.

#### Børn og unge under 18 år

Du må kun bruge Citalopram EuroPharma til børn og unge under 18 år efter lægens anvisning.

#### Risikopatienter

Patienter med leverproblemer bør ikke få mere end 20 mg dagligt.

#### Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

#### Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

#### Nedsat nedbrydning af Citalopram

Startdosis er 10 mg dagligt i de første to behandlingsuger. Dette kan øges af din læge til 20 mg dagligt.

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge Citalopram EuroPharma 30 mg filmovertrukne tabletter til alle de anførte doseringer eller anvendelsesområder.

### Hvordan og hvornår skal Citalopram EuroPharma tages

Du skal tage Citalopram EuroPharma hver dag som en enkelt daglig dosis. Du kan tage Citalopram EuroPharma når som helst på dagen uden mad eller i forbindelse med et måltid. Synk tabletterne med lidt vand. Du må ikke tygge dem.

#### Varighed af behandlingen

Som med andre lægemidler mod depression og panikangst kan der gå nogle uger, før du mærker en bedring.

Du må ikke ændre din dosis af Citalopram EuroPharma uden at have talt med lægen.

Det er lægen, der afgør, i hvor lang tid du skal behandles. Det er normalt, at behandlingen varer i mindst 6 måneder. Fortsæt med at tage Citalopram EuroPharma i den periode, lægen har anbefalet. Hold ikke op med at tage Citalopram EuroPharma, selv om du begynder at få det bedre, medmindre lægen anbefaler det. Selve sygdommen kan vare ved i lang tid, og hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan symptomerne vende tilbage.

Hvis du har tilbagevendende depressioner kan du have gavn af at fortsætte behandlingen, for at forebygge nye depressioner, somme tider i flere år.

#### Hvis du har taget for mange Citalopram EuroPharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Citalopram EuroPharma, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på en overdosis af citalopram kan være kramper, hurtig, langsom eller uregelmæssig puls, hjertestop, sløvhed (søvntrang), koma, kvalme og opkastning, feber, muskelstivhed eller rysten, forvirring, irritation, sygelig opstemthed og uro, svimmelhed, udvidede pupiller, muskelsvækkelse, smerter i musklerne, feber, evt. rød urin, svedtendens, åndenød og blå læber pga. iltmangel.

#### Hvis du har glemt at tage Citalopram EuroPharma

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

#### Hvis du holder op med at tage Citalopram EuroPharma

Kontakt lægen hvis du ønsker at stoppe eller holde pause i behandlingen med Citalopram EuroPharma.

Brat afbrydelse af behandlingen kan give lettere og forbigående abstinenser som svimmelhed, myrekryb, prikken/snurren i huden, søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, mareridt, søvnløshed), angst og uro, hovedpine, kvalme, opkastning, svedtendens, rysten, forvirring, følelsesmæssig uligevægtighed eller irritabilitet, diarré, synsforstyrrelser, hjertebanken.

Når du har gennemført den planlagte behandling, vil lægen derfor nedsætte din dosis af Citalopram EuroPharma gradvist i løbet af nogle uger.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

### 4. BIVIRKNINGER

Citalopram EuroPharma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

#### Alvorlige bivirkninger

Hvis du oplever nogle af følgende symptomer skal du stoppe med at tage Citalopram EuroPharma og kontakte din læge omgående:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Høj feber, ophidselse, forvirring, skælven og pludselige muskelsammentrækninger. Det kan være tegn på en sjælden tilstand, der kaldes serotoninisyndrom. Kontakt lægen, hvis du har det sådan.
- Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.
- Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse som kan være symptom på en livstruende tilstand, der kaldes Torsade de Pointes.

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med citalopram eller kort efter behandlingsophør.

#### Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Sløvhed, søvnløshed.
- Mundtørhed, kvalme.
- Øget svedtendens.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hjerteranken.

- Nedsat appetit, vægttab.
- Nervøsitet, angst, koncentrationsbesvær, rastløs uro, drømmeforstyrrelser, nedsat seksualdrift, ligegyldighed, forvirring, unormal orgasme hos kvinder.
- Rysten, prikkende snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, svimmelhed, opmærksomhedsforstyrrelser.
- Nedsat evne til at se skarpt.
- Susen for ørerne (tinnitus).
- Snue, gaben.
- Forstoppelse, diarré, opkastning, mavesmerter, sure opstød, øget spytdannelse, luft i maven.
- Kløe.
- Muskelsmerter, smerter i leddene.
- Vandladningsforstyrrelser, uregelmæssig menstruation, problemer med sædudtømning, impotens.
- Appetitmangel, hovedpine, kraftig sveden, kraftesløshed og svaghed, almindelig sygdomsfølelse, træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Øget appetit, vægtøgning.
- Opstemthed, uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person.
- Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
- Opstemthed (manisk). Kan være alvorligt. Tal med lægen.
- Besvimelse. Ved normal puls og vejtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
- Store pupiller.
- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hoste, åndenød. Åndenød kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Øget følsomhed af huden for lys, nældefeber, hårtab, udslæt, mindre blødning i hud og slimhinder.
- Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Unormal kraftig menstruationsblødning, udebleven orgasme hos kvinder.
- Hævelser.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
- Ufrivillige bevægelser, smagsforstyrrelser.
- Blødninger.
- Feber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Overfølsomhed.
- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Panikanfald, tænderskæren, rastløshed.
- Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser, rokkende, vridende bevægelser især med benene, bevægelsesforstyrrelser.
- Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan bære alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Synsforstyrrelser.

- Næseblod.
- Unormale levertal.
- Blødninger i huden.
- Uregelmæssig, kraftig menstruationsblødning, mælkesekretion.

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

Citalopram EuroPharma kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

#### Ophørssymptomer set ved ophør med Citalopram EuroPharma

Det er almindeligt med ophørssymptomer ved afbrydelse af behandlingen med Citalopram EuroPharma. Der er indberettet følgende symptomer: Svimmelhed, stikkende eller snurrende fornemmelse i huden, søvnforstyrrelser (inklusive søvnløshed og intense drømme), uro eller angst, kvalme og/eller opkastning, rystelser og hovedpine. Oftest er disse symptomer milde og forsvinder af sig selv. Dog kan de hos nogle patienter være mere alvorlige og/eller længerevarende.

Når behandlingen med Citalopram EuroPharma ikke længere er nødvendig, anbefales det derfor at den afbrydes ved gradvist at nedsætte dosis (se pkt. 2 og 3).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

#### Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk), eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

### 5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Citalopram EuroPharma ved temperaturer over 25 °C.

Tag ikke Citalopram EuroPharma efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

### 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

#### Citalopram EuroPharma 30 mg filmovertrukne tabletter indeholder

- Aktivt stof: Citalopram (som hydrobromid).
- Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, lactosemonohydrat, mikrokrySTALLINSK cellulose, povidon, crospovidon, magnesiumstearat. Tabletovertræk: Hypromellose, lactosemonohydrat, macrogol 4000, titandioxid (E171).

#### Udseende og pakningsstørrelser

Citalopram EuroPharma 30 mg er hvide, ovale filmovertrukne tabletter præget med "CM / 30" på den ene side og "G" på den anden. Tabletterne kan deles i to lige store dele.

Citalopram EuroPharma fås i pakninger med 28 og 98 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen EuroPharmaDK

Oddesundvej 39  
6715 Esbjerg N.

#### Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK  
Oddesundvej 39  
6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)