

Dovonex® 50 mikrogram/g creme

calcipotriol

0274985903

Dovonex® svarer til lægemidlet Daivonex®.

Dovonex® og Daivonex® er registrerede varemærker, som tilhører LEO Pharma A/S.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen


- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Dovonex® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Dovonex® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:


1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dovonex®
3. Sådan skal De bruge Dovonex®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE


De kan bruge Dovonex® creme til behandling af psoriasis. I psoriasis hud deler cellerne sig så hurtigt, at de ikke når at modnes. Dette viser sig ved rødme, skæl og fortykkelse af huden (fig. 1).




Dovonex® creme får hudcellerne til at dele sig normalt (fig. 2,3,4).



Efter 2 ugers behandling med Dovonex® creme kan De ofte se en forbedring af din psoriasis.



Skællene plejer at forsvinde først.



Hudens rødme er normalt længere tid om at forsvinde.

De kan bruge Dovonex® til behandling af psoriasis både alene eller sammen med hormonsalve eller hormoncreme.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE DOVONEX®**Brug ikke Dovonex® hvis:**

- De er overfølsom overfor calcipotriol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Dovonex®.
- De har forstyrrelser i kalkstofskiftet.

Særlige forholdsregler

De bør ikke bruge Dovonex® i ansigtet på grund af risiko for irritation af huden.

De skal vaske hænderne, efter De har brugt Dovonex® for at undgå, at cremen kommer i ansigtet. Er det Deres hænder, De skal behandle, skal De passe på med ikke at få Dovonex® i ansigtet. Brug evt. bomuldshandsker efter påsmøring af cremen.

Undgå overdreven solbadning, overdreven brug af solarium og anden form for lysbehandling.

Hvis De bruger mere Dovonex® end anbefalet, kan De risikere, at indholdet af kalk i blodet bliver for højt. Symptomer på for højt kalk i blodet er nedsat koncentrationsevne, træthed, forstoppelse, tørst og nedsat muskelkraft. Kalkindholdet i Deres blod bliver normalt igen, når De stopper med at bruge Dovonex®.

Tal med lægen, hvis De har:

- Dårlige nyrer.
- Dårlig lever.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

De kan bruge Dovonex® sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må kun bruge Dovonex® efter lægens anvisning.

Amning

Erfaringerne med Dovonex® er begrænsede. De bør derfor ikke bruge Dovonex®, hvis De ammer. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dovonex® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dovonex®

Dovonex® indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem).

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE DOVONEX® Voksne:

Smør Dovonex® på den angrebne hud 1-2 gange dagligt. I starten af behandlingen skal De sædvanligvis bruge cremen 2 gange dagligt.

Derefter kan De efter behov nøjes med 1 gang dagligt.

Bruger De Dovonex® sammen med hormoncreme eller hormonsalve, skal De ikke bruge de to ting samtidig. Brug fx Dovonex® om morgenen og hormonsalve eller hormoncreme om aftenen.

De må højst bruge 100 g Dovonex® om ugen. Skal De bruge Dovonex® creme sammen med Dovonex® salve eller Dovonex® kutanopløsning til hårbunden, bør den samlede mængde af det aktive stof calcipotriol ikke overstige 5 mg om ugen. Dette svarer til, at De bruger fx 50 ml kutanopløsning og 50 g salve eller creme om ugen.

Brug altid Dovonex® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Brugsanvisning

Smør cremen i et tyndt lag på den angrebne hud. De bør ikke bruge cremen i ansigtet. Vask hænderne efter De har brugt cremen, så De undgår, at få cremen i ansigtet. Skal De bruge cremen på hænderne, kan De evt. bruge et par bomuldshandsker efter påsmøring af cremen.

Hvis De har brugt for meget Dovonex® creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Dovonex®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Hvis De har brugt for meget af Dovonex®, kan indholdet af kalk i blodet blive for højt. Symptomer på for højt kalk i blodet er nedsat koncentrationsevne, træthed, forstoppelse, tørst og nedsat muskelkraft. Kalkindholdet i Deres blod bliver normalt igen, når De stopper med at bruge Dovonex®.

Hvis De har glemt at bruge Dovonex®

Hvis De har glemt at bruge Dovonex®, skal De bare fortsætte med næste dosis. De skal ikke bruge dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at bruge Dovonex®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Dovonex® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Overfølsomhedsreaktioner med hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Kløe, hudirritation, brændende og stikkende fornemmelse, tør hud, rødmen i huden, hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Kontakteksem, eksem, forværring af psoriasis.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Forbigående farveændringer i huden, øget følsomhed af huden over for lys, nældefeber, hævelse omkring øjnene.
- Forhøjet kalk i blod og urin. Symptomer på for højt kalk i blodet er nedsat koncentrationsevne, træthed, forstoppelse, tørst og nedsat muskelkraft. Forhøjet kalk i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kræver behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar Dovonex® utilgængeligt for børn.
- Dovonex® må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.
- Brug ikke Dovonex® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dovonex® creme indeholder:

- Aktivt stof: Calcipotriol som calcipotriolmonohydrat.
- Øvrige indholdsstoffer:
Macrogolcetostearylether, cetostearylalkohol, chlorallylhexaminchlorid, dinatriumedetat, natriumhydroxid, dinatriumphosphatdihydrat, glycerol 85 %, paraffinolie, hvid blød paraffin og rensset vand.

Dovonex®s udseende og pakningsstørrelse:

Dovonex® creme findes i pakningsstørrelserne 60 g og 120 g. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2010