

Minirin Melt[®] 120 mikrogram smeltetabletter

Desmopressin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Minirin Melt[®] til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Minirin Melt[®]
3. Sådan skal De tage Minirin Melt[®]
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Minirin Melt[®] virker ved at nedsætte produktionen af urin.

De kan bruge Minirin Melt[®]:

- mod ufrivillig vandladning hos børn (Enuresis nocturna)
- mod hyppig natlig vandladning hos voksne (nocturi)
- ved meget stor urindannelse (diabetes insipidus)

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE MINIRIN MELT[®]

Tag ikke Minirin Melt[®] hvis De:

- er overfølsom (allergisk) over for desmopressin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- har unormalt stor tørst, som skyldes vane eller psykiske problemer.
- har dårligt hjerte eller andre sygdomme, som De får vanddrivende medicin for.
- har nyresygdom.
- har kendt lavt natrium i blodet.
- har for meget af et hormon, der nedsætter Deres dannelse af urin.

Vær ekstra forsigtig med at tage Minirin Melt[®]:

Hvis De tager Minirin Melt[®] mod ufrivillig vandladning, skal De drikke så lidt som muligt fra 1 time før De tager Minirin Melt[®] til næste morgen (mindst 8 timer).

Behandling uden begrænsning af væskeindtaget kan føre til væskeophobning i kroppen. Kontakt lægen hvis De får symptomer som hovedpine, kvalme/opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde kræmper.

Ældre og patienter med lavt serumnatrium kan have øget risiko for lavt natrium i blodet. Tal med lægen inden De tager Minirin Melt[®].

De skal stoppe behandlingen hvis De får infektioner, feber eller betændelse i mave og tarm.

Tal med lægen inden De tager Minirin Melt[®] hvis De er i behandling med tricykliske antidepressiva (midler mod depression), selektive serotoninoptagshæmmere (midler mod depression), chlorpromazin (middel sindssygdom), carbamazepin (middel mod epilepsi) eller NSAID'er (smertestillende midler).

Brug af anden medicin:

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Fortæl lægen, hvis De er i behandling med medicin mod:

- depression (tricykliske antidepressiva, selektive serotoninoptagshæmmere)
- sindssygdom (chlorpromazin)
- epilepsi (carbamazepin)
- smerter (NSAID)
- diarré (loperamid)

Brug af Minirin Melt[®] sammen med mad og drikke:

De skal drikke så lidt som muligt fra 1 time før De tager Minirin Melt[®] til næste morgen (mindst 8 timer).

Ved lave doser kan indtagelse af mad reducere virkningen af Minirin Melt[®].

Graviditet og amning:

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun tage Minirin Melt[®] efter lægens anvisning.

Amning:

De kan amme, selv om De tager Minirin Melt[®].

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Minirin Melt[®] påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Minirin Melt[®]:

Minirin Melt[®] indeholder mannitol, som kan have en mild afførende virkning.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE MINIRIN MELT[®]

Tag altid Minirin Melt[®] nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Minirin Melt[®] fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at De ikke nødvendigvis kan bruge Deres Minirin Melt[®] til alle de anførte doseringer.

De skal lægge smeltetabletten under tungen, hvor den opløses. De må ikke drikke vand samtidig med, De tager smeltetabletten.

Hvis der opstår tegn eller symptomer på væskeophobning og/eller nedsat natriumindhold i blodet (hovedpine, kvalme/opkastning, vægtøgning og, i alvorlige tilfælde, kræmper) skal De afbryde behandlingen og kontakte lægen.

Er den ønskede effekt ikke opnået efter 4 uger bør behandlingen stoppes. Følg lægens anvisninger.

Den sædvanlige dosis er:

Ufrivillig natlig vandladning hos børn (Enuresis nocturna):

Børn over 5 år:

Startdosis er normalt 1 smeltetablet på 120 mikrogram ved sengetid.

Hvis denne dosis ikke er effektiv kan lægen øge dosis til 240 mikrogram.

Er De i langtidsbehandling skal De hver 3. måned holde en pause på en uge.

Hyppig natlig vandladning hos voksne (Nocturi):

Voksne:

Startdosis er normalt 1 smeltetablet på 60 mikrogram ved sengetid.

Hvis De ikke mærker nogen virkning kan lægen sætte dosis op efter en uge til 1 smeltetablet på 120 mikrogram. Herefter evt. til 240 mikrogram.


Meget stor urindannelse (Diabetes insipidus):

Voksne og børn:

Dosis er individuel. Den normale startdosis er 1 smeltetablet på 60 mikrogram tre gange daglig. Ofte er den daglige vedligeholdelsesdosis 1-2 smeltetablet på (60-120 mikrogram) 3 gange daglig.

Ældre: De må kun tage Minirin Melt[®] efter lægens anvisning.


Brugsanvisning:



1. Fjern endestykket helt, startende fra det hjørne, hvor symbolet af en hånd er printet.

2. Bræk blisterenheden fri langs den lodrette stiplede linje.

3. Træk folien af. Start i hjørnet, med den printede pil. Smeltetabletten kan herefter fjernes fra pakningen.



4. For at få fat i den næste smeltetablet, trækkes blisterenheden fra langs den vandrette stiplede linje.



Hvis De har taget for mange Minirin Melt®:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Minirin Melt® smeltetabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

- Overdosering kan føre til:
- Forlænget virkning
- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet.
- Ophobning af væske i kroppen. Kan i alvorlige tilfælde vise sig ved krampes og bevidstløshed.

Hvis De har glemt at tage Minirin Melt®:

Glemmer De en dosis, så fortsæt med almindelig dosering. De må ikke tage dobbeldosis som erstatning for den glemte smeltetablet.

4. BIVIRKNINGER

Minirin Melt® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ved behandling af voksne:

Alvorlige bivirkninger:

Hyppighed ikke kendt:

- Allergiske reaktioner med pludseligt hududslæt, åndenød, bryst smerter og evt. Bevidstløshed. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Søvnliggende bevidsthedsvækkelse. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos over 10 ud af 100 patienter):

- Hovedpine.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Mavesmerter, kvalme, diarre, forstoppelse, opkastninger.
- Svimmelhed, træthed.
- Kvalme utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For Lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkrampes og koma. Tal med lægen.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Vand i kroppen. Kontakt lægen.
- Problemer med vandladninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Søvnløshed.
- Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
- Synsforstyrrelser.
- Hjertebanken
- Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende, eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
- Åndedrætsbesvær.
- Sure opstød, halsbrand, luftafgang fra tarmen, oppustethed.
- Svedtendens, Kløe, udslæt, nældefeber.
- Muskelspasmer, muskelsmerter.
- Bryst smerter, influenzalignende symptomer.
- Vægtøgning.
- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlige med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Forvirring.
- Allergiske hudreaktioner.

Hyppighed ikke kendt:

- Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
- Tørst pga. for højt natrium i blodet. Forhøjet natrium kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med krampes, bevidstløshed og koma. Tal med lægen.

Ved behandling af børn:

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Søvnliggende bevidsthedsvækkelse. Kontakt lægen.

Hyppighed ikke kendt:

- Allergiske reaktioner med pludseligt hududslæt, åndenød, bryst smerter og evt. Bevidstløshed. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hovedpine

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Humørsvingninger.
- Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
- Hævede fødder, ankler og hænder (ved langtidsbehandling).
- Kvalme, mavesmerter, diarre, opkastninger.
- Vand i kroppen. Kontakt lægen.
- Problemer med vandladninger.
- Træthed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Angstsymptomer, mareridt.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Irritation.

Hyppighed ikke kendt:

- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. For lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkrampes og koma. Tal med lægen.
- Abnormal adfærd, emotionelle forstyrrelser, depression, hallucinationer, søvnløshed.
- Koncentrationsforstyrrelser, uro i benene, krampes.
- Næseblod.
- Allergiske hudreaktioner, svedtendens, udslæt, nældefeber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Minirin Melt® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i original emballage, da Minirin Melt® er fugtfølsomt.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Minirin Melt® indeholder:

- Aktivt stof: Desmopressin 120 mikrogram.
- Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, mannitol, citronsyre, vandfri.

Pakningsstørrelser:

Minirin Melt® findes i pakninger med 30 smeltetabletter og 100 smeltetabletter.

Alle pakningsstørrelser er nødvendigvis ikke markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af
markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Minirin Melt® er et registreret varemærke, der tilhører Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S.

Den seneste udgave af indlægssedlen kan ses på www.indlaegsseddel.dk.