

Salazopyrin® 500 mg, tabletter

sulfasalazin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Salazopyrin® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Salazopyrin®
3. Sådan skal du tage Salazopyrin®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Salazopyrin® virker ved at forhindre betændelse i tarmen.

Du kan bruge Salazopyrin® til behandling af blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) og kronisk betændelse i mave og tarm (Crohns sygdom).

Lægen kan have givet dig Salazopyrin® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE SALAZOPYRIN®

Tag ikke Salazopyrin®, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for sulfasalazin eller et af de øvrige indholdsstoffer. Se afsnit 6.
- er overfølsom over for sulfonamider eller salicylater (f.eks. acetylsalicylsyre).
- lider af den arvelige sygdom porfyri.
- har alvorligt nedsat funktion af lever eller nyrer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Inden du tager Salazopyrin® skal du fortælle lægen, hvis du:

- tidligere har haft en alvorlig infektion eller har en kronisk infektion.
- har nedsat funktion af nyrer eller lever.
- har forandringer i blodets sammensætning.
- har glukose-6-phosphatdehydrogenase-mangel.
- har kraftig allergi.
- har astma,
- eller det drejer sig om et barn med kronisk leddegigt.

Potentielt livstruende hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse) er rapporteret ved anvendelse af Salazopyrin, og ses først på kroppen som rødlige pletter eller som runde pletter (ofte med blærer i midten). Yderligere symptomer, man bør være opmærksom på, er sår i munden, i svælget, på kønsorganerne og øjenbetændelse (røde og hævede øjne). Disse potentielt livstruende hududslæt er ofte ledsaget med influenzalignende symptomer. Udslettet kan udvikle sig til udbredt blærebetændelse eller afskalning af huden. Der er størst risiko for at udvikle alvorlige hududslæt de første uger af behandlingen. Hvis du har udviklet Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ved behandling med Salazopyrin, må du aldrig begynde at tage Salazopyrin igen. Hvis du udvikler hududslæt eller de nævnte hudsymptomer, skal du straks søge læge. Fortæl lægen at du tager Salazopyrin.

Vær opmærksom på at alvorlige overfølsomhedsreaktioner kan involvere de indre organer, herunder lever, nyre og hjerte.

Salazopyrin® kan medføre forbigående nedsat sædkvalitet hos mænd under behandlingen og indtil 3 måneder efter dens ophør.

Du skal drikke rigeligt med væske under behandlingen med Salazopyrin® på grund af risiko for nyresten.

Det er nødvendigt med regelmæssige blod- og urinprøver før og under behandlingen med Salazopyrin®.

Gulfarvning af hud og kropsvæske kan forekomme, hvilket kan misfarve bløde kontaktlinser.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

- Anden medicin kan påvirke virkningen af Salazopyrin®, og Salazopyrin® kan påvirke virkningen af anden medicin. Fortæl det til lægen, hvis De samtidig tager:
- antibiotika (ampicillin, neomycin, rifampicin)
 - jern- eller kalktilskud
 - hjertemedicin (digoxin)
 - kræftmedicin eller medicin mod psoriasis (methotrexat)
 - gigtmidler (phenylbutazon eller sulfinpyrazon)
 - medicin, der skal nedsætte immunforsvaret efter transplantation (azathioprin og ciclosporin)
 - medicin mod for højt kolesterol (colestipol og colestyramin)
 - blodfortyndende midler (phenprocoumon og dicumarol)

Hvis du skal vaccineres med levende tyfusvaccine, skal der gå mindst 24 timer mellem din dosis af Salazopyrin® og vaccinationen.

Brug af Salazopyrin® sammen med mad og drikkevarer

Du skal tage Salazopyrin® i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel til råds.

Graviditet

Du må kun tage Salazopyrin® efter lægens anvisning.

Ved graviditet eller ønske herom, bør du kontakte din læge. Behandlingen med Salazopyrin® skal muligvis afbrydes, da det muligvis kan øge risikoen for rygmarvsbrok hos spædbarnet.

Amning

Du må ikke tage Salazopyrin, hvis du ammer, da sulfasalazin kan gå over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Brug af Salazopyrin® kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdsikkerheden og evnen til at færdes i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE SALAZOPYRIN®

Tag altid Salazopyrin® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal tage Salazopyrin® i forbindelse med et måltid, og med rigeligt væske (et stort glas vand).

Dosering

Voksne

Startdosis er 2-4 tabletter (1-2 g) 3-4 gange dagligt. Dosis øges gradvist. Derefter sædvanligvis en vedligeholdelsesdosis på 4-6 tabletter (2-3 g) 3-4 gange dagligt.

Børn

Startdosis er 40-60 mg/kg dagligt, fordelt på 3-6 doser. Det vil sige, at et barn på 20 kg skal have 800-1200 mg fordelt på 3-6 doser, f.eks. ½ tablet 4 gange dagligt. Derefter sædvanligvis en vedligeholdelsesdosis på 20-30 mg/kg dagligt, fordelt på 3-6 doser. Det vil sige, at et barn på 20 kg skal have 400-600 mg fordelt på 3-6 doser i døgnet, f.eks. ¼ tablet 4 gange dagligt.

Hvis du har taget for mange Salazopyrin® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Salazopyrin® tabletter, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning samt mavesmerter. I alvorligere tilfælde kan du blive døsig og få kramper.

Hvis du har glemt at tage Salazopyrin®

Hvis du har glemt en dosis, tag den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Salazopyrin®

Du må ikke pludseligt stoppe behandlingen med Salazopyrin®, medmindre du har aftalt det med lægen. Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Salazopyrin®.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Almen sløvhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Nedsat mængde blodlegemer og blodplader. Der kan vise sig ved feber, halsbetændelse, hævede lymfeknuder, blødninger i huden og slimhinderne og udtalt træthed. Kontakt læge eller skadestue.
- Psykoser. Kontakt lægen.
- Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Lammelser og følelsesløshed af ben, vandladningsstop pga. rygmarvsbetændelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

- Tør hoste uden slim pga. betændelse lungernes bindevæv. Kontakt læge eller skadestue.
- Feber, hoste og opspyt pga. lungebetændelse. Kontakt lægen.
- Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
- Gulsot pga. nedsat leverfunktion. Kontakt læge eller skadestue.
- Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom (lupus erythematosus syndrom). Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Forstyrrelse i bloddannelsen pga. knoglemarvssygdom. Kontakt læge eller skadestue.
- Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst. Kontakt læge eller skadestue.
- Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.
- Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben pga. betændelse i hjertesækken. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Opblussen af betændelse i tyktarmen (diarre, slim og blødning fra endetarmen). Kontakt lægen.
- Alvorligt hududslæt med betændelse og afstøbning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
- Betændelse i huden med afskalning, udslæt og pusfyldte blærer (toksisk pustulodermi).
- Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
- Akut nyrebetændelse (feber og smerter). Kontakt straks læge eller skadestue.
- Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Potentielt livstruende hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse). Kontakt læge eller skadestue.
- Hjertemuskelbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
- Forstadie til leukæmi, der kan vise sig ved blodmangel, træthed, svaghed og åndenød. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed. Kontakt læge eller skadestue.
- Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt.
- Alvorlige eller livstruende allergiske reaktioner, som kan påvirke din hud eller andre dele af kroppen, f.eks. lever eller blodceller. Kontakt straks lægen, hvis du får en af følgende symptomer: Hududslæt, feber, hævede kirtler som ikke forsvinder, hævelser af læber og tunge gulfarvning af huden eller det hvide i øjne, usædvanlige blå mærker eller blødning, stærk træthed eller svaghed, uventet muskelsmerte, hyppige infektioner.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

- Smerter, ofte turevise i siden og bagtil i lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten. Kontakt læge eller skadestue.
- Gulfarvning af hud og øjne, der skyldes problemer med galdeblæren (koletase).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Hovedpine, kvalme, mavesmerter, sure opstød, opkastning.
- Kløe, udslæt.
- Forbigående nedsat frugtbarhed.
- Appetitmangel, kraftsløshed og svaghed, træthed.
- Forhøjede leverenzym (ingen symptomer).
- Mindre blødning i hud og slimhinder.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Blegthed og træthed pga. blodmangel, der er opstået pga. folinsyremangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Nedsat appetit.
- Blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet.
- Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Smagsforstyrrelser, metallisk smag.
- Susen for ørerne (tinnitus), hoste, nældefeber, øget følsomhed af huden for sollys.
- Skummende urin pga. æggehvidestof i urinen.
- Feber, døsighed, svimmelhed, smerter i leddene.
- Nedsat koncentrationsevne, søvnløshed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Symptomer som minder om kysesyge med halsbetændelse, hævede lymfeknuder, og træthed (mononucleosis) Tal med lægen.
- Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter.
- Væskeansamlinger i ansigtet med rødmen, forandret lugtesans.
- Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder, forandringer i lugtesans.
- Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Åndenød, vejtrækningsbesvær pga. betændelse i bronkierne.
- Feber, hoste og opspyt pga. lungebetændelse. (Löfflers syndrom)
- Luft i maven, diarré, nedsat leverfunktion.
- Udslæt, blåfarvning af huden, muskelslaphed, hårtab.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Bindevævssygdom med feber og træthed (Sjögrens syndrom). Tal med lægen.
- Gulfarvning af bløde kontaktlinser.
- Blåfarvning af læber og negle.
- Mundbetændelse.
- Langvarig, ofte stærkt kløende hudsygdom med små kantede flade blærer eller knuder. Ofte udbrud i mundslimhinden. I sjældne tilfælde kan det forekomme i hårbunden, hvor det kan medføre ardannelse med hårløse pletter (lichen ruber).
- Eksem eller irritation af huden/udslæt.
- Gul-orange misfarvning af huden, kropsvæske og urin.
- Blod i urinen. Kontakt lægen.
- Muskelsmerter, nedsat sædproduktion (forbigående), igangsættelse af autoantistoffer.
- Krystaller i urinen med ubehag ved vandladning.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

- Forandringer i negle.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Rødmen af huden.
- Folinsyremangel.
- Blegthed.
- Irritation i mund og svelg.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Salazopyrin® tabletter efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Salazopyrin® 500 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: sulfasalazin.
Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, povidon.

Pakningsstørrelser

Salazopyrin® 500 mg tabletter findes i plastbeholder med 112 og 3x112.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Salazopyrin® er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Health AB.