

Acular® 5 mg/ml, øjendråber, opløsning

Ketorolactrometamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Acular® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Øversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Acular®
3. Sådan skal du bruge Acular®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Acular® er et middel, der kaldes NSAID. Det dæmper smerter, hævelse, rødme og irritation (inflammation).

Du skal bruge Acular® til

- behandling af allergisk øjenbetændelse
- forebyggelse og behandling af betændelse i øjet efter øjenoperation
- behandling af kronisk blod/væskeansamling (ødem) i bagerste del af øjet.

Lægen kan have givet dig Acular® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ACULAR®

Brug ikke Acular®, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for ketorolactrometamol eller et af de øvrige indholdsstoffer
- tidligere har fået overfølsomhedsreaktioner som astmaanfald, nældefeber eller akut snue efter at have taget medicin, der indeholder acetylsalicylsyre eller andre lignende stoffer (NSAID).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Acular®

Tal med lægen, inden du bruger Acular®, hvis du

- en øjeninfektion, der skyldes en virus eller bakterier.
- Øget blødningstendens (f.eks. anæmi) eller mavesår.
- Diabetes.
- Kronisk leddegigt (reumatoid artrit).
- Syndrom kendetegnet ved tørre øjne.
- Astma efter brug af NSAID-præparater (mod smerter, betændelse).
- Hvis du for nyligt har fået en øjenoperation.
- Hvis du har nedsat følsomhed i hornhinden (den glasklare overflade, der dækker pupillen og regnbuehinden), eller hvis den sædvanlige glatte overflade på hornhinden er beskadiget.

Tal også med lægen, hvis du bruger

- Medicin, der forlænger sårheling, så som NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen) eller kortikosteroider til udvortes brug (f.eks. hydrokortison).

- Medicin, der kan forlænge blødningstiden (f.eks. warfarin).

Kontakt straks lægen

- hvis du får uklart syn og evt. smerter i øjet.

Vær opmærksom på følgende

- Du skal undgå at bruge kontaktlinser, når De har betændelse i øjet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med anden medicin til udvortes brug, f.eks. øjendråber, creme eller salve, som indeholder steroider til lokal brug (f.eks. hydrokortison) eller medicin mod betændelse og smerter (ibuprofen).

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Acular® og det andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Acular® efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Acular® efter aftale med lægen.

Børn

Acular må normalt ikke ordineres til børn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Acular® kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Acular®

- Hvis går med bløde (hydrofile) kontaktlinser, bør du tage dem ud, før du drypper øjne, og vente i mindst 15 minutter, før du sætter linserne i igen.
- Konserveringsmidlet i Acular®, benzalkoniumchlorid, kan give øjenirritation og medføre permanente skader på denne linsetype. Acular® kan misfarve bløde kontaktlinser.
- Undgå kontakt med bløde linser.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ACULAR®

Brug altid Acular® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er

- Allergisk øjenbetændelse: 1 dråbe 4 gange dagligt i op til 6 uger.
- Forebyggelse og behandling af øjenbetændelse efter øjenoperation: 1 dråbe 3 gange dagligt i 3-4 uger, første gang 24 timer før operation.

- Kronisk blod/væskeansamling (ødem) i øjet: 1 dråbe 4 gange dagligt i 2-3 måneder.

Brugsanvisning



1. Vask hænder. Læg hovedet tilbage og kig op i loftet.
2. Træk forsigtigt det nederste øjenlåg ned, så der dannes en lille lomme.
3. Vend bunden i vejret på flasken og klem den, så der dryppes en dråbe i øjet, der skal behandles.
4. Slip det nederste øjenlåg og luk øjet i 30 sek. Forsøg igen hvis dråben løber ved siden af øjet.

For at undgå forurening bør dråbespiden ikke berøres. Skru hættten på efter brug. Det er vigtig øjet bliver dryppet korrekt.

Hvis du har brugt for meget Acular®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Acular®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Acular®. En overdosis kan skylles ud af øjnene med lunkent vand.

Hvis du ved et uheld indtager Acular skal du drikke rigelig med væske og kontakte lægen.

Hvis du har glemt at bruge Acular®

Hvis du har glemt en dosis, så dryp øjnene så snart du kommer i tanker om det. Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Acular®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Acular® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Tyndere hornhinde, afstødning af slimhinde ofte i form af mange blødende små sår, nedbrydning af cellevæv eller gennemhulning, smerter og uklart syn pga. skader på hornhinden. Det kan i nogle tilfælde udvikle sig til et hul på hornhinden. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Vejtrækningsbesvær eller forværring af astma. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Øjenirritation med svien eller brændende fornemmelse i øjnene efter drypning.
- Øjensmerter med stikkende smerte.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Overfølsomhed og allergisk reaktion i øjnene.
- Hovedpine.
- Øjeninflammation.

- Smerter i øjet pga. overfladisk betændelse i hornhinden. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen
- Væskeansamling (ødem) i øjet og/eller øjenlåg.
- Øjenkløbe, røde øjne pga. øget blodtilførsel.
- Blodfyldt øje.
- Infektion eller betændelse i øjet. Tal med lægen.
- Smerter i øjet, rødme i øjet, sløret syn pga. betændelse i regnbuehinden. Tal med lægen.
- Uklarhed i hornhinden.
- Blødning i nethinden.
- Hævelse i nethinden, fører til nedsat syn.
- Øjenskade.
- Øget væsketryk i øjet.
- Uskarpt og/eller nedsat syn.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Sår på hornhinden eller infiltrator i hornhinden. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Hornhindebetændelse.
- Tørhed i øjne.
- Kraftigt tåreflåd.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte lægemiddelstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Acular® utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Acular® ved temperaturer over 25 °C. Brug ikke Acular® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Brug senest Acular® 4 uger efter åbning. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Acular® 5 mg/ml øjendråber, opløsning indeholder

- Aktivt stof: ketorolactometamol.
- Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid-opløsning, dinatriumedetatidihydrat, natriumchlorid, saltsyre eller natriumhydroxid (til justering af pH), octoxinol 40, rensat vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Acular® er en klar farveløs til svag gul opløsning i en plastflaske med dråbeanordning.

Acular® findes i en pakning med 5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Acular® er et registreret varemærke, der tilhører Allergan, Inc.