

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Daflon® 450 mg/50 mg, filmovertrukne tabletter

Oprenset og mikroniseret fraktion af 500 mg flavonoider svarende til:
Diosmin 450 mg og flavonoider som hesperidin 50 mg.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen, De får måske brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Daflon® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Daflon® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får en bivirkning, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Daflon®
3. Sådan skal De tage Daflon®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Daflon® får udspilede blodårer til at trække sig sammen.

De kan bruge Daflon® mod:

- tunge eller hævede ben, smerter, natlige kramper og uro i benene.
- hæmorroider.

Lægen kan have givet Dem Daflon® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE DAFLON®

Tag ikke Daflon®

- hvis De er overfølsom overfor de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Daflon®

- hvis De får et akut anfald af hæmorroider, bør De kun tage Daflon® i kort tid. Hvis symptomerne bliver ved, skal De tale med lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Daflon® sammen med mad og drikke

Du skal tage Daflon® i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun tage Daflon® efter aftale med lægen.

Amning

Erfaringerne med Daflon® er endnu begrænsede. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daflon® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE DAFLON®

Tag altid Daflon® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 2 tabletter daglig, 1 morgen og 1 aften til maden.

Børn: Børn må kun få Daflon® efter lægens anvisning.

Hvis De har taget for mange Daflon®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Daflon®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke kendskab til forgiftning efter indtagelse af Daflon®.

Hvis De har glemt at tage Daflon®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Daflon®

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Daflon® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Kvalme, opkastning, diaré, sure opstød.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Tyktarmsbetændelse.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Hovedpine, svimmelhed, utilpashed.
- Udslæt, kløe og nældefeber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Mavesmerter.
- Hævelse af ansigt, læber og øjenlåg. Kontakt lægen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Daflon[®] efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Daflon[®] 450 mg/50 mg, fillovertrukne tabletter indeholder:

- Aktive stoffer: Oprensat og mikroniseret fraktion af 500 mg flavonoider svarende til: Diosmin 450 mg og flavonoider som hesperidin 50 mg.
- Øvrige indholdsstoffer er: Natriumstivelsesglycolat, mikrokrySTALLinsk cellulose, gelatine, magnesiumstearat, talcum, glycerol, hypromellose, macrogol 6000, natriumlaurylsulfat, jernoxid gul (E 172), jernoxid rød (E 172), titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Daflon[®] er ovale, laksefarvede, fillovertrukne tabletter.

Daflon[®] fås i pakninger med 60 og 120 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Daflon[®] svarer til Capiven[®]

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Daflon[®] er et registreret varemærke, der tilhører Biofarma.