

Zinnat[®] 500 mg, filmovertrukne tabletter

cefuroxim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Zinnat[®] til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Øversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zinnat[®]
3. Sådan skal du tage Zinnat[®]
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Zinnat[®] indeholder et antibiotikum cefuroxim, der tilhører gruppen cefalosporiner.

Zinnat[®] anvendes mod infektioner hos voksne og børn i alderen fra 3 måneder:

- Halsbetændelse (streptokokker)
- Kronisk betændelse i svelgets slimhinde.
- Bihulebetændelse.
- Mellemørebetændelse.
- Pludselig forværring af lungesygdom (kronisk bronkitis).
- Blærebetændelse.
- Nyrebeckenbetændelse.
- Lettere sårinfektioner.
- Tidlig behandling af skovflådbid.

Lægen kan have givet dig Zinnat[®] for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZINNAT[®]

Tag ikke Zinnat[®], hvis du:

- er overfølsom over for cefuroxim, andre cefalosporiner eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- tidligere har haft en anafylaktisk reaktion (voldsom allergisk reaktion) overfor for alle andre beta-laktamantibiotika (penicilliner, monobaktamer og carbanemer).

Særlige advarsler og forsigtighedsregler:

Tal med lægen, inden du tager Zinnat[®], hvis du:

- ikke kan tåle penicillin eller andre antibiotika.
- har astma eller allergi.
- har nedsat nyre- eller leverfunktion.

Kontakt lægen, hvis du får voldsom diarre under behandlingen med Zinnat[®].

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Zinnat[®].

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Det kan være nødvendigt at justere dosis.

Nogle midler mod for meget mavesyre kan nedsætte virkningen af Zinnat[®].

Zinnat[®] kan påvirke tarmfloraen, og dermed nedsætte virkningen af P-piller og der bør suppleres med anden prævention.

Zinnat[®] udskilles i blodet og nyrerne. Samtidig brug af lægemiddel (probenecid) til forebyggelse behandling af urinsyreigt frarådes.

Samtidig brug af orale blodfortyndende lægemidler og Zinnat[®] frarådes.

Brug af Zinnat[®] sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Zinnat[®] kort tid efter et måltid.

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Zinnat[®]. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke bruge Zinnat[®], da Zinnat[®] går over i modermælken. Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Zinnat[®] er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik og arbejdssikkerhed

Zinnat[®] kan give bivirkninger (svimmelhed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zinnat[®]

Zinnat[®] indeholder parabener, som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ZINNAT[®]

Tag altid Zinnat[®] nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 40 kg

250 – 500 mg 2 gange daglig.

Børn under 40 kg

125 – 250 mg 2 gange daglig.

Oral anvendelse. Zinnat[®] tabletterne må ikke knuses.

Zinnat[®] skal tages umiddelbart efter et måltid.

Behandlingen varer som regel 7 dage (kan variere fra 5 til 10 dage).

Ældre

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for meget Zinnat[®]

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Zinnat[®] tabletter, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Overdosering kan medføre generel svækkelse af hjernen, kramper og koma. Der er ikke set tilfælde med overdosering af Zinnat[®].

Hvis du har glemt at tage Zinnat®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Zinnat®

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Zinnat®.

Spørg din læge eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Zinnat® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hjerterytmeforstyrrelser, åndenød, risiko for lammelser og føleforstyrrelser, hudgener med udslet, kløe eller sår, diarre eller smerte i og hævelse af led, dette kan skyldes forøget antal hvide blodlegemer. Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke kendt

- Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.
- Træthed, svimmelhed, besvimelsestendens og især hos ældre ved hjertekrampe og smerte i legmuskel, dette kan skyldes alvorlig blodmangel. Kontakt læge eller skadestue.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Mørkerøde hævede velfagrænsede pletter, mest på fødder, arme og ben. Dertil kommer feber, påvirkning af almentilstanden, blæredannelse og sår på slimhinder (Stevens-Johnsons syndrom),
- Sjælden livstruende reaktion i huden, der skyldes reaktion på medicin. Kontakt lægen eller skadestue.
- Alvorlig blodmangel pga. gulsot.
- Leverbetændelse (hepatitis).

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Svampeinfektion, specielt i munden og skede. Kontakt lægen.
- Hovedpine, svimmelhed.
- Diarré, kvalme, mavesmerter.
- Forbigående stigning i leverenzymen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Lav blodprocent, da immunsystemet ødelægger de røde blodlegemer (For få røde blodlegemer) (Positiv Coombs test). Kontakt lægen.
- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (leukopeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
- Opkastning
- Hududslæt.

Ikke kendt

- Feber pga. overfølsomhed mod cefuroxim.
- Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslet og smerter.
- Utilpashed, feber, rødme i huden, eksisterende hudlæsioner bliver mere fremtrædende, hyperventilation, hurtig hjerterytme og for højt blodtryk med efterfølgende fald i blodtrykket (Jarisch-Herxheimers reaktion). Kontakt lægen.
- Diarre evt. blodig, mavesmerter og smerter, feber, kvalme, dehydrering (Pseudomembranøs colitis). Kontakt lægen.
- Nældefeber, kløe uden hududslæt, akut betændelsestilstand i huden udløst af infektioner, hududslæt.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Zinnat® ved temperaturer over 30 °C.

Brug ikke Zinnat® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Zinnat® 500 mg, filmovertukne tabletter indeholder: Aktivt stof: Cefuroxim 500 mg (som cefuroximaxetil). Øvrige indholdsstoffer: MikrokrySTALLINSK cellulose, croscarmellosenatrium, hypromellose, vegetabilsk olie, natriumlaurylsulfat, kolloid vandfri silica, propylenglycol, methylparahydroxybenzoat (E218), titandioxid (E171), propylparahydroxybenzoat (E216), hypromellose, natriumbenzoat (E211).

Pakningsstørrelser

Zinnat® 500 mg findes i pakning med 12 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlæggsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Zinnat® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited.