

Serevent® 50 mikrogram/dosis, inhalationspulver

Salmeterol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Serevent® til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4).

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Serevent®
3. Sådan skal du bruge Serevent®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Serevent® inhalationspulver indeholder det aktive stof salmeterol. Salmeterol tilhører en gruppe lægemidler, der er langtidsvirkende og udvider bronkierne, så det bliver lettere at trække vejret. Det virker normalt efter 10-20 minutter, og virkningen holder i mindst 12 timer.
- Serevent® ordineres af din læge, for at du kan undgå problemer med at trække vejret, f.eks. på grund af astma. Hvis du tager Serevent® hver dag, vil det hjælpe med at forebygge astmaanfald, herunder også astmaanfald, der skyldes anstrengelse, eller hvis du har anfald om natten.
- Hvis du tager Serevent® hver dag, kan du også forebygge åndedrætsbesvær, der skyldes andre lungesygdomme, f.eks. kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
- Serevent® hjælper mod problemer med din vejrtrækning. Det virker ikke på pludselige anfald af åndenød og hvæsende vejrtrækning, hvor du skal bruge en hurtigvirkende anfaldsmedicin, f.eks. salbutamol.
- Serevent® er ordineret til dig som inhalationspulver i Diskos®, der skal inhaleres direkte ned i lungerne.

Hvis du får Serevent® for din astma, skal du altid bruge det sammen med inhalationsmedicin med binyrebarkhormon, som du samtidig skal have ordineret af lægen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE SEREVENT®

Brug ikke Serevent®

- Hvis du er overfølsom (allergisk) overfor salmeterol eller lactose.

Advarsler og forsigtighedsregler

- **Hvis din astma eller vejrtrækning bliver værre, skal du straks kontakte din læge.** Du synes måske, at din vejrtrækning bliver mere hvæsende og besværet, eller du har en følelse af, at det snævrer over brystet, eller du har mere brug for din hurtigvirkende anfaldsmedicin. Hvis det er tilfældet, skal du ikke tage flere doser Serevent®. Så ville du kunne få mere ondt i brystet og blive alvorligt syg. Du skal gå til lægen, fordi behandlingen af din astma måske skal ændres.
- Hvis du får Serevent® for din astma, er det vigtigt at fortsætte med den astmamedicin, du får i forvejen, især binyrebarkhormon (som inhalation eller tabletter). Du skal fortsætte med medicinen, nøjagtig som du plejer, med mindre din læge siger noget andet, og selv om du har fået det bedre.
Hold ikke op med at tage din medicin med binyrebarkhormon, når du begynder at bruge Serevent®.

- Din læge vil muligvis følge din astma tættere, hvis du har en øget hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen, hvis du har diabetes (Serevent® kan øge blodsukkeret), eller hvis du har en hjertesygdom, f.eks. uregelmæssig eller hurtigt hjerteslag.

Brug af anden medicin:

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

- Tal med din læge, før du bruger Serevent®, hvis du bliver behandlet med ketoconazol eller itraconazol mod svamp, eller hvis du får ritonavir mod hiv. Disse lægemidler kan øge risikoen for at få bivirkninger med Serevent®, f.eks. uregelmæssig hjertebanken, eller de kan forværre en bivirkning.
- Du skal helst ikke have beta-blokkere, når du får Serevent®, med mindre din læge har ordineret det. Beta-blokkere (f.eks. atenolol, propranolol, sotalol) gives som oftest mod forhøjet blodtryk eller andre hjertesygdomme. Tal med lægen om det, hvis du får beta-blokkere, eller hvis de for nylig er blevet ordineret til dig, fordi de kan nedsætte eller ødelægge virkningen af salmeterol.
- Serevent® kan forårsage, at indholdet af kalium i blodet falder. Hvis det sker, kan du få uregelmæssigt hjerteslag, muskelsvaghed eller muskelkrampe. Det kan især forekomme, hvis du tager Serevent® sammen med medicin mod forhøjet blodtryk, f.eks. vanddrivende medicin, og anden medicin mod åndenød, f.eks. teofyllin eller binyrebarkhormon. Din læge vil måske foreslå, at du får taget en blodprøve for at få testet indholdet af kalium i dit blod. Tal med din læge om det, hvis du har spørgsmål.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Serevent®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Serevent® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Serevent® indeholder lactose

Kontakt lægen før du bruger denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE SEREVENT®

Brug altid Serevent® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

- **Hvis du får Serevent® for din astma, skal du altid bruge det sammen med inhalationsmedicin med binyrebarkhormon, som du samtidig skal have ordineret af lægen.**

- Du skal tage Serevent® hver dag og kun holde op, hvis lægen råder dig til det.
- Du kan føle medicinen virke inden for det første døgn.

**Dosering ved astma
Voksne og børn fra 12 år**

- Den sædvanlige dosis er 1 dosis (50 mikrogram) 2 gange daglig.
- Ved mere alvorlig astma kan lægen ordinere, at dosis øges til 2 doser 2 gange daglig.

Børn 4-12 år

- Den sædvanlige dosis er 1 dosis (50 mikrogram) 2 gange daglig.

Serevent® bør ikke anvendes til børn under 4 år.

**Dosering ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL, herunder bronkitis og emfysem (store lunger))
Voksne**

- Den sædvanlige dosis er 1 dosis (50 mikrogram) 2 gange daglig.

Brugsanvisning

- Få lægen, sygeplejersken eller apoteket til at vise dig, hvordan du skal bruge Diskos®. Du bør jævnligt tjekke, at du bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger Diskos® rigtigt, eller ikke følger lægens anvisning, kan det påvirke, at medicinen ikke hjælper, som den skal.
- Diskos® indeholder et folieblisterbånd med Serevent® inhalationspulver.
- Diskos® er med dosistæller, der viser, hvor mange doser, der er tilbage. Den tæller ned til 0. Når der er 5 doser tilbage, bliver tallene røde for at advare dig om, at der kun er nogle få doser tilbage. Når tælleren viser 0, er Diskos® tom.

Sådan bruger du Diskos®

1. Sådan åbner du Diskos®: Hold med den ene hånd og sæt tommelfingeren på fingergrebet. Skub fingergrebet helt i bund – til det siger klik. Så er mundstykket åbnet.
2. Hold Diskos® med mundstykket ind imod dig. Du kan holde den i enten højre eller venstre hånd. Skub dosisknappen helt i bund – til det siger klik. Nu er der frigjort en dosis i mundstykket.

Hver gang dosisknappen trykkes i bund, bliver der åbnet en blister, og der frigøres pulver til inhalation. Dosisknappen må kun trykkes ned, når du skal have en dosis. Den åbner blistrene, og medicinen kan gå tabt.

3. Hold Diskos® væk fra munden og pust helt ud. Pust ikke ind i Diskos®.
4. Sæt mundstykket til læberne. Sug ind så roligt og dybt som muligt gennem munden - ikke gennem næsen. Tag Diskos® væk fra munden. Hold vejret i ca. 10 sekunder. Pust langsomt ud.
5. Sådan lukker du Diskos®: Skub fingergrebet tilbage mod dig selv, så langt som muligt – indtil det siger klik. Dosisknappen går automatisk tilbage til startpositionen.

Diskos® er nu klar til brug igen.

Rengøring af Diskos®

Tør mundstykket af med en tør klud.

Hvis du har taget for meget Serevent®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Serevent®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Du kan muligvis mærke at dit hjerte slår hurtigere end normalt, og du kan føle dig urolig og/eller svimmel. Muligvis får du hovedpine eller føler dig svag i musklerne og får ledsmerter.

Hvis du har glemt at tage Serevent®

Hvis du har glemt en dosis, skal du først tage næste dosis, når det er tid igen. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner: Du kan mærke, at du pludseligt får svært ved at trække vejret efter at have taget Serevent®. Din vejrtrækning kan blive hvæsende, eller du hoster. Du kan også mærke, at det klør, og du hæver op (sædvanligvis i ansigtet, på læberne, tungen eller i svælget). Hvis du reagerer sådan, eller hvis symptomerne opstår pludseligt, efter at du har taget Serevent®, skal du straks kontakte lægen eller ringe 112.
- Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hovedpine, rysten.
- Hjertebanken.
- Muskelkrampe.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. udslæt (kløe og rødme).
- Nervøsitet.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hertestop). Tal med lægen.
- Søvnløshed/søvnforstyrrelser.
- Svimmelhed.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Ekstra hjerteslag.
- Irritation i svælget.
- Kvalme.
- Smerte i leddene.
- Brystsmerte.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mindre bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
- Brug ikke Serevent® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløb, toiletet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Serevent® 50 mikrogram/dosis, inhalationspulver indeholder

- Aktivt stof: Salmeterol 50 mikrogram/dosis.
- Øvrigt indholdsstof: Lactose.

Pakningsstørrelse

Serevent® fås i en pakning med 60 doser

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N.

Den seneste udgave af indlægssedlen kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Serevent® og Diskos® er et registrerede varemærker, der tilhører Glaxo Group Limited.