

Persantin® Retard 200 mg depotkapsler, hårde

Dipyridamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Persantin® Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Persantin® Retard
3. Sådan skal du tage Persantin® Retard
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Persantin® Retard hører til gruppen af blodfortyndende medicin.

Persantin® Retard bruges til at forebygge blodpropper i hjernen, og til patienter som tidligere har haft en blodprop i hjernen og som ikke kan tåle acetylsalicylsyre.

Lægen kan have givet dig Persantin® Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PERSANTIN® RETARD

Tag ikke Persantin® Retard

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for dipyridamol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Persantin® Retard

- Tal med din læge hvis du lider af en alvorlig hjertesygdom (f.eks. ustabil angina pectoris eller nylig blodprop i hjertet).
- Tal med din læge hvis du lider af forsnavring af hjerteklapperne ved hovedpulsåren (aorta).
- Tal med din læge hvis du lider af kredsløbsforstyrrelse (f.eks. ubehandlet hjertesvigt).
- Tal med din læge hvis du lider af myasthenia gravis (en sjælden muskelsygdom). Det kan være nødvendigt at justere behandlingen.
- Tal med din læge hvis du har tendens til galdesten, da Persantin® Retard i sjældne tilfælde kan ophobes i galdesten.

- Hvis du skal have foretaget en undersøgelse af din hjertefunktion, skal du inden undersøgelsen fortælle lægen, at du tager Persantin® Retard. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen hvis du tager:

- medicin mod uregelmæssig hjerterytme (adenosin). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
- medicin mod forhøjet blodtryk.
- medicin mod myasthenia gravis (en sjælden muskelsygdom).
- anden blodfortyndende medicin og acetylsalicylsyre.
- medicin mod astma eller KOL (teofyllin, xantiner).

Brug af Persantin® Retard sammen med mad og drikke

Du kan tage Persantin® Retard i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun tage Persantin® Retard efter aftale med lægen.

Amning

Du må kun tage Persantin® Retard efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Persantin® Retard kan på grund af bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PERSANTIN® RETARD

Tag altid Persantin® Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 depotkapsel to gange daglig (1 depotkapsel om morgenen og aftenen).

Depotkapslerne skal synkes hele.

Hvis du får utålelig hovedpine i starten af behandlingen med Persantin® Retard, skal du måske have en anden dosis. Tal med lægen.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Persantin® Retard bør ikke anvendes til børn.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Persantin® Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Persantin® Retard, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få symptomer som varmeformermelse, rødme, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine. Du kan også få hurtig puls, fald i blodtrykket, hurtigt åndedræt, smerter i brystet evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklens, bevidstløshed, vejtrækningsbesvær, svækket vejtrækning, blåfarvning af læber og negle, mavebesvær, blødningsstendens og gulfarvning af huden.

Hvis du har glemt at tage Persantin® Retard

Glemmer du en dosis, så fortsæt med almindelig dosering. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Persantin® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Åndenød, angst, bryst smerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklens eller blodprop i hjertet. Ring 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbensbuen på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

Hyppighed ikke kendt

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Åndenød pga. overfølsomhed. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Øget blødning under eller efter operation. Kontakt lægen eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos over 10 ud af 100 patienter):

- Hovedpine, svimmelhed.
- Kvalme, diarré.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Opkastning.

- Udslæt.
- Muskelsmerter.

Hyppighed ikke kendt

- Udslæt, nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring evt. 112.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Hedeture.
- Nældefeber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Persantin® Retard ved temperaturer over 25°C.

Tag ikke Persantin® Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Persantin® Retard 200 mg depotkapsler indeholder

- Aktivt stof: Dipyridamol 200 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Vinsyre, povidon, methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer (1:2), talkum, akaciegummi, hypromellosephthalat, hypromellose, triacetin, dimeticon 350, stearinsyre. Kapsler: Gelatine, titandioxid (E171), rød og gul jernoxid (E172).

Pakningsstørrelse

Persantin® Retard fås i pakninger med 30 eller 60 depotkapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK
6715 Esbjerg N.

Persantin® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Den seneste udgave af indlægssedlen kan ses på www.indlaegssedel.dk