



Hvis der slipper gas ud fra toppen af inhalatoren eller ud af mundvigende, skal doseringen gentages fra trin 2.

Har De svage hænder kan De have lettere ved at holde inhalatoren med begge hænder. I så fald bør den øverste del af inhalatoren holdes med begge pegefingre og den nederste del med begge tommelfingre.

De kan bruge Foradil® inhalationsspray sammen med en "spacer" anordning. Spørg lægen om yderligere information.

#### Rengøring:

Rengør inhalatoren regelmæssigt. Fjern metalbeholderen (metalbeholderen må ikke komme i vand) og rengør plastdelene. Brug lukket vand og eventuelt et mildt opvaskemiddel. Lad plastdelene lufttørre og sæt metalbeholderen tilbage igen.

#### Hvis De har taget for meget Foradil®:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Foradil®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Symptomerne på overdosering kan være: kvalme, opkastning, hovedpine, rysten, søvnliggende bevidsthedssvækkelse, hjertebanken, hurtig puls, uregelmæssig puls, træthed, for lavt kalium i blodet, lavt blodsukker.

#### Hvis De har glemt at tage Foradil®:

Hvis De kun har glemt at tage én dosis, skal De tage den, så snart De kommer i tanke om det. Hvis det imidlertid er tid til Deres næste dosis, må De ikke tage den manglende dosis. De skal bare følge Deres normale dosering. De må ikke tage dobbelt dosis. Hvis De er i tvivl eller har glemt flere doser, skal De søge læge.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

## 4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

#### Alvorlige bivirkninger:

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignen de anfald. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Uregelmæssig hjerterytme, ekstra hjerteslag. Kontakt læge eller skadestue.
- Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklens.
- Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse. Kontakt læge eller skadestue.

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Hurtig, meget uregelmæssig puls med ekstra hjerteslag. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Forværring af astma. Kontakt lægen.

#### Ikke alvorlige bivirkninger:

**Almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Rysten, hovedpine.
- Hjertebanken.
- Hoste.

**Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan

i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

- Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
- Rastløs uro, rastløshed og søvnforstyrrelser.
- Smagsforstyrrelser, svimmelhed.
- Hurtig evt. uregelmæssig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Halsirritation.
- Kvalme.
- Kraftig sveden.
- Muskelkrampe, muskelsmerter.

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Overfølsomhedsreaktioner som kløe og udslæt.
- Nældefeber.
- Svingende blodtryk. Kontakt læge.

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Abnorm opførsel, hallucinationer. Hallucinationer kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Uro, ophidselse, evt. hallucinationer. Kontakt lægen, da det kan føre til vold.
- Åndenød. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Hævede fødder, ankler og hænder.

Flere af bivirkningerne forsvinder spontant efter 1-2 ugers behandling.

Foradil® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

#### Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
2300 København S.  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)  
E-mail: [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## 5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Foradil® ved over 30°C i max. 3 måneder efter udlevering fra apoteket.

Anvend ikke Foradil® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## 6. PAKNINGSSTØRRELSE OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

**Foradil® 12 mikrogram/dosis, inhalationsspray, opløsning indeholder:**

- Aktivt stof: Formoterolfumaratdihydrat 12 mikrogram/dosis.
- Øvrige indholdsstoffer: Norfluran, vandfri ethanol, saltsyre.

#### Pakningsstørrelser:

Foradil® 12 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning, 100 doser.

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK  
Oddesundvej 39  
6715 Esbjerg N.

#### Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK  
Oddesundvej 39  
6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk).

Foradil® er et registreret varemærke, der tilhører Astellas Pharma Inc.