

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Hytacand® 16 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan cilexetil/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Hytacand® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Hytacand®
3. Sådan skal du bruge Hytacand®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Hytacand® bruges til at behandle forhøjet blodtryk (hypertension). Det indeholder to aktive stoffer: Candesartan cilexetil og hydrochlorthiazid. Begge stoffer nedsætter dit blodtryk.

- Candesartan cilexetil tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes angiotensin-II receptor antagonist. Det får dine blodårer til at slappe af og udvide sig. Dette medvirker til, at dit blodtryk falder.
- Hydrochlorthiazid tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes diuretika (vanddrivende middel). Det hjælper din krop med at udskille vand og salte som f.eks. natrium i urinen. Dette medvirker til, at dit blodtryk falder.

Din læge vil ordinere Hytacand®, hvis dit blodtryk ikke har været passende kontrolleret med candesartan cilexetil eller hydrochlorthiazid alene.

Lægen kan have givet dig Hytacand® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HYTACAND®

Tag ikke Hytacand®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for candesartan cilexetil, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du er overfølsom over for medicin der indeholder sulfonamider. Tal med din læge, hvis du er usikker på, om dette gælder dig.
- hvis du er gravid eller ammer (se afsnittet "Graviditet og amning").
- hvis du har stærkt nedsat nyrefunktion.
- hvis du har stærkt nedsat leverfunktion og/eller galdevejsobstruktion (problem med at udskille galde fra galdeblæren).
- hvis du har vedvarende lavt indhold af kalium i blodet.
- hvis du har vedvarende højt indhold af kalk i blodet.
- hvis du har eller har haft urinsyreigt.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Hytacand®

- hvis du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer.
- hvis du har fået transplanteret en nyre.
- hvis du har en sygdom i binyrerne, som kaldes Conn's syndrom (kaldes også primær hyperaldosteronisme).
- hvis du har haft en sygdom, som kaldes systemisk lupus erythematosus (SLE).
- hvis du har diabetes.
- hvis du har/har haft allergi eller astma.
- hvis du tidligere har haft et slagtilfælde.
- hvis du kaster op, har kastet meget op for nyligt eller har diarré.

Hvis noget af ovenstående gælder dig, skal du kontakte din læge, inden du tager Hytacand®.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Hytacand®. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle din læge, at du tager Hytacand®. Det skyldes, at Hytacand® sammen med visse typer medicin til bedøvelse kan forårsage blodtryksfald.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tal med din læge, hvis du bruger noget af følgende medicin:

- Anden medicin mod forhøjet blodtryk, inklusiv beta-blokkere, diazoxid og ACE-hæmmere såsom enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril.
- Non-steroid antiinflammatoriske midler (NSAID) såsom ibuprofen, naproxen eller diclofenac.
- COX-2 hæmmere som celecoxib eller etoricoxib.
- Acetylsalicylsyre, hvis du tager mere end 3 gram dagligt.
- Kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger.
- Kalciumtilskud eller D-vitamintilskud.
- Medicin mod forhøjet kolesterol, såsom colestipol eller cholestyramin.
- Medicin til diabetes (tabletter eller insulin).

- Medicin der kontrollerer hjerterytmen (antiarytmika), såsom digoxin og beta-blokkere.
- Heparin (blodfortyndende medicin).
- Vanddrivende midler (diuretika).
- Afføringsmidler.
- Penicillin (antibiotika).
- Amfotericin (til behandling af svampeinfektioner).
- Lithium (medicin til psykiske lidelser).
- Steroider, såsom prednisolon.
- Hypofysehormon (ACTH).
- Medicin til behandling af cancer.
- Amantadin (til behandling af Parkinsons syge eller til alvorlige virusinfektioner).
- Barbiturater (beroligende medicin, der også bruges til behandling af epilepsi).
- Carbenoxolon (til behandling af sygdomme i spiserøret eller blister i munden).
- Ciclosporin.
- Baclofen, amifostin, tricycliske antidepressiva eller antipsykotika.
- Antikolinerg medicin, såsom atropin og biperidin.
- Kontrastmidler (anvendes til visse undersøgelser).

Brug af Hytacand® sammen med mad og drikke

Du kan tage Hytacand® med eller uden mad.

Hvis du drikker alkohol, bør du tale med lægen, inden du tager Hytacand®. Nogle personer, som drikker alkohol, mens de er i behandling med Hytacand®, kan føle utilpashed eller svimmelhed.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke tage Hytacand®, hvis du er gravid. Hvis du bliver gravid, mens du er i behandling med Hytacand®, skal du stoppe behandlingen med det samme og tale med lægen. For at undgå graviditet mens du er i behandling med Hytacand®, bør du bruge egnet prævention.

Amning:

Du må ikke tage Hytacand®, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle personer kan føle træthed eller svimmelhed, når de er i behandling med Hytacand®. Du må ikke køre bil eller motorcykel eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis dette er tilfældet for dig.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Hytacand®

Hytacand® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE HYTACAND®

Tag altid Hytacand® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1 tablet én gang daglig.

Børn: Du må ikke give Hytacand® til børn.

Nedsat nyrefunktion: Du må ikke tage Hytacand®, hvis du har stærkt nedsat nyrefunktion. Tal med lægen.

Nedsat leverfunktion: Du må ikke tage Hytacand®, hvis du har stærkt nedsat leverfunktion eller galdevejsobstruktion (problem med at udskille galde fra galdeblæren).

Hvis du har taget for mange Hytacand®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere af Hytacand® end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Symptomer på overdosering kan være væsketab, svimmelhed, lavt blodtryk, tørst, hurtig puls, uregelmæssig puls, sløvhed/nedsat bevidsthedsgrad og muskelkramper.

Hvis du har glemt at bruge Hytacand®

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage denne straks, du kommer i tanke om det, medmindre det er tid til næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag næste dosis som sædvanligt.

Hvis du holder op med at bruge Hytacand®

Dit blodtryk kan stige igen, hvis du holder op med at tage Hytacand®. Derfor skal du ikke stoppe med behandlingen uden først at tale med din læge.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Hytacand® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er sædvanligvis milde og forsvinder efter kort tid.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge eller skadestue.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
- Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue.
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. anafylaktisk reaktion. Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Åndedrætsbesvær, evt. lungebetændelse og vand i lungerne. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
- Gulsot. Kontakt lægen.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
- Voldsomt udslæt som udvikler sig hurtigt med dannelse af vabler eller afskalning af huden. Eventuelt også med vabler i munden (kutan lupus erythematosus). Kontakt lægen.
- Forværring af allerede forekommende lupus erythematosus-lignende symptomer.
- Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt pga. nedsat nyrefunktion. Kontakt snarest lægen.
- Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Unormal leverfunktion eller leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Kvalme evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion eller akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Svimmelhed.
- Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Forhøjet urinsyre. Kan medføre urinsyreigt (smerter i led, hævede led).
- Ændringer i resultater af blodprøver og/eller urinprøver:
 - Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 - Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 - Forhøjer kolesterol, sukkerindhold eller urinsyre i blodet.
- Følelse af at være let omåttet.
- Udskillelse af glukose i urinen.
- Følelse af svaghed.
- Luftvejsinfektion.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
- Appetitmangel.
- Maveirritation.
- Diarré.
- Forstoppelse.
- Udslæt.
- Nældefeber.
- Øget følsomhed af huden for lys.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge eller skadestue.
- Søvnforstyrrelser.

- Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Rastløshed.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
- Forbigående synsforstyrrelser.
- Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Stive, rykvisse bevægelser.
- Feber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Hovedpine.
- Kvalme.
- Forhøjede leverenzym (ingen symptomer). Kan ses i forbindelse med testresultater.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Hududslæt.
- Kløe.
- Hoste
- Rygsmerter.
- Smerter i leddene.
- Muskelsmerter.

Hyppighed ikke kendt:

- Akut nærsynethed
- Akut grøn stær

Hytacand[®] kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Hytacand[®] efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hytacand[®] indeholder

- Aktive stoffer: Candesartan cilexetil 16 mg og hydrochlorthiazid 12,5 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Carmellosecalcium, hydroxypropylcellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, macrogol 8000, jernoxid rød-brun (E 172), jernoxid gul (E 172).

Pakningsstørrelser

Hytacand[®] findes i pakninger med 28 eller 90 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Hytacand[®] er et registreret varemærke, der tilhører AstraZeneca AB.