

**Indlægsseddel: Information til brugeren**

# ELIGARD<sup>®</sup> 22,5 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

**leuprorelinacetat**



**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret ELIGARD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk).

#### Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge ELIGARD
3. Sådan skal du bruge ELIGARD
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
7. Information til sundhedspersonale

#### 1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i ELIGARD hører til gruppen af de såkaldte gonadotropin frigivende hormoner. Denne type medicin hæmmer nogle bestemte kønshormoner (testosteron).

ELIGARD anvendes til behandling af metastaserende hormonfølsom **prostatacancer** hos voksne mænd og til behandling af højrisiko ikke-metastaserende hormonfølsom prostatacancer i kombination med strålebehandling.

#### 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge ELIGARD

#### Brug ikke ELIGARD

- Hvis du er en **kvinde eller et barn**.
- Hvis du er **overfølsom (allergisk)** over for det aktive stof leuprorelinacetat, medicin med lignende virkning, som det naturligt forekommende hormon gonadotropin eller et af de øvrige indholdsstoffer i ELIGARD (angivet i punkt 6).
- Hvis du har fået **fjernet testiklerne ved operation**. I sådanne tilfælde fører ELIGARD ikke til en yderligere nedgang i serumtestosteronniveauet.
- Som eneste behandling, hvis du har symptomer med pres på rygmarven eller svulst i rygsøjlen. I sådanne tilfælde kan ELIGARD kun anvendes i kombination med anden medicin mod prostatakræft.

#### Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger ELIGARD

- Hvis du har hjerte- eller karsygdomme, inklusive hjerterytmeproblemer (arytmi), eller er i behandling med lægemidler for disse lidelser. Risikoen for hjerterytmeproblemer kan stige ved brug af ELIGARD.
- Hvis du har **vandladningsbesvær**. Du skal følges nøje i de første uger af behandlingen.
- Hvis **der opstår pres på rygmarven eller vandladningsbesvær**. I forbindelse med brug af andre lægemidler med lignende virkningsmekanisme som ELIGARD er der blevet rapporteret tilfælde af alvorlig pres på rygmarven og indsnævring af lederen mellem nyrerne og urinblæren. Dette kan føre til symptomer på lammelser. Hvis sådanne komplikationer opstår, bør standardbehandling påbegyndes.
- Hvis du oplever pludselig hovedpine, opkastning, ændret mental tilstand og nogle gange hjertekollaps inden for to uger, efter du har taget ELIGARD, skal du kontakte lægen eller sundhedspersonalet. Dette er sjældne tilfælde, der kaldes pituitær apopleksi, som er rapporteret FOR ANDRE LÆGEMIDLER med en virkningsmekanisme, som ligner ELIGARD's.
- Hvis du har **sukkersyge** (diabetes mellitus, forhøjede blodsukkerværdier). Du skal undersøges regelmæssigt under behandlingen.
- Behandling med ELIGARD kan øge risikoen for knoglebrud på grund af osteoporose (nedsat knogletæthed).
- Der er rapporteret depression hos patienter som bruger ELIGARD. Du skal informere din læge, hvis du oplever nedtryktthed, mens du bruger ELIGARD.
- Der er rapporteret hjerteproblemer hos patienter, som bruger medicin svarende til ELIGARD, og det er uvist om dette har sammenhæng med disse lægemidler. Du skal informere din læge, hvis du bruger ELIGARD og udvikler tegn eller symptomer på hjerteproblemer.
- Der er rapporteret krampeanfald hos patienter efter administration af ELIGARD. Du skal informere din læge, hvis du får krampeanfald ved brug af ELIGARD.

#### Komplicationer ved opstart af behandling

I løbet af den første behandlingsuge er der som regel en lille stigning af det mandlige kønshormon testosteron i blodet. Dette kan føre til en **forbigående forværring** af sygdomsrelaterede symptomer, og også nye symptomer kan opstå. Dette omfatter især knoglesmerter, vandladningsforstyrrelser, pres på rygmarven eller udskillelse af blod i urinen. Disse symptomer aftager normalt, når behandlingen fortsættes. Hvis symptomerne ikke aftager, bør du kontakte din læge.

#### Hvis ELIGARD ikke har en virkning

Nogle patienter vil have tumorer, som ikke er følsomme for nedsat testosteronniveau. Du bør kontakte din læge, hvis du har indtryk af, at virkningen af ELIGARD er for svag.

#### Brug af anden medicin sammen med ELIGARD

ELIGARD kan påvirke nogle lægemidler, som bruges til at behandle hjerterytmeproblemer (f.eks. kinidin, procainamid, amiodaron og sotalol) eller kan øge risikoen for hjerterytmeproblemer, når det bruges sammen med visse andre lægemidler (f.eks. methadon (anvendes til smertelindring og ved narkotika afvænnning), moxifloxacin (et antibiotikum), antipsykotika som anvendes til alvorlige psykiske lidelser).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

#### Graviditet, amning og frugtbarhed

ELIGARD er ikke beregnet til brug hos kvinder.

#### Trafik- og arbejdssikkerhed

Træthed, svimmelhed og synsforstyrrelser kan være bivirkninger ved behandlingen med ELIGARD eller et resultat af sygdommen. Du skal være forsigtig med at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du har disse symptomer.

#### 3. Sådan skal du bruge ELIGARD

#### Dosering

Brug altid ELIGARD nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hvis ikke andet er aftalt med lægen, gives ELIGARD 22,5 mg **én gang hver 3. måned**.

Den indsprøjtede opløsning danner et depot, som afgiver leuprorelinacetat jævnt fordelt i tre måneder.

#### Yderligere undersøgelser

Virkningen af behandling med ELIGARD skal kontrolleres af din læge ved at undersøge sygdomstegn og ved at måle mængden af prostata specifikt antigen (PSA) i blodet.

#### Administrationsvej

ELIGARD må kun gives af din **læge** eller en **sygeplejerske**. Du vil også tilberede den færdige opløsning (i overensstemmelse med vejledningen i *pkt. 7 Information til sundhedspersonale* i slutningen af denne indlægsseddel).

Når indholdet i sprøjten er færdigblandet, gives ELIGARD som subkutan indsprøjtning (injektion i underhuden). Indsprøjtning i årerne (intra-arteriel) eller i venerne (intravenøs) skal absolut undgås. Ligesom for andre lægemidler, som indsprøjtes subkutan, bør injektionsstedet varieres fra gang til gang.

#### Hvis du har fået for meget ELIGARD

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere ELIGARD, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Da indsprøjtningen sædvanligvis gives af din læge eller andet kvalificeret personale, forventes der ikke overdosering.

Hvis du alligevel får en højere dosis, vil din læge undersøge dig, og give dig en passende behandling.

#### Hvis indgivelse af ELIGARD er blevet glemt

Du bør kontakte din læge, hvis du tror, at din 6-måneders indsprøjtning af ELIGARD er blevet glemt.

#### Hvis du holder op med at bruge ELIGARD

Behandling af prostatakræft med ELIGARD er som regel langvarig. Behandlingen må derfor ikke afbrydes, selv om symptomer forbedres eller forsvinder helt.

Hvis behandling med ELIGARD afbrydes for tidligt, kan der forekomme en forværring af sygdomsrelaterede symptomer.

#### Du må ikke afbryde behandlingen før tid uden at have kontaktet lægen.

**Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.**

#### 4. Bivirkninger

ELIGARD kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, som er blevet set under behandling med ELIGARD, skyldes hovedsageligt den specifikke virkning af det aktive stof leuprorelinacetat, dvs. øgning og reduktion i mængden af visse hormoner. De hyppigste bivirkninger er hedeure (hos ca. 58 % af patienterne), kvalme, utilpashed og træthed samt forbigående lokal irritation på injektionsstedet.

#### Bivirkninger ved starten af behandlingen

I de første uger af behandlingen med ELIGARD kan du opleve en forværring af sygdomsrelaterede symptomer, fordi der i starten normalt sker en lille stigning af det mandlige kønshormon testosteron i blodet. Din læge kan derfor give dig et passende antiandrogen (lægemiddel, der hæmmer virkningen af testosteron) i starten af behandlingen for at dæmpe eventuelle eftervirkninger (*se også pkt. 2 Det skal du vide, før du begynder at bruge ELIGARD, Komplikationer ved opstart af behandling*).

#### Lokale bivirkninger

Lokale bivirkninger, som er beskrevet efter injektion med ELIGARD, er de samme som for andre lægemidler, som også gives subkutan (lægemidler, som injiceres i underhuden). Mild brænden/svien umiddelbart efter injektion er meget almindelig. Stikkende følelse og smerte efter injektion er meget almindelig ligesom blå mærker på injektionsstedet. Rødme på injektionsstedet er rapporteret som en almindelig bivirkning. Tiltagende hårdhed og sårdannelse er ikke almindeligt.

Disse lokale bivirkninger efter subkutan injektion er milde og rapporteret som værende af kort varighed. De opstår ikke igen mellem hver injektion.

**Meget almindelige bivirkninger** (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

- Hedeture
- Spontane blødninger i huden eller i slimhinderne, hudrødme
- Træthed, bivirkninger relateret til indsprøjtningen (*se også lokale bivirkninger ovenfor*)

#### Almindelige bivirkninger

- Betændelse i næse/svælg (symptomer som ved forkølelse)
- Kvalme, utilpashed, diarré, betændelse i mave og tarm (gastroenterit/kolit)
- Kløe, natlige svedeture
- Ledsmerter
- Uregelmæssig vandladning (også om natten), vandladningsbesvær, smertefuld vandladning, nedsat mængde urin
- Ømhed i brystvævet, hævelse af bryster, formindskelse af testikler, smerter i testiklerne, ufrugtbarhed, erektil dysfunktion, reduceret penisstørrelse
- Kulderystelser (tilfælde af voldsom rysten med høj feber), svaghed
- Forlænget blødning, ændringer i blodværdier, reduktion af røde blodlegemer / lavt antal røde blodlegemer

**Ikke almindelige bivirkninger** (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

- Urinvejsinfektion, lokal hudinfektion
- Forværring af sukkersyge (diabetes mellitus)
- Mareridt, depression, nedsat libido
- Svimmelhed, hovedpine, ændret berøringsfølelse, søvnløshed, smagsforstyrrelser, ændret lugtesans
- Hypertension (højt blodtryk), hypotension (lavt blodtryk)
- Andenød
- Forstoppelse, mundtørhed, dyspepsi (fordøjelsesbesvær med symptomer på mæthed, mavesmerter, opstød, kvalme, opkast, brændende følelse i maven), opkast
- Klamhed, øget svedtendens
- Rygsmerter, muskelkrampe
- Hæmaturi (blod i urinen)
- Blærespasmer, hyppig vandladning, vandladningsbesvær
- Forstørrelse af brystvæv hos mænd, impotens
- Letargi (søvnliggende sløvhedstilstand), smerte, feber
- Vægtstigning
- Balanceproblemer, svimmelhed
- Muskelsvind/tab af muskelvæv efter langvarig brug

#### Sjældne bivirkninger

- Unormale ufri-villige bevægelser
- Pludseligt bevidsthedstab, besvimelse

- Flatulens (luftudspilning af maven), opstød
- Hårtab, hududslæt (filipenser)
- Brystsmerter
- Sår på injektionsstedet

**Meget sjældne bivirkninger** (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

- Nekrose (vævsdød) på injektionsstedet

#### Ikke kendt

- Ændringer i EKG (QT-forlængelse)

#### Andre bivirkninger

Andre bivirkninger, som er beskrevet i litteraturen i forbindelse med behandling med leuprorelin, det aktive stof i ELIGARD, er ødemer (ophobning af væske i væv, som fører til opsvulmen af hænder og fødder), blodprop i lungerne (som giver symptomer som åndenød, åndedrætsbesvær og brystsmerter), hjertebanken (du bliver opmærksom på, at dit hjerte slår), muskelsvækkelse, kuldegysninger, udslæt, svækket hukommelse og svækket syn. Nedsat knoglevæv (osteoporose) kan forventes efter langvarig behandling med ELIGARD, og risikoen for knoglebrud vil stige.

Alvorlige allergiske reaktioner som medfører åndedrætsbesvær eller svimmelhed, er sjældent rapporteret efter administration af lægemidler i samme klasse som ELIGARD.

Der er rapporteret krampeanfald efter administration af lægemidler i samme klasse som ELIGARD.

#### Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)
E-mail: [dkma@dkma.dk](mailto:dkma@dkma.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

#### 5. Opbevaring

Opbevar ELIGARD utilgængeligt for børn.

Brug ikke ELIGARD efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

#### Opbevaringsbetingelser

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).
Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Dette produkt skal opnå stuetemperatur før injektion. Tag produktet ud af køleskabet cirka 30 minutter før brug. Efter at det er taget ud af køleskabet, kan produktet opbevares i original emballage ved stuetemperatur (under 25°C) i op til 4 uger.

Efter åbning af bakken skal præparatet blandes straks, og det skal anvendes med det samme. Kun til engangsbrug.

#### Bortskaffelse af medicinrester

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

#### 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

#### ELIGARD indeholder:

Aktivt stof: Leuprorelinacetat.
En forfyldt injektionssprøjte (sprøjte B) indeholder 22,5 mg leuprorelinacetat.

Øvrige indholdsstoffer: Poly(DL-lactat-co-glycolsyre) (75:25) og N-methyl-2-pyrrolidon i den forfyldte injektionssprøjte med solvens til injektionsvæske, opløsning (sprøjte A).

#### Udseende og pakningsstørrelser

ELIGARD er et pulver og en solvens til injektionsvæske, opløsning.

ELIGARD 22,5 mg findes i følgende pakninger:

- En formstøbt bakkepakning bestående af to formstøbte bakker i en æske. Den ene bakke indeholder en forfyldt sprøjte A, et langt stempel til sprøjte B og en pose tørremiddel. Den anden bakke indeholder en forfyldt sprøjte B, en pose tørremiddel og en steril 20-gauge-kanyle.
- En flerpak med sæt å 2x2 forfyldte injektionssprøjter (1 x sprøjte A; 1 x sprøjte B).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N

#### Ompakket og frigivet af

EU-Pharma B.V.
Almere
Holland

**Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2017.**


#### 7. Information til sundhedspersonale

**Lad præparatet opnå stuetemperatur ved at tage produktet ud af køleskabet cirka 30 minutter før brug.**
**Forbered patienten til injektionen først, og bland derefter præparatet som angivet i følgende vejledning. Hvis produktet ikke tilberedes med den korrekte teknik, bør det ikke administreres, da manglende klinisk effekt kan opstå på grund af forkert rekonstituering af produktet.**


**Trin 1:** Åbn begge bakker (træk folien af fra det hjørne, hvor der er en lille boble), og læg indholdet på et rent sted (to bakker indeholdende sprøjte A (figur 1.1) og sprøjte B (figur 1.2)). Smid poserne med tørremiddel ud.









**Trin 2: Træk (ikke skru)** det korte, blå stempel og den fastgjorte grå gummiprop ud af sprøjte B, og smid det ud (figur 2). **Forsøg ikke at blande præparatet med 2 gummiproppe tilstede i sprøjten.**



**Trin 3:** Skru forsigtigt det ekstra stempel til sprøjte B på den tilbageværende grå gummiprop i sprøjte B (figur 3).




**Trin 4:** Fjern den grå gummikappe på Sprøjte B og læg sprøjten ned (figur 4).




**Trin 5:** Hold sprøjte A i en lodret position for at sikre, at der ikke løber væske ud, og skru den klare kappe af Sprøjte A (figur 5).



**Trin 6:** Sæt de to sprøjter sammen ved at skubbe og dreje sprøjte B på sprøjte A indtil den sidder fast (figur 6a og 6b). **Må ikke strammes for hårdt.**



**Trin 7:** Vend de sammenkoblede sprøjter om og fortsæt med at holde sprøjterne vertikalt, med sprøjte B nederst, imens det flydende indhold i sprøjte A injiceres ind i sprøjte B, der indeholder pulveret (leuprorelinacetat) (figur 7).




**Trin 8:** Bland præparatet grundigt ved forsigtigt at skubbe indholdet i begge sprøjter frem og tilbage mellem sprøjterne (60 gange i alt, hvilket tager ca. 60 sekunder), der holdes i en vandret position for at opnå en ensartet, viskøs blanding (figur 8). Sprøjtesystemet må ikke bøjes (bemærk at dette kan føre til lækage, da sprøjterne delvist bliver skruet løs).


**Når opløsningen er grundigt blandet, vil den være viskøs med en farve, der går fra farveløs over hvid til bleggul (hvilket kan omfatte hvide nuancer til bleggul).**

**Vigtigt: Efter rekonstituering fortsættes med næste trin straks, da opløsningens viskositet øges over tid. Det blandede præparat må ikke opbevares i køleskab.**

Bemærk: Præparatet skal blandes som beskrevet; omrystning vil IKKE blande præparatet tilstrækkeligt.




**Trin 9:** Hold sprøjterne lodret med sprøjte B nederst. Sprøjterne skal sidde sikkert sammenkoblet. Træk alt det blandede præparat ind i sprøjte B (kort, bred sprøjte) ved at trykke stemplet i sprøjte A ned og trække stemplet i sprøjte B lidt ud (figur 9).




**Trin 10:** Skru sprøjte A af, mens der fortsat trykkes ned på stemplet i sprøjte A (figur 10). Sørg for, at der ikke løber noget præparat ud, da kanylen i så fald ikke vil sidde korrekt fast, når den sættes på.


Bemærk: Der kan være en stor eller få små luftbobler i opløsningen. Dette er acceptabelt. **Forsøg ikke at fjerne luftboblerne i sprøjte B på nuværende tidspunkt, da opløsning kan gå tabt!**



**Trin 11:** Hold sprøjte B lodret. Åbn pakke med sikkerhedskanylen ved at trække i papirfanen og tag sikkerhedskanylen ud. Fastgør sikkerhedskanylen til sprøjte B ved at holde i sprøjten, og dreje kanylen med uret, indtil den sidder fast (figur 11). **Må ikke strammes for hårdt.**



**Trin 12:** Tag hættten af kanylen før administration (figur 12). **Vigtigt: Aktivér ikke sikkerhedskanylemekanismen før administration.**




**Trin 13:** Fjern alle store luftbobler fra sprøjte B før administration. Administrer præparatet subkutant. Sørg for at hele indholdet af sprøjte B injiceres.

**Trin 14:** Efter injektion aktiveres sikkerhedsbeskyttelsen ved at benytte en af nedenstående metoder.


#### 1. Lukning på en flad overflade

Tryk det hængslede stykke af sikkerhedsbeskyttelsen ned mod en fast overflade (figur 14.1a og b), så nålen dækkes og beskyttelsen låser. Korrekt aktivering af sikkerhedsmekanismen bekræftes ved hørligt og føleligt "klik". Den låste position dækker nålespiden fuldstændigt (figur 14.1b).



#### 2. Lukning med tommelfinger

Placér din tommelfinger på det hængslede stykke og skub sikkerhedsbeskyttelsen fremover mod nålespiden (figur 14.2a og b), så nålen dækkes og beskyttelsen låser. Korrekt aktivering af sikkerhedsmekanismen bekræftes ved hørligt og føleligt "klik". Den låste position dækker nålespiden fuldstændigt (figur 14.2b).



**Trin 15:** Når sikkerhedsmekanismen er aktiveret smides kanylen og sprøjte straks i en beholder beregnet til skarpe genstande.