

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mestionon® 60 mg, overtrukne tabletter

Pyridostigminbromid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Mestionon® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mestionon®
3. Sådan skal du tage Mestionon®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Mestionon® hæmmer nedbrydningen af signalsubstansen acetylcholin, som formidler nerveimpulser til musklerne. Mestionon® hjælper hjernens meddelelser til lettere at nå igennem til musklerne.

Du kan bruge Mestionon® til behandling af myasthenia gravis (alvorlig muskelsvaghed).

Du kan også bruge Mestionon® til behandling af slaphed af blære- og tarmmuskulatur.

Lægen kan foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MESTIONON®

Tag ikke Mestionon®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for pyridostigminbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har mekanisk tarmslyng.
- hvis du har forstoppelse i urinrør.
- hvis du har bughindebetændelse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Behandling med Mestionon® kræver omhyggelig kontrol hvis du lider af følgende sygdomme.

Tal med din læge, hvis du:

- har astma.
- har epilepsi eller parkinsonisme.
- har nedsat nyrefunktion.
- Har kronisk lungesygdom (KOL).
- har lavt blodtryk.
- Har haft en blodprop.
- har en hjertesygdom.
- har forhøjet tryk i vagusnerven (som går til svælg, bryst og bughule).
- har mavesår.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin som udvider pupillen (atropin og hyoscin).
- muskelafslappende medicin (suxamethon).
- betablokkere, da langsom puls og lavt blodtryk kan forekomme.
- medicin mod allergi og transportsyge (antihistaminer).
- Steroider eller medicin til hæmning af immunsystemet.
- Medicin der indeholder methylcellulose.
- Aminoglykosider, lokal og generel bedøvende midler, hjertemedicin, samt andet medicin der indeholder pyridostigmin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Mestionon® efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Mestionon® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mestionon® kan give bivirkninger, f.eks. lavt blodtryk, svimmelhed, tågesyn og sløret syn, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer

Mestionon® indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MESTIONON®

Tag altid Mestionon® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Myasthenia gravis:

Voksne: 1-3 tabletter (60-180 mg) 2-4 gange daglig.

Slaphed af blære- og tarmmuskulatur:

Voksne: 1 tablet (60 mg) hver 4. time.

Nedsat nyrefunktion

Hvis du har nedsat nyrefunktion, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis.

Hvis du har taget for mange Mestionon® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Mestionon® tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være kraftigspyttflåd, næseflåd, øget tåreflåd, rastløshed, sved, koliksmærter, kvalme, opkastning, diaré, muskeltrækkninger og tiltagende muskellammelse. Desuden kan ved meget

høje doser forekomme vejtrækningsbesvær, åndenød, kræmper, koma, kolik, svækket vejtrækning og hjertebesvær.

Hvis du har glemt at tage Mestinon®

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en tablet. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Vejtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Meget langsom puls – tendens til hjertebanken, svimmelhed, besvimelse, kræmper. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Bevidsthedstab pga. lavt blodtryk. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtige små muskelsammentrækninger.
- Små pupiller, øget tåreflåd, tågesyn, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
- Indsnævring eller krampe i bronkierne (bronkospasme). Øget slimproduktion i lungerne som kan give vejtrækningsbesvær. Kan blive alvorligt. Hvis du får vejtrækningsbesvær, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Koliksmærter, diaré, kvalme, opkastning, sure opstød, øgede muskelsammentrækninger i mave og tarm, øget spyttflåd.
- Ufrivillig vandladning.
- Kraftig sveden.
- Muskelsvaghed, muskelskade, muskelkræmper, rystelse af muskel, muskeltrækninger – tiltagende muskellammelser.
- Appetitløshed.
- Betændelse/irritation af næseslimhinden. (rinit)

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Svimmelhed.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Rastløshed, søvnløshed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Hududslæt, hårtab ved langtidsbrug.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Nældefeber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Sløret syn.
- Tilvænning.

Mestinon® kan være vanedannende.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevare Mestinon® utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Mestinon® ved temperaturer over 25°C.

Tag ikke Mestinon® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Mestinon® 60 mg, overtrukne tabletter indeholder

- Aktivt stof: Pyridostigminbromid 60 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Kolloid vandfri silica, pregelatineret stivelse, povidon, majsstivelse, talcum, magnesiumstearat, saccharose, risstivelse, spraytørret akaciegummi, gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172), paraffin, tynd paraffinolie.

Udseende og pakningsstørrelse

Mestinon® 60 mg er orange runde filmovertrukne tabletter.

Mestinon® 60 mg fås i en pakning med 150 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Mestinon® er et registreret varemærke, der tilhører ICN Dutch Holdings B.V.