

Persantin® 100 mg, overtrukne tabletter

Dipyridamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Persantin® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Persantin®
3. Sådan skal du tage Persantin®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Persantin® nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen, og forhindrer derved dannelsen af blodpropper.

Du kan tage Persantin® sammen med anden blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin) til forebyggelse af blodpropper, hvis du har haft en blodprop i hjertet.

Lægen kan have givet dig Persantin® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PERSANTIN®

Tag ikke Persantin®

hvis du er overfølsom (allergisk) over for dipyridamol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Persantin®

- Tal med lægen inden du tager Persantin®
- hvis du har en alvorlig hjerte- eller karsygdom.
- hvis du har en sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis).

Hvis du skal have foretaget en undersøgelse af din hjertefunktion, skal du inden undersøgelsen fortælle lægen, at du tager Persantin®. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager

- medicin mod uregelmæssig hjerterytme (adenosin). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
- medicin mod forhøjet blodtryk.
- medicin mod muskelsygdom (myasthenia gravis).
- anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin eller acetylsalicylsyre).
- medicin mod astma eller KOL (theophyllin, xantiner).

Brug af Persantin® sammen med mad og drikke

Du kan tage Persantin® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Persantin®. Tal med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Persantin®, da Persantin® går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Persantin® kan give bivirkninger (hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Persantin®

Persantin® indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PERSANTIN®

Tag altid Persantin® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 tablet 4 gange dagligt.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn:

Børn må normalt ikke få Persantin®.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Persantin® tabletter

Kontakt lægen, skadestue eller apoteket, hvis du har taget flere Persantin® tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være varmeformelse, rødme, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed, hovedpine, forhøjet puls, fald i blodtryk, hurtigt åndedræt, hurtig puls, smerter i brystet, bevidstløshed, vejrtrækningsbesvær, svækket vejrtrækning, mavetarm gener, blødningstendens og gulfarvning af huden.

Hvis du har glemt at tage Persantin®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Persantin® kan som al anden medicin give bivirkninger, med ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Åndenød, angst, bryst smerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklens eller blodprop i hjertet. Ring 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbensbuen på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

Hyppighed ikke kendt

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Åndenød pga. overfølsomhed. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Øget blødning under eller efter operation. Kontakt lægen eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos over 10 ud af 100 patienter):

- Hovedpine, svimmelhed.
- Kvalme, diarré.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Opkastning.
- Udslæt.
- Muskelsmerter.

Hyppighed ikke kendt

- Udslæt, nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring evt. 112.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas

eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

- Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Hædture.
- Nældefeber.

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Tag ikke Persantin® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet, må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Persantin® 100 mg, overtrukne tabletter indeholder

- Aktivt stof: Dipyridamol 100 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Vandfrit calciumhydrogenphosphat, majsstivelse, magnesiumstearat, saccharose, talkum, akaciegummi, titandioxid (E171), macrogol 6000, hvid bivoks, carnaubavoks, opløselig stivelse, kolloid silica.

Udseende og pakningsstørrelse

Persantin® 100 mg er en hvis overtrukket tablet

Persantin® fås i pakninger med 50 og 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:
EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Persantin® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.