

Relpax® 40 mg, filmovertrukne tabletter

Eletriptan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Relpax® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Relpax®
3. Sådan skal du tage Relpax®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Relpax® hører til den gruppe medicin, der kaldes serotoninreceptor-agonister. Serotonin er et stof, der findes naturligt i hjernen, og som virker sammentrækkende på blodkarrene.

Relpax® anvendes til behandling af hovedpinefasen i migræneanfald med eller uden aura hos voksne. Fasen kaldet aura kan gå forud for hovedpinefasen, og denne kan omfatte synsforstyrrelser, følelsesløshed og taleforstyrrelser.

Lægen kan have givet dig Relpax® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE RELPAX®

Tag ikke Relpax®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for eletriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har meget dårlige nyrer eller lever.
- hvis du har moderat til kraftig forhøjet blodtryk eller ubehandlet højt blodtryk.
- Hvis du har eller har haft hjerteproblemer (f.eks. hjertetilfælde, hjertekrampe, hjertesvigt eller uregelmæssig puls (arytmi).
- Hvis du har haft kredsløbsforstyrrelser i arme og ben.
- Hvis du har haft en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning (også selvom det kun varende i få minutter eller få timer).
- hvis du inden for 24 timer har taget anden medicin mod migræne, f.eks. ergotamin eller methysergid. Tag ikke anden medicin mod migræne 24 timer efter du har taget Relpax®.
- hvis du samtidig tager andre migrænemidler (triptaner).

Tal med lægen inden du tager Relpax, hvis noget af det ovenstående passer på dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til lægen, inden du begynder at tage Relpax, hvis noget af det, der står herunder, gælder for dig:

- du har diabetes
- du ryger eller bruger nikotin-afvænningsprodukter
- du er mand over 40 år
- du er kvinde og har været i overgangsalderen
- du eller en i din familie lider af en hjertesygdom
- du har tidligere fået at vide, at du har øget risiko for hjertesygdom.

Gentagne eller overdreven brug af medicin mod hovedpine kan give kronisk daglig hovedpine, der gør at behandlingen midlertidigt må afbrydes. Kontakt lægen, hvis dette forekommer.

Brug af anden medicin sammen med Relpax®

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- hvis du inden for 24 timer har taget anden medicin mod migræne, f.eks. ergotamin eller methysergid. Tag ikke anden medicin mod migræne 24 timer efter du har taget Relpax®.
- hvis du samtidig tager andre migrænemidler (triptaner).
- svamp (ketoconazol, itraconazol).
- infektioner (erythromycin, clarithromycin, josamycin).
- AIDS og HIV (ritonavir, indinavir, nelfinavir).
- depression eller anden psykisk lidelse, de såkaldte SSRI (selektive serotonin-genoptagshæmmere) eller SNRI (serotonin noradrenalin-genoptagshæmmere). Denne medicin kan øge risikoen for at udvikle serotonin-syndrom, når de tages samtidig med visse midler mod migræne. Se også afsnit 4. Bivirkninger.

Du bør være opmærksom på, at risikoen for bivirkninger kan øges, hvis du tager Relpax® samtidig med urtemedicin, der indeholder perikum (hypericum perforatum).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Relpax® efter aftale med lægen.

Amning

Relpax® går over i modermælken. Det er bedst at undgå amning 24 timer efter indtagelse af Relpax®. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Migræne eller behandling med Relpax® kan forårsage døsigthed og svimmelhed. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Relpax®

Relpax® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Relpax® indeholder også farvestoffet Sunset Yellow FCF (E110), som kan medføre allergiske reaktioner.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE RELPAX®

Tag altid Relpax® nøjagtigt efter lægen anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne

Relpax® kan tages på ethvert tidspunkt efter at hovedpinefasen er begyndt, men det er bedst at tage medicinen så hurtigt som muligt. Du bør dog kun tage Relpax® i hovedpinefasen af migræneanfaldet. Du bør ikke tage Relpax® for at forebygge et migræneanfald.

Den sædvanlige dosis er

- 1 tablet på 40 mg.
- Tabletterne bør synkes hele med vand.
- Hvis den første tablet ikke har lettet migrænen, bør du ikke tage flere tabletter for det samme anfald.
- Hvis den første tablet har lettet migrænen, og hovedpinen kommer tilbage, kan du tage endnu en tablet. I dette tilfælde skal du vente mindst 2 timer mellem den første og den anden tablet.
- Du bør ikke tage mere end 80 mg (2 tabletter på 40 mg) i løbet af 24 timer.
- Fortæl din læge, hvis du mener at en dosis på 40 mg ikke letter din migræne. Lægen vil måske beslutte at øge dosis til 2 tabletter på 40 mg ved nye anfald.

Ældre

Relpax® bør ikke bruges til patienter over 65 år.

Børn og teenagere under 18 år

Relpax® bør ikke bruges til børn og unge under 18 år.

Nedsat leverfunktion

- Relpax® kan anvendes til patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion.
- Den sædvanlige startdosis er 20 mg.
- Du bør ikke tage med end 40 mg i løbet af 24 timer.

- Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis du skal tage.

Nedsat nyrefunktion

Relpax® kan anvendes til patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion. Det er ikke nødvendigt, at nedsætte dosis.

Hvis du har taget for mange Relpax®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Relpax® tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være forhøjet blodtryk og andre mere alvorlige hjertesymptomer.

Hvis du har glemt at tage Relpax®

Relpax® kan tages på ethvert tidspunkt under hovedpinefasen, men det er bedst at tage medicinen så hurtigt som muligt.

Tal med lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Relpax® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Shock (lavt blodtryk, svimmelhed, evt. besvimelse, mental sløvhed). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Astma (anfaldsvis åndenød, hoste og hvæsende vejrtrækning). Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Smerter i brystet, sammensnørende eller trykkende fornemmelse, hjertebanken, hurtig puls, følelse af varme.
- Svimmelhed, rundtosset, hovedpine, søvnighed, nedsat følelse ved berøring eller nedsat smerteopfattelse.
- Ondt i halsen, sammensnørende fornemmelse af halsen, tør mund, løbende næse.
- Mavesmerter, fordøjelsesbesvær, kvalme (ubehag i maven med trang til at kaste op).
- Muskelstivhed, muskelsvaghed, smerter i ryggen, muskelsmerter.
- Kraftesløshed og svaghed, følelse af varme, kuldegysninger, snue, svedtendens, prikkende eller snurrende fornemmelse, rødmen, smerter.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Åndedrætsbesvær, gaben, luftvejsinfektioner. Åndedrætsbesvær kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Hævelser i ansigt eller hævede hænder og fødder, betændelse eller infektioner i tungen, hududslæt, kløe.
- Øget følelse ved berøring, usikre, langsomme eller hæmmende bevægelser, rysten, talebesvær, smagsforstyrrelser.
- Ændret selvopfattelse, depression, vaskelighed ved at tænke, opstemthed, følelse af uro eller forvirring, humørsvingninger (eufori), sløvhed, utilpashed, søvnløshed. Depression kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Appetitløshed og væggtab, smagsforstyrrelser, tørst.
- Smerter i leddene, slidgigt, knoglesmerter.
- Hyppig vandladning, problemer med vandladning, forøget urinmængde, diare.
- Synsforstyrrelser, øjensmerter, lysfølsomhed, tørre eller våde øjne.
- Øresmerter, susen for ørene (tinnitus).
- Kredsløbsforstyrrelser i arme og ben.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Nældefeber, hudlidelse
- Forstoppelse, svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær, pga. betændelse i spiserøret, hævet tunge, opstød.
- Luftvejsinfektioner.

- Hævede lymfekirtler.
- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Humørsvingninger.
- Smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse, muskelsvaghed, muskeltrækninger. Muskelsvaghed kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Forstoppelse, betændelse i spiserøret, sure opstød.
- Brystmerter.
- Usædvanlig kraftig eller langvarig menstruationsblødning.
- Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
- Stemmeforandring.
- Forhøjede levertal.

Relpax® kan desuden give bivirkninger som besvimelse, for højt blodtryk, tyktarmsbetændelse, opkastning, hændelser i hjernen eller blodkar, utilstrækkelig blodgennemstrømning i hjertet, hjertetilfælde og hjertekrampe (angina pectoris).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Tag ikke Relpax® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet, må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldepanen.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Relpax® 40 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Eletriptan 40 mg (som eletriptanhydrobromid).
- Øvrige indholdsstoffer:
Tabletkerne: MikrokrySTALLinsk cellulose, lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.
Filmovertrek: Titandioxid (E171), hypromellose, lactosemonohydrat, triacetin og Sunset Yellow FCF (E110).

Pakningsstørrelse

Relpax® 40 mg fås i pakninger med 3, 6 og 20 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Relpax® er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Products Inc.