

REQUIP® LP 2 mg depottabletter

Ropinirol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret REQUIP® LP til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage REQUIP® LP
3. Sådan skal du tage REQUIP® LP
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Det aktive indholdsstof i REQUIP® LP er ropinirol, der tilhører en gruppe af lægemidler, der hedder dopaminagonister. Dopaminagonister virker på samme måde i hjernen som det naturlige stof dopamin.

REQUIP® LP depottabletter anvendes til behandling af Parkinsons sygdom. Personer med Parkinsons sygdom har mangel på dopamin i nogle dele af hjernen. Ropinirol har en virkning, som ligner naturlig dopamin, og reducerer således symptomerne ved Parkinsons sygdom.

Lægen kan have givet dig REQUIP® LP for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE REQUIP® LP

Tag ikke REQUIP® LP:

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for ropinirol eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har en alvorlig nyresygdom.
- hvis du har en leversygdom.

Vær ekstra forsigtig med at tage REQUIP® LP:

- Tal med din læge inden du tager REQUIP® LP:
 - hvis du har eller har haft alvorlige psykiske problemer.
 - hvis du har oplevet episoder med usædvanlig trang eller adfærd (såsom øget spilletrang eller øget seksuel adfærd).
 - hvis du har hjertesygdom.

Brug af anden medicin:

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tal med lægen hvis du tager:

- medicin mod andre psykiske problemer, for eksempel sulpirid.
- metoclopramid, der bruges til behandling af kvalme og halsbrand.
- HRT (hormon substitutionsbehandling).
- antibiotika der indeholder ciprofloxacin eller enoxacin.
- anti-depressionsmidlet fluvoxamin.
- andre lægemidler mod Parkinsons sygdom.

Tal med din læge, hvis du får eller for nylig har fået nogle af ovenstående lægemidler. Det er eventuelt nødvendigt at justere dosis.

Tal med lægen hvis du påbegynder eller ophører med rygning. Det kan være nødvendigt at justere dosis.

Brug af REQUIP® LP sammen med mad og drikke:

Du kan tage REQUIP® LP sammen med eller uden for et måltid.

Graviditet og amning:

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke bruge REQUIP® LP, hvis du er gravid, med mindre din læge fortæller dig, at dine fordele ved behandling med REQUIP® LP er større end risikoen for dit ufødte barn.

Fortæl straks din læge, hvis du er gravid, tror at du er gravid eller planlægger at blive gravid.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke bruge REQUIP® LP, da det påvirker mælkeproduktionen.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekanter. Det betyder, at REQUIP® LP kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken.

REQUIP® LP kan gøre dig døsig. REQUIP® LP kan gøre dig ekstremt søvngig og du kan risikere at falde i søvn uden varsel.

Hvis du har mærket dette, må du ikke færdes i trafikken, betjene maskiner eller bringe dig selv i en situation, hvor søvnighed eller det at falde i søvn kan give risiko for alvorlige skader eller død for dig selv eller for andre. Deltag ikke i sådanne aktiviteter, før du ikke længere er påvirket.

Tal med din læge, hvis ovenstående skaber problemer.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i REQUIP® LP:

REQUIP® LP indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE REQUIP® LP

Tag altid REQUIP® LP nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Det kan tage et stykke tid at finde den dosis REQUIP® LP, der er bedst til dig. Den sædvanlige startdosis er 2 mg en gang daglig i den første uge. Derefter kan lægen øge din dosis til 4 mg REQUIP® LP depottabletter en gang daglig fra den anden behandlingsuge. Hvis du er meget gammel, vil lægen muligvis øge dosis langsommere. Efterfølgende vil lægen gradvist øge din dosis, indtil du får den dosis, der passer bedst til dig. Nogle patienter får op til 24 mg REQUIP® LP depottabletter daglig.

Hvis du i starten af behandlingen oplever bivirkninger, som du har svært ved at affinde dig med, så tal med lægen. Lægen kan anbefale at du skifter til en lavere dosis af ropinirol filmovertrukne tabletter, som du tager 3 gange daglig.

Tag ikke mere REQUIP® LP end lægen anbefaler. Det kan tage nogle uger, inden medicinen begynder at virke.

Børn og unge:

REQUIP® LP bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Sådan skal du tage REQUIP® LP:

Tag REQUIP® LP en gang daglig, på samme tidspunkt hver dag.

Synk EQUIP® LP depottabletter hele sammen med et glas vand.

Depottabletterne må ikke deles, tygges eller knuses – hvis du gør det, er der risiko for at overdosere, fordi medicinen vil udløses for hurtigt i kroppen.

Hvis du skifter fra ropinirol filmovertrukne tabletter:

Lægen vil justere din dosis af EQUIP® LP depottabletter, alt efter hvilken dosis du tidligere har fået af ropinirol filmovertrukne tabletter. Tag ropinirol filmovertrukne tabletter som normalt dagen før du skifter. Når du næste morgen tager EQUIP® LP depottabletter, skal du ikke tage ropinirol filmovertrukne tabletter længere.

Hvis du har taget for mange EQUIP® LP:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af EQUIP® LP, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomerne på overdosering er kvalme, opkastning, svimmelhed, følelse af dødsghed, mental eller fysisk træthed, besvimelse, hallucinationer.

Hvis du har glemt at tage EQUIP® LP

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt at tage EQUIP® LP en dag eller mere, så tal med din læge om, hvordan du skal starte behandlingen igen.

Hvis du holder op med at tage EQUIP® LP:

Afbryd ikke behandlingen uden første at have talt med lægen.

Tag EQUIP® LP så længe lægen anbefaler det. Afbryd kun behandlingen hvis din læge råder dig til det.

Hvis du pludselig stopper med at tage EQUIP® LP, kan dine Parkinson symptomer hurtigt blive værre.

Hvis du bliver nødt til at ophøre med behandling med EQUIP® LP, vil din læge gradvist reducere dosis.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

EQUIP® LP kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Psykotiske problemer såsom delirium (uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger) og paranoia. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Dødsghed.
- Kvalme.
- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
- Ufrivillige bevægelser kan i starten af behandlingen opstå hos patienter med fremskreden Parkinson sygdom.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Svimmelhed.
- Forstoppelse.
- Opkastning, halsbrand, mavesmerter.
- Hævede fødder, ankler og hænder.
- Hævelse af benene. Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Pludselig indtræden af søvn, udpræget dødsghed i dagtimerne.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Følelse af svimmelhed eller besvimelse, når man rejser sig pludseligt fra siddende eller liggende stilling, pga. lavt blodtryk.

Hyppighed ukendt:

- Usædvanlig trang eller adfærd, herunder øget spilletang og øget seksuel adfærd. Kontakt lægen.
- Leverreaktioner, især forhøjede leverenzymen, som viser sig i resultater i blodprøver.

Hvis du tager levodopa:

Patienter, der tager EQUIP® LP sammen med levodopa (L-dopa), kan med tiden udvikle andre bivirkninger:

- Ufrivillige bevægelser er en meget almindelig bivirkning.
- Forvirring er en almindelig bivirkning.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller de får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger kan dermed blive indberettet til Lægemeddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemeddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemeddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke EQUIP® LP efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 25°C.

Opbevares i ydre karton for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

EQUIP® LP indeholder:

- Aktivt stof: Ropinirol som hydrochlorid 2 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose, hydrogeneret ricinusolie, carmellosenatrium, povidon (K29-32), maltodextrin, magnesiumstearat, lactosemonohydrat, kolloid vandfri silica, mannitol (E421), jernoxid gul (E172), glyceroldibehenat, OPADRY pink OY-S-24900 (hypromellose, jernoxid gul (E172), titandioxid (E171), macrogol 400, jernoxid rød (E172)).

Pakningsstørrelser:

EQUIP® LP 2 mg findes i pakninger med 21, 28 og 84 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

EQUIP® er et registreret varemærke, der tilhører SmithKline Beecham PLC.