

Levemir® 100 E/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Insulin detemir

E90227A-01

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Levemir til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

- Virkning og anvendelse
- Det skal du vide, før du begynder at bruge Levemir
- Sådan skal du bruge Levemir
- Bivirkninger
- Opbevaring
- Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Levemir er et moderne insulin (insulinanalog) med en langtidsvirkende effekt. Moderne insulinpræpa-rater er forbedrede versioner af humaninsuliner.

Levemir anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos voksne, unge og børn, der er fyldt 2 år med sukkersyge (diabetes mellitus). Sukkersyge er en sygdom, hvor kroppen ikke producerer tilstrækkeligt insulin til at kunne kontrollere blodsukkerniveauet. Levemir kan anvendes i kombination med tabletter mod sukkersyge eller som tillæg til liraglutid (Victoza), der bruges til at behandle type 2-diabetes hos voksne. Levemir kan også bruges sammen med hurtigtvirkende insulinpræparater taget i forbindelse med måltider.

Levemir har en lang og stabil virkning på sænkningen af blodsukkeret med virkning 3 til 4 timer efter injektion. Levemir dækker det basale insulin-behov op til 24 timer efter injektion.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Levemir

Brug ikke Levemir

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for insulin detemir, eller et af de øvrige indholds stoffer i Levemir (se pkt. 6, Yderligere oplysninger).
- Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker) (se Andre følger af sukkersyge, under pkt. 4).
- I insulin infusionspumper.
- Hvis FlexPen tabs, beskadiges eller knuses.
- Hvis det ikke har været opbevaret korrekt, eller hvis det har været frosset (se pkt. 5 Opbevaring).
- Hvis insulinet ikke fremstår vandklart og farveløst.

Hvis noget af ovenstående gør sig gældende, må du ikke tage Levemir. Tal med din læge, sygeplejerske eller spørg på apoteket for at få råd.

Før du bruger Levemir

- Kontrollér på etiketten, at det er den rigtige insulintype.
- Brug altid en ny nål til hver injektion for at undgå urenheder.
- Nåle og Levemir FlexPen må ikke deles med andre.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Levemir

- Nogle omstændigheder og aktiviteter kan have indflydelse på dit insulinbehov. Disse inkluderer:
- Hvis du har problemer med nyrer eller lever, eller med binyrer, hypofyse eller skjoldbruskkirtel.
 - Hvis du dyrker mere motion, end du plejer, eller ønsker at ændre din kost, da dette kan påvirke dit blodsukkerniveau.
 - Hvis du bliver syg, skal du fortsætte med at tage insulin og kontakte din læge.
 - Hvis du har planer om at rejse til udlandet, da tidsforskellen mellem landene kan påvirke insulinbehovet og injektionstidspunktet. Kontakt din læge, hvis du planlægger sådan en rejse.
 - Hvis du har meget lavt albumin-niveau, skal du holde nøje kontrol med dit blodsukkerniveau. Diskuter dette med din læge.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen, sygeplejersken eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Nogle lægemidler påvirker blodsukkerets funktion i kroppen og kan derfor have betydning for din insulinosis. Nedenstående liste omfatter de mest almindelige lægemidler, som kan påvirke din insulinbehandling.

Dit blodsukkerniveau kan falde (hypoglykæmi), hvis du tager:

- Andre lægemidler til behandling af diabetes
- Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (til behandling af depression)
- Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk)
- ACE (angiotensin konverteringsenzym)- hæmmere (til behandling af visse hjertelidelser eller forhøjet blodtryk)
- Salicylater (smertestillende og febernedsættende)
- Anabolske steroider (såsom testosteron)
- Sulfonamider (til behandling af infektioner).

Dit blodsukkerniveau kan stige (hyperglykæmi), hvis du tager:

- Oral prævention (p-piller)
- Thiazider (til behandling af forhøjet blodtryk eller ved væskeophobning)
- Binyrebarkhormoner (såsom ’cortison’ til behandling af inflammation)
- Skjoldbruskkirtel-hormoner (til behandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen)
- Symptomimetika (såsom epinephrin [adrenalin] eller salbutamol og terbutalin til behandling af astma)
- Væksthormon (lægemiddel til vækststimule-ring af skelet og legeme med udtalt effekt på kroppens metaboliske processer)
- Danazol (lægemiddel, der virker på ægløsning).

Octreotid og lanreotid (til behandling af akromegali, en sjælden hormonel sygdom, der sædvanligvis forekommer hos midaldrende voksne og skyldes, at hypofysen danner for meget væksthormon) kan enten øge eller mindske dit blodsukkerniveau.

Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk) kan svække eller fuldstændigt undertrykke de første advarselssignaler, der hjælper dig med at opdage lavt blodsukker

Pioglitazon (tabletter, der bruges til behandling af type 2-diabetes)

Nogle patienter med årelang type 2-diabetes og hjertesygdom eller tidligere slagtilfælde, som er blevet behandlet med pioglitazon og insulin, oplevede hjertesvigt. Fortæl det til din læge hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt såsom usædvanlig kortåndethed, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer).

Fortæl det til din læge, sygeplejerske eller på apoteket, hvis du har taget noget af det medicin, der er nævnt her.

Brug af Levemir sammen med alkohol

- Hvis du drikker alkohol, kan dit behov for insulin ændres, og dit blodsukkerniveau kan enten stige eller falde. Omhyggelig kontrol anbefales.

Graviditet og amning

- Hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds. Din insulinosis skal eventuelt ændres under graviditet og efter fødsel. Nøje kontrol med din diabetes samt forebyggelse af hypoglykæmi (lavt blodsukker) er vigtig for dit barns helbred.
- Spørg din læge til råds hvis du ammer, da du muligvis skal have ændret dine insulin doser.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin, mens du er gravid eller ammer.

Trafik og arbejdssikkerhed

- Spørg din læge om du må køre bil eller arbejde med maskiner:
- Hvis du ofte har hypoglykæmi
- Hvis du har svært ved at vurdere, om du har hypoglykæmi.

Hvis dit blodsukker er lavt eller højt, kan din koncentrations- og reaktionsevne være påvirket, og dermed også din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær opmærksom på, at du kan bringe dig selv eller andre i fare.

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Levemir

Levemir indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dvs. Levemir er stort se natriumfrit.

3. Sådan skal du bruge Levemir

Dosis og hvornår du skal tage dit insulin

Brug altid dit insulin nøjagtigt efter lægens anvisning.

Levemir kan bruges i kombination med tabletter mod sukkersyge eller som tillæg til behandling med liraglutid (Victoza), som bruges til at behandle type 2-diabetes hos voksne. Levemir kan også bruges sammen med et hurtigtvirkende insulinpræparat i forbindelse med et måltid.

Hvis du skifter til en anden insulintype eller et andet insulinmærke, er det muligt, at dosis skal justeres af din læge. Du må ikke skifte insulin, medmindre din læge siger, at du skal.

Brug til børn

Levemir kan bruges til unge og børn, der er fyldt 2 år og derover.

Der er ingen erfaring med anvendelse af Levemir til børn under 2 år.

Anvendelse til særlige patientgrupper

Hvis du har nyre- eller leverskade, eller hvis du er over 65 år, skal du kontrollere dit blodsukker mere regelmæssigt og diskutere ændringer af din insulinosis med din læge.

Hvor ofte du skal injicere

Når Levemir anvendes sammen med tabletter mod sukkersyge eller som tillæg til liraglutid, skal Levemir administreres én gang om dagen.

Når Levemir anvendes som en del af en basalbolusinsulinbehandling, skal Levemir tages en eller to gange dagligt afhængigt af dit behov. Dosis af Levemir skal justeres individuelt. Injektionen kan gives på et hvilket som helst tidspunkt af dagen, men på samme tid hver dag. Hvis du har behov for insulin to gange dagligt for at optimere blodsukkerkontrollen, kan du tage aftendosis om aftenen eller ved sengetid.

Hvordan og hvor du skal injicere

Levemir er beregnet til injektion under huden (subkutant). Insulin må aldrig injiceres direkte ind i en vene (intravenøst) eller muskel (intramuskulært). For hver injektion skal du vælge et nyt injektions-sted inden for det bestemte hudområde, som du bruger. Dette kan nedsætte risikoen for at udvikle hudfortykkelse eller sprækker i huden (se pkt. 4, Bivirkninger). De bedste steder til injektion er: Foran på låret, foran på maveskindet eller overarmen. Du skal altid måle dit blodsukker regelmæssigt.

Sådan bruges Levemir FlexPen

Levemir FlexPen er en fyldt, farvekodet, engangspen indeholdende insulin detemir. Læs omhyggeligt Brugervejledningen, der er inkluderet i denne indlægsseddel. Du skal bruge pennen som beskrevet i Brugervejledningen. Du skal altid sikre dig, at du bruger den korrekte pen, før du injicerer dit insulin.

Hvis du har taget for meget insulin

Hvis du har taget for meget insulin, bliver dit blodsukker for lavt, dette kaldes hypoglykæmi. Se Andre følger af sukkersyge, under pkt. 4.

Hvis du har glemt at tage insulin

Hvis du glemmer at tage insulin, kan dit blodsukker blive for højt, dette kaldes hyperglykæmi. Se Andre følger af sukkersyge, under pkt. 4.

Hvis du holder op med at tage insulin

Stop ikke med at tage insulin uden først at tale med din læge, der kan fortælle dig, hvad der skal gøres. Dette kan føre til meget højt blodsukker (alvorlig hyperglykæmi) og ketoacidose. Se Andre følger af sukkersyge, under pkt. 4.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Levemir kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger

Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede. Lavt blodsukker (hypoglykæmi): Se detaljer nedenfor under Andre følger af sukkersyge.

Almindelige bivirkninger

Forekommer hos færre end 1 ud af 10 behandlede.

Reaktioner på injektionsstedet (smerter, rødme, udslæt, inflammation, blå mærker, hævelse og kløe): Disse forsvinder normalt inden for få uger ved fortsat insulinbehandling. Kontakt din læge, hvis symptomerne ikke forsvinder. Hvis du har en alvorlig og vedvarende reaktion, kan det være nødvendigt, at du stopper med Levemir og bruger et andet insulin i stedet.

Ikke almindelige bivirkninger

Forekommer hos færre end 1 ud af 100 behandlede.

- Symptomer på allergi: Nældefeber og udslæt kan forekomme. Kontakt straks lægen:
- Hvis nogle af ovennævnte tegn på allergi viser sig, eller
 - Hvis du pludselig føler dig syg, og du sveder, kaster op, får åndedrætsbesvær eller hurtig hjertebanken eller bliver svimmel.
 - Hvis du oplever nogle af disse, kontakt straks lægen.

Synsproblemer: Når du påbegynder insulinbehandling, kan du opleve synsforstyrrelse, men forstyrrelsen er normalt midlertidig.

Forandringer på injektionsstedet (lipodystrofi): Fedtvævet under huden på injektionsstedet kan skrumpе ind (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Hvis man injicerer et nyt sted hver gang, kan det hjælpe med til at nedsætte risikoen for at udvikle ændringer i huden. Hvis du bemær-ker, at huden sprækker eller bliver tyk på injektions-stedet, skal du oplyse det til din læge eller sygeplejerske. Sådanne reaktioner kan blive mere alvorlige, eller måske ændre optagelsen af dit insulin, hvis du injicerer på et sådant sted.

Hævede led: Når du påbegynder insulinbehandling, kan væskeophobning forårsage hævelse af ankler eller led. Dette forsvinder normalt hurtigt.

Diabetisk retinopati (en øjensygdom relateret til sukkersyge, som kan føre til tab af synet): Hvis du har diabetisk retinopati, og dine blodsukkerniveauer forbedres meget hurtigt, kan sygdommen forværres. Spørg din læge om dette.

Sjældne bivirkninger

Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede.

Smertefuld neuropati (smerter der skyldes beskadigede nerver): Hvis dit blodsukkerniveau forbedres meget hurtigt, kan du få nerverelaterede smerter. Dette kaldes akut smertefuld neuropati, og er som regel en forbigående tilstand.

Meget sjældne bivirkninger

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

Alvorlige allergiske reaktioner over for Levemir eller et af de øvrige indholdsstoffer (kaldet systemisk allergisk reaktion). Se også advarslerne under pkt. 2, Det skal du vide, før du begynder at bruge Levemir.

- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Andre følger af sukkersyge

► Lavt blodsukker (hypoglykæmi)

Lavt blodsukker kan forekomme, hvis du:

- Injicerer for meget insulin.
- Spiser for lidt eller springer et måltid over.
- Motionerer mere end normalt.
- Drikker alkohol (Se Brug af Levemir sammen med alkohol under pkt. 2).

Advarselssignalerne på lavt blodsukker: Advarselssignalerne kan komme pludseligt og kan omfatte: Koldsved, kold bleg hud, hovedpine, hurtig hjertebanken, kvalme, usædvanlig stor sultfornemmelse, midlertidige synsforstyrrelser, døsighed, unormal træthed og svaghed, nervøsitet eller rysten, indre uro, forvirring og koncentrationsbesvær.

Hvad du skal gøre, hvis du føler, at du får lavt blodsukker:

- Hvis du føler, at du får lavt blodsukker, skal du spise glucosetabletter eller et sukkerholdigt produkt (slik, kiks, frugtjuice). Hvis det er muligt, skal du måle dit blodsukker og hvile dig.
- Medbring for en sikkerheds skyld altid glucosetabletter, slik, kiks eller frugtjuice.

Når symptomerne på lavt blodsukker er forsvundet, eller når dit blodsukkerniveau er stabiliseret, kan du fortsætte med insulinbehandlingen.

- Fortæl relevante personer, at du har diabetes, og hvilke konsekvenser det kan have, herunder risikoen for at besvime (blive bevidstløs) på grund af lavt blodsukker. Fortæl dem, at hvis du

besvimer, skal du vendes om på siden, og der skal straks tilkaldes lægehjælp. Du må ikke få noget at spise eller drikke, da du kan risikere at blive kvalt.

Du kan genvinde bevidstheden hurtigere, hvis du får en injektion af hormonet glucagon af en person, der er instrueret i, hvordan det anvendes. Hvis du får glucagon, skal du også have glucose eller et sukkerholdigt produkt at spise, så snart du igen er ved bevidsthed. Hvis du ikke reagerer på glucagon-behandlingen, skal du behandles på hospitalet.

- Hvis langvarigt, alvorligt lavt blodsukker ikke behandles, kan det medføre hjerneskade (midlertidig eller varig) og i værste fald død.
- Hvis du får så lavt blodsukker, at du bliver bevidstløs, eller hvis du har haft gentagne tilfælde af lavt blodsukker, skal du tale med din læge. Tidspunktet for eller mængden af insulin, kost eller motion skal muligvis ændres.

Højt blodsukker (hyperglykæmi)

Højt blodsukker kan forekomme, hvis du:

- Ikke har injiceret tilstrækkeligt insulin.
- Glemmer at tage insulin eller stopper med at tage insulin.
- Gentagne gange tager mindre insulin, end du har brug for.
- Får en infektion og/eller feber.
- Spiser mere end du plejer.
- Dyrker mindre motion end du plejer.

Advarselssignalerne på højt blodsukker: Advarselssignalerne kommer gradvist. De omfatter: Hyppig vandladning, tørst, appetitløshed, kvalme eller opkastning, døsighed eller træthed, rødmen, tør hud, mundtørhed og en frugtagtig (acetonelugtende) ånde.

Hvad du skal gøre, hvis du føler, at du får højt blodsukker:

- Hvis du oplever nogle af ovennævnte signaler: Mål dit blodsukkerniveau, kontrollér om muligt din urin for ketonstoffer og søg straks lægehjælp.
- Disse symptomer kan betyde, at du har en meget alvorlig tilstand kaldet diabetisk ketoacidose (ophobning af syre i blodet, da kroppen nedbryder fedt i stedet for sukker). Denne tilstand kan ubehandlet resultere i diabetisk koma og i værste fald død.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Levemir efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen med FlexPen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Før ibrugtagning: Levemir FlexPen, som ikke er i brug, skal opbevares i køleskab (2°C til 8°C), ikke for tæt på køleelementerne. Må ikke fryses.

Efter ibrugtagning eller medbragt som reserve: Levemir FlexPen, som er taget i brug, eller som medbringes som reserve, må ikke opbevares i køleskab. Kan medbringes og opbevares ved stuetemperatur (under 30°C) i op til 6 uger. Opbevar FlexPen med penhætten påsat, når den ikke er i brug for at beskytte den mod lys. Levemir må ikke udsættes for overdreven varme og lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Levemir indeholder

- Aktivt stof: Insulin detemir. 1 ml indeholder 100 E insulin detemir. Hver fyldt pen indeholder 300 E insulin detemir i 3 ml injektionsvæske, opløsning. 1 enhed (E) insulin detemir svarer til 1 international enhed (IE) humaninsulin.
- Øvrige indholdsstoffer: Glycerol, phenol, metacresol, zinkacetat, dinatriumphosphatdihydrat, natriumchlorid, saltsyre, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser

Levemir er en klar, farveløs, vandig opløsning.

Pakningsstørrelser med 1 (med eller uden nåle), 5 (uden nåle) eller 10 (uden nåle) fyldte penne a 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danmark

Fremstiller

Fremstilleren kan identificeres ved batchnummeret, som er trykt på kartonens slip og på etiketten:

– Hvis andet og tredje skrifttegn er S6, P5, K7, R7, VG, FG eller ZF, så er Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark, fremstilleren.

– Hvis andet og tredje skrifttegn er H7 eller T6, så er Novo Nordisk Production SAS, 45 Avenue d’Orléans, F-28002 Chartres, Frankrig, fremstilleren.

Levemir® er et registreret varemærke, der tilhører Novo Nordisk A/S

Brugervejledning til hvordan FlexPen bruges findes på bagsiden.


Denne indlægsseddel blev senest godkendt i marts 2012

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside <http://www.ema.europa.eu>.

LEVEMIR opløsning til injektion i en fyldt pen. FlexPen. BRUGERVEJLEDNING.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager Levemir FlexPen i brug.

- Din FlexPen er en unik insulinpen med dosisindstilling.
- Du kan vælge en dosis på mellem 1 og 60 enheder i spring på én enhed.
 - FlexPen er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåle med en længde på op til 8 mm.
 - Medbring for en sikkerheds skyld altid et ekstra insulindispenseringssystem i tilfælde af, at din FlexPen mistes eller ødelægges.



Vedligeholdelse

- Din FlexPen er designet til at fungere præcist og sikkert. Den skal derfor håndteres forsigtigt. Hvis den tabes eller knuses, er der risiko for ødelæggelse og udsivning af insulin.
- Du kan rense din FlexPen udvendigt med en medicinsk serviet. Den må ikke lægges i blød, vaskes eller smøres, da det kan beskadige pennen.
- Genfyld ikke din FlexPen.

Klargøring af din Levemir FlexPen

Kontrollér på etiketten at din FlexPen indeholder den korrekte insulinatype.

A Træk penhætten af.



B Tag en ny nål og riv papirforseglingen af. Skru nålen lige og stramt på din FlexPen.



C Fjern den store ydre nålehætte og gem den til senere.



D Fjern den indre nålehætte og kassér den.



- Brug altid en ny nål til hver injektion for at undgå urenhed.
- Vær opmærksom på ikke at bøje eller ødelægge nålen før brug.
- For at undgå uventede stikuheld, må den indre nålehætte aldrig sættes på igen, når du først har fjernet den fra nålen.

Kontrol af insulingennemløb

Før hver injektion kan der samle sig små luftbobler i cylinderampullen under normal brug. For at undgå injektion af luft og sikre rigtig dosering:

E Indstil dosisvælgeren på 2 enheder.



F Hold din FlexPen så nålen vender opad og bank let på cylinderampullen med fingeren et par gange, så eventuelle luftbobler samles i toppen af cylinderampullen.



G Hold nålen opad og tryk trykknappen helt i bund, hvorved dosisvælgeren nulstilles. En dråbe insulin skal nu komme til syne på nålens spids. Hvis dette ikke sker, skift da nålen og gentag proceduren, dog højst 6 gange. Hvis der stadig ikke kommer en dråbe insulin til syne, er pennen defekt, og du skal derfor tage en ny i brug.



Indstilling af dosis

Kontrollér at dosisvælgeren står på 0.

H Indstil dosisvælgeren til det antal enheder du skal injicere.

Dosis kan korrigeres både op og ned ved at dreje dosisvælgeren frem eller tilbage, indtil den korrekte dosis står ud for markøren. Vær forsigtig med ikke at trykke på trykknappen, når du drejer dosisvælgeren, da der så vil sive insulin ud.

Du kan ikke indstille en dosis, som er højere end det antal enheder, der er tilbage i cylinderampullen.



- Brug ikke restdosisskalaen til at afmåle din insulindosis.

Injektion af insulin

Stik nålen ind under huden. Anvend den injektionsteknik din læge eller sygeplejerske har anbefalet.

I Injicér dosis ved at trykke på trykknappen indtil der står 0 ud for markøren. Pas på kun at trykke på trykknappen under injektionen.

Insulin injiceres ikke ved at dreje på dosisvælgeren.




J Hold trykknappen helt i bund og lad nålen forblive under huden i mindst 6 sekunder. Dette sikrer, at du får den fulde dosis. Træk nålen ud af huden og slip trykket på trykknappen.



K Før nålespidsen tilbage ind i den store ydre nålehætte uden at røre ved den. Når nålen er dækket, skubbes den store ydre nålehætte forsigtigt helt på, og nålen skrues derefter af.

Kassér den omhyggeligt og sæt penhætten på igen.



- Fjern altid nålen efter hver injektion og opbevar din FlexPen uden nålen påsat. Ellers kan væsken løbe ud, hvilket kan forårsage ukorrekt dosering.
- Omsorgspersoner skal håndtere brugte nåle meget forsigtigt for at undgå stikuheld.
- Kassér omhyggeligt den brugte FlexPen uden påsat nål.
- Nåle og Levemir FlexPen må ikke deles med andre.