

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Antistina Privin® 5 mg/ml + 0,25 mg/ml, øjendråber, opløsning

Antazolinsulfat / naphazolinnitrat

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Antistina Privin uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Antistina Privin.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3-4 dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Antistina Privin
3. Sådan skal du bruge Antistina Privin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Antistina Privin øjendråber indeholder et antihistamin (antazolin), som lindrer symptomerne ved overfølsomhed og naphazolin, som trækker de små blodårer sammen.

Du skal bruge Antistina Privin mod røde og kløende øjne pga. allergi.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Antistina Privin for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Antistina Privin

Brug ikke Antistina Privin, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for antazolinsulfat og naphazolinnitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer
- har grøn stær (glaukom med snæver kammervinkel)
- er i behandling med medicin mod depression (MAO-hæmmere).

Du må ikke bruge Antistina Privin til børn under 5 år.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Antistina Privin

Tal med lægen inden du bruger Antistina Privin, hvis du

- har tørre øjne.
- har forhøjet blodtryk.
- har forstyrrelser i hjerterytmen.
- er ældre og har alvorlige hjerte-karsygdomme.
- har diabetes (sukkersyge).
- har for højt stofskifte.
- svulst i binyren (fæokromocytom).

Du skal kontakte lægen, hvis

- dine symptomer fortsætter i mere end 3-4 dage
- dine symptomer bliver værre
- du får smerter i øjnene og sløret syn efter drypning.

Vær opmærksom på følgende

- Hvis du har betændelse i næseslimhinden (rhinitis sicca), er det vigtigt at lukke øjnene i ca. 1 minut, efter du har dryppet øjnene, for at forhindre øjendråberne i at løbe ned i næsen.
- Hvis du bruger Antistina Privin for længe eller i for store doser, kan du få forværring af symptomerne med meget røde øjne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du må ikke bruge Antistina Privin, hvis du tager medicin mod depression af typen MAO-hæmmere. Tal med lægen.

Tal med lægen, hvis du tager

- medicin mod sindslidelser (antipsykotika)
- medicin mod depresion (af typen tricycliske antidepressiva)
- beroligende medicin eller sovemedicin.

Vær opmærksom på

- Hvis du drikker alkohol, når du bruger Antistina Privin, kan det forstærke den sløvende virkning.
- Hvis du udover Antistina Privin bruger andre øjendråber, skal du vente mindst 5 minutter mellem drypningerne.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Antistina Privin. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Antistina Privin efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Antistina Privin kan give bivirkninger som døsighed, svimmelhed og sløret syn, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Antistina Privin

Antistina Privin er konserveret med benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene, samt misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du drypper øjnene, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

3. Sådan skal du bruge Antistina Privin

Hvis din læge har ordineret Antistina Privin til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 dråbe 3-4 gange daglig i højst 14 dage.

Børn:

Du må ikke bruge Antistina Privin til børn under 5 år.

Børn over 5 år: 1 dråbe 2-3 gange daglig.

Hvis behandlingen med Antistina Privin ikke hjælper i løbet af 3-4 dage, skal du kontakte din læge.

Brugsvejledning

Bøj hovedet bagover (fig. 1). Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger.

Hold øjendråbeflasken i den anden hånd med spidsen nedad – et let tryk på flasken får en dråbe til at falde ned i øjet (fig. 2).

Dryp 1 dråbe i hvert øje.

Flaskens spids må ikke røre noget, da indholdet så kan blive foruren.

Luk øjet i ca. ét minut for at forhindre øjendråben i at løbe ned i næsen gennem tårekanalen.



fig. 1



fig. 2

Hvis du har brugt for meget Antistina Privin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere øjendråber, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Antistina Privin

Brug aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at dryppe øjnene. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. Bivirkninger

Antistina Privin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Hovedpine, kvalme, synsnedsettelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
- Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

- Brændende/stikkende fornemmelse ved drypning og lokale allergiske reaktioner, som øget kløe og rødme.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Hovedpine, søvnighed, svimmelhed, døsighed, rysten.
- Svedtendens.
- Tiltagende rødme i øjet.
- Sløret syn, udvidelse af pupillen.

- Tørre øjne.
- Kronisk øjenbetændelse med røde øjne brændende fornemmelse og tåreflåd, evt. med hævede øjenlåg.
- Øget sekret i øjet.
- Ændring af farven i øjets regnbuehinde.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

- Opbevar Antistina Privin utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Antistina Privin ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Antistina Privin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Efter åbning af flasken må øjendråberne kun bruges i 1 måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Antistina Privin 5 mg/ml + 0,25 mg/ml, øjendråber indeholder:

- Aktive stoffer: Antazolinsulfat og naphazolinnitrat.
- Øvrige indholdsstoffer: Boraks, borsyre, benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel) og steril vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Findes i pakning med 10 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, 2100 København Ø.

e-mail: skriv.til@novartis.com

Revideret september 2008