

Information om Ultracortenol®

øjendråber, suspension 5 mg/ml og øjensalve 5 mg/g

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen.

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Ultracortenol til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Ultracortenol.
3. Sådan skal du bruge Ultracortenol.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Ultracortenol øjendråber og øjensalve indeholder prednisolon, som er et kunstigt fremstillet binyrebarkhormon. Sådanne stoffer kaldes kortikosteroider. De hæmmer betændelsestilstande, og dæmper symptomer som kløbe og irritation.

Ultracortenol anvendes derfor ved betændelsestilstande i øjnene, som ikke skyldes bakterier, virus eller svampe samt ved svære tilfælde af overfølsomhedsreaktioner (allergier).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Ultracortenol

Brug ikke Ultracortenol hvis:

- Du er overfølsom over for prednisolonacetat/pivalat eller et eller flere af de andre indholdsstoffer i Ultracortenol.
- Du har virus-, svampe- og/eller bakterieinfektioner i øjet, da behandlingen kan give anledning til forværring af infektionen.

Særlige forholdsregler

Vær forsigtig med at anvende Ultracortenol hvis

- Du er i behandling mod øjeninfektioner. Tal med din læge.
- Du er i langtidsbehandling med Ultracortenol. Trykket i øjet bør kontrolleres regelmæssigt, da der kan forekomme en trykstigning i øjet.
- Du har sukkersyge. Der kan være en tendens til øget tryk i øjet og/eller dannelse af grå stær. Tal med din læge.
- Du anvender kontaktlinser. Du bør ikke bruge kontaktlinser under behandling med Ultracortenol, da lægemidlet indeholder mikrokryaller, som kan sætte sig på bagsiden af kontaktlinsen og beskadige hornhinden.

Hvis du er i langtidsbehandling med Ultracortenol bør du ikke stoppe behandlingen pludseligt, nedtrapning bør ske gradvist.

Steroider nedsætter modstandskraften overfor infektioner. Tal derfor med din læge, hvis du oplever rødme, smerter og/eller fornemmelse af fremmedlegemer i øjet under behandling.

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Ultracortenol

Ultracortenol øjendråber er konserveret med benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun bruge Ultracortenol under graviditet efter lægens anvisning.

Amning

Erfaringerne med Ultracortenol er begrænsede. Du bør ikke bruge Ultracortenol, hvis du ammer. Spørg lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for håndkøbsmedicin, naturmedicin samt stærke vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Ultracortenol sammen med anden medicin, men tal med lægen først, hvis du er i behandling mod grøn stær (glaukom) eller med andre øjnlægemidler (atropin og øvrige anticholinerge lægemidler).

Hvis du udover Ultracortenol behandles med andre øjnlægemidler, bør der gå mindst 15 minutter mellem behandlingerne.

3. Sådan skal du bruge Ultracortenol

Dosering:

Voksne:

øjendråber: 1 dråbe 3-6 gange daglig. I svære tilfælde kan der dryppes hver time.

øjensalve: 3-5 mm salvestreng lægges i folden bag det nedre øjnlåg 2-3 gange daglig.

Det er hensigtsmæssigt at anvende øjendråber om dagen og øjensalve om natten.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Brugsvejledning

Bøj hovedet bagover (fig. 1). Træk det nederste øjnlåg nedad med en finger.

Hold øjendråbeflasken/tuben i den anden hånd med spidsen nedad - et tryk på flasken/tuben får en dråbe/salvestreng til at lægge sig i øjet (fig. 2). Lad ikke flaskens/tubens spids berøre noget, da indholdet så kan blive forurenset.

For øjendråber: Luk øjet i ca. ét minut for at forhindre øjendråben i at løbe ned i næsen gennem tårekanalen.

For øjensalven: Blink med øjet et par gange, og salven vil fordele sig på øjets overflade.



fig. 1




fig. 2

Har du brugt for meget Ultracortenol?

Der er ingen grund til bekymring, hvis du får dryppet mere end 1 dråbe i øjet.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ultracortenol øjensalve, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Har du glemt at bruge Ultracortenol?

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. Hvis du skulle glemme en dosis, så anvend øjendråberne/øjensalven med det samme og fortsæt derefter med den anbefalede doseringshyppighed.

4. Bivirkninger

Ultracortenol kan som al anden medicin give bivirkninger. Følgende bivirkninger er blevet indberettet.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Forhøjet tryk i øjet, som kan resultere i skade på synsnerven og synsfeltdefekter forårsaget af forhøjet tryk i øjet (glaukom), uklare i øjets linse. Langtidsbehandling kan medføre fortykning og/eller hul på hornhinden, specielt ved sygdomme som fører til tyndere hornhinde eller bindehinde. Langtidsbrug kan resultere i sekundære øjeninfektioner på grund af hæmning af immunforsvaret.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Sløret syn i forbindelse med anvendelse. Svie, brændende fornemmelse, rødme samt følelse af fremmedlegeme på øjet.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000): Nedsænkning af øjelåget (ptosis) og udvidelse af pupillen (mydriasis).

Der kan i sjældne tilfælde ses bivirkninger andre steder i kroppen end i øjnene ved lokalt brug af steroider.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "Bivirkninger" på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5. Opbevaring

- Opbevar Ultracortenol utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Ultracortenol ved over 25 °C.
- Anvend ikke Ultracortenol efter den udløbsdato, der er anført på flasken/tuben og kartonen.
- Efter åbning af flasken/tuben må øjendråberne/øjensalven kun bruges i 1 måned.

6. Yderligere information

Ultracortenol øjendråber, suspension indeholder:

- Det virksomme indholdsstof i Ultracortenol øjendråber er prednisolonacetat 5 mg/ml.
- De øvrige indholdsstoffer er: boraks, borsyre, dinatriumedetat, aluminiumhydroxidhydrat, makrogol 400, benzalkoniumchlorid og sterilt vand.

Ultracortenol øjensalve indeholder:

- Det virksomme indholdsstof i Ultracortenol øjensalve er prednisolonpivalat 5 mg/g.
- De øvrige indholdsstoffer er: cetostearylalkohol, vandfrit lanolin, hvid vaselin, paraffinolie og sterilt vand.

Markedsføring i Danmark:

Novartis Healthcare A/S

Lyngbyvej 172

2100 København Ø.

e-mail: skriv.til@novartis.com

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret april 2006