

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Elorgan® 400 mg, depottabletter

Pentoxifyllin

Læs denne indlægsseedel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægsedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Elorgan® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægsedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Elorgan®
3. Sådan skal du tage Elorgan®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Elorgan® får blodet til at strømme lettere gennem blodkarrene. Elorgan® gør blodet mere letflydende og nedsætter blodets tilbøjelighed til at klumpe sammen.

Du skal anvende Elorgan®, hvis du har alvorlige kredsløbsforstyrrelser i benene (claudicatio intermittens) med smerter efter kort tids gang.

Lægen kan have givet dig Elorgan® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ELORGAN®

Tag ikke Elorgan®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for pentoxifyllin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for andre stoffer (methylxanthiner), der ligner pentoxifyllin. (Kaffe, te, kakao, chokolade og cola indeholder methylxanthiner).
- hvis du har eller har haft en hjerneblødning.
- hvis du har eller har haft blødninger i øjets nethinde.

Vær ekstra forsigtig med at tage Elorgan®

Tal med lægen, hvis du:

- lider af alvorlige forstyrrelser af hjerterytmen.
- har haft blodprop i hjertet.
- har for lavt blodtryk.
- har nedsat funktion af nyrerne (dårlige nyrer).
- har alvorlig leversygdom.
- har øget tendens til blødning eller du får blodfortyndende medicin.
- Er i behandling for diabetes.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager:

- medicin mod forhøjet blodtryk eller anden medicin, der kan nedsætte blodtrykket.

- insulin eller tabletter mod diabetes. Din diabetes skal kontrolleres, og din diabetesmedicin skal måske ændres.
- medicin mod astma og KOL (theophyllin). Du kan få flere bivirkninger af din astmamedicin.
- blodfortyndende medicin af typen vitamin K-antagonister eller trombocyttaggregationshæmmere, da samtidig behandling med Elorgan® kan øge den blodfortyndende effekt.
- Antibiotika (ciprofloxacin). Koncentrationen af ciprofloxacin kan øges hos nogle af patienterne, hvilket kan bewirke øget frekvens og intensivering af bivirkninger ved samtidig administration.

Brug af Elorgan® sammen med mad og drikke

Du skal tage Elorgan® i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Elorgan® efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Elorgan® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Elorgan® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU ANVENDE ELORGAN®

Tag altid Elorgan® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal synke Elorgan® hele med rigelig væske (mindst et halvt glas vand) under eller lige efter et måltid. Du må ikke knuse eller tygge depottabletterne.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 tablet (400 mg) 3 gange daglig.

Børn

Børn må kun få Elorgan® efter lægens anvisning.

Nedsat nyre og leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Elorgan® depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere depottabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

De første symptomer på overdosering kan være kvalme, svimmelhed, hurtigt puls eller blodtryksfald. Desuden feber, rastløs uro, rødme, bevidsthedstab, svækkede reflekser, krampes og kaffegrums-lignende opkast.

Hvis du har glemt at tage Elorgan®

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Elorgan®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Elorgan® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

- Smarter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Alvorlige allergiske reaktioner med f.eks. hævelse af tunge, læber og ansigt, åndenød, shock. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112.
- Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløvhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Gulsot. Kontakt lægen.

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndværende data):

- Forstoppelse
- Øget spytkproduktion

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige – meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Rødmen (især ved høje doser).
- Trykken i maven, mæthedsformermelse/oppustethed, kvalme, opkastning, diarré (især ved høje doser).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Svimmelhed, hovedpine.
- Uregelmæssig puls, f.eks. hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Rastløs uro, søvnforstyrrelser.
- Kløe, rødme af huden, nældefeber.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. blodtryksfald.
- Blødninger i hud og slimhinder, i maven og tyndtarmen (især hvis du har øget blødningstendens).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Forhøjede blodværdier af visse leverenzymmer (transaminaser).

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndværende data):

- Almen sløvhed med tendens til betændelse (halsbetændelse) og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Hvis du får feber, skal du kan kontakt lægen, da det kan blive alvorligt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S., Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Tag ikke Elorgan® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Elorgan® 400 mg, depottabletter indeholder

Aktivt stof: Pentoxifyllin 400 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Hydroxyethylcellulose, povidon, talcum, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 8000, titandioxid (E171), erythrosin (E127).

Udseende og pakningsstørrelse

Elorgan® depottabletter er pink aflange tabletter med præg "ATA".

Elorgan® fås i pakninger med 60, 100 og 120 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakker og frigiver:

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N.

Elorgan® svarer til Trental®.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Elorgan® er et registreret varemærke, der tilhører sanofi-aventis Deutschland GmbH.