

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Viscotears 2 mg/g, øjengel

carbomer

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viscotears
3. Sådan skal du bruge Viscotears
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Viscotears er en kunstig tårevæske, der anvendes ved nedsat tåre- eller slimproduktion (tørhed i øjnene). Viscotears fugter øjet og danner en beskyttende hinde, som kan vare i op til 6 timer.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Viscotears for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE VISCOTEARS

Brug ikke Viscotears

- Hvis du er allergisk over for carbomer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Viscotears (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Viscotears.

Hvis du bruger kontaktlinser:

Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger Viscotears og vent mindst 30 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Viscotears indeholder et konserveringsmiddel (cetrimid), som kan misfarve bløde kontaktlinser.

Brug af anden medicin sammen med Viscotears

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. .

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Viscotears kan anvendes under graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Viscotears påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret, efter du har brugt Viscotears, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE VISCOTEARS

Brug altid Viscotears nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalet anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er

Voksne

1 dråbe 3-4 gange daglig eller efter behov.


Børn og unge

Du må kun bruge Viscotears til børn under 15 år efter aftale med lægen .

Brug kun Viscotears i øjet/øjnene.

Sådan bruger du Viscotears korrekt

1. Hent tuben med Viscotears.
2. Vask dine hænder, og sæt dig evt. foran et spejl.
3. Skru låget af tuben.
4. Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg nedad.
5. Hold tubespidsen tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.
6. Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med tubespidsen. Det kan forurene gelen i tuben.
7. Hold tuben lodret med spidsen pegende nedad – derved dannes der en lille dråbe på spidsen og dråben dryppes i øjet (mellem nedre øjenlåg og øjet).
8. Hvis du bruger Viscotears i begge øjne, gentages trinene 4-7 for det andet øje.
9. Skru til sidst låget på tuben umiddelbart efter brug.



Hvis dråben ikke rammer øjet, så prøv igen.

Hvis du bruger et andet øjenpræparat samtidig med Viscotears, skal der gå mindst 5 minutter mellem hver behandling. Viscotears skal altid dryppes i øjet som det sidste lægemiddel.

Hvis du har brugt for meget Viscotears

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Viscotears, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Viscotears.

Hvis du har glemt at bruge Viscotears

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Midlertidigt sløret syn, tilklistrede øjenlåg.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

Midlertidig irritation i øjet.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Overfølsomhed, smerter i øjet, hævelse af øjet, kløe i øjet, hævelse af øjenlåg, rødmen i øjet.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
- Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
- Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Kassér tuben senest 4 uger efter åbning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Viscotears 2 mg/g øjengel indeholder:

- Aktivt stof: carbomer. Hvert g gel indeholder: 2 mg carbomer.
- Øvrige indholdsstoffer: cetrimid (konserveringsmiddel), natriumhydroxid, sorbitol (E420) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser

Viscotears er klar og farveløs gel, der leveres i pakningstørrelserne 10 g og 3 x 10 g tuber. Ikke alle pakningstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alcon Danmark A/S
Rødovre Parkvej 25
2610 Rødovre
Danmark
E-mail: alcondanmark@alconlabs.com

Fremstiller

S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
2870 Puurs
Belgien

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2012.