

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Medicinsk oxygen Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, kryogen

Oxygen 100 %

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Medicinsk oxygen Yara Praxair til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen.

1. Medicinsk oxygen Yara Praxairs virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk oxygen Yara Praxair
3. Sådan skal du bruge Medicinsk oxygen Yara Praxair
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Medicinsk oxygen Yara Praxair
6. Yderligere oplysninger

1. MEDICINSK OXYGEN YARA PRAXAIRS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Medicinsk oxygen Yara Praxair indeholder oxygen til inhalation. Den er farveløst og uden lugt og smag og forhandles i beholdere med en flow-regulator. Beholderen indeholder rent flydende oxygen (nedkølet til ca. -180 °C) (kryogen gas).

Medicinsk oxygen Yara Praxair øger oxygenkoncentrationen i blodet (øget oxygenmætning). Medicinsk oxygen Yara Praxair sørger for transport af mere oxygen til alle vævene i kroppen.

Medicinsk oxygen Yara Praxair anvendes

- ved behandling eller forebyggelse af akut eller kronisk oxygenmangel.
- som drivgas ved inhalation af andre lægemidler (nebulisatorbehandling).
- som en del af friskgasflowet ved anæstesi, som smertedæmpende lægemiddel eller ved intensiv behandling.
- i trykkammer for at nedsætte risikoen for skader ved dykkersyge, gas- eller luftbobler i kresløbet og alvorlig kulilteforgiftning samt ved gangræn.
- ved behandling af et akut anfald af klyngehovedpine.

2. DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT BRUGE MEDICINSK OXYGEN YARA PRAXAIR

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Hvis lægen har ordineret Medicinsk oxygen Yara Praxair til dig personligt skal lægen altid informeres hvis:

- Du har en kronisk lungesygdom f. eks. astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom.

Brug af anden medicin

Hvis du får andre lægemidler med bivirkninger i lungerne f.eks. bleomycin (ved cancerbehandling), så kan oxygenbehandling forværre bivirkninger af disse lægemidler.

Graviditet og amning

Medicinsk oxygen Yara Praxair kan bruges under graviditet.

Medicinsk oxygen Yara Praxair kan bruges i amningsperioden.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE MEDICINSK OXYGEN YARA PRAXAIR

Hvis lægen har ordineret Medicinsk oxygen Yara Praxair til dig personligt, bør du konsultere lægen før du ændrer dosis.

Medicinsk oxygen Yara Praxair tilføres ved inhalation. Normal dosis for behandling eller forebyggelse af akut oxygenmangel hos voksne er 3-4 liter per minut når der anvendes næsekateter og 5-15 liter per minut med maske. Spørg din læge, om hvilken dosis som skal bruges til andre tilstande.

Medicinsk oxygen Yara Praxair bliver administreret via en et næsekateter eller en ansigtsmaske. Du trækker vejret selv – ”spontan vejtrækning” – eller får hjælp til dette af en respirator/ventilator.

Læs brugsanvisningen/patientinformationen grundigt for det udstyr du bruger til oxygenbehandlingen!

Hvis du har taget for meget Medicinsk oxygen Yara Praxair

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Medicinsk oxygen, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

I særlige tilfælde kan for meget medicinsk oxygen påvirke vejtrækningen og i specielle situationer føre til kuldioxidnarkose/bevidstløshed.

Anvendelse over en længere periode med overskud af oxygen kan forårsage smerte, tør hoste og åndedrætsbesvær. Hvis dette opstår skal du altid kontakte lægen eller sygehuset.

Sikkerhedsforanstaltninger

- Medicinsk oxygen Yara Praxair skal kun bruges til medicinske formål.
- Hvis etiketten på beholderen mangler eller er ulæselig, må oxygenbeholderen ikke bruges, og bør returneres til Yara Praxair AS.
- Beholdere med Medicinsk oxygen Yara Praxair skal kun bruges i godt ventilerede rum.
- Beholderen opbevares opretstående. Om beholderen vælter kan flydende Medicinsk oxygen sive ud og forårsage alvorlige frostsår. Ved normal brug forårsager ikke denne frosne, flydende oxygen nogle skader. Når det kommer ud af beholderen ændres det til oxygen i regelmæssig gas form.
- Beholderen må ikke udsættes for stærk varme.
- Rygning og åben ild er strengt forbudt i rum, hvor der udføres oxygenbehandling fordi dette vil kunne forårsage brand.
- Brug ikke brødrister, hårtørrer eller lignende elektriske apparater mens der anvendes Medicinsk oxygen Yara Praxair.
- Læg ikke oxygenmaske eller næsekateter direkte på tekstiler under oxygenbehandlingen da dette kan være brandfarligt. Hvis dette skulle indtræffe skal tekstilet rystes og luftes grundigt.
- Anvend aldrig olie eller fedt, selvom beholderventilen er stram. Dette kan føre til spontan antændelse med Medicinsk oxygen Yara Praxair under højt tryk.
- Luk beholderen hvis den ikke anvendes.
- Luk beholderen ved brand.
- Beholderen må bringes i sikkerhed ved risiko for brand.
- Vis forsigtighed. Beholderen bør ikke få stød eller tabes.
- Hold beholderene tørre og rene.

- Opbevares og transporteres opretstående med lukket ventil.
- Berøring med kryogen oxygen kan forårsage alvorlige forbrændinger eller frostsår. Når kryogene oxygensystemer håndteres må kryogene eller frosne systemer ikke komme i kontakt med hud eller tøj, som ikke beskytter.

4. BIVIRKNINGER

Medicinsk oxygen Yara Praxair kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre eller du får bivirkninger som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkningerne direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsen netsted <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

Bivirkninger ved behandling udenfor sygehus

Medicinsk oxygenbehandling med næsekateter kan føre til tørre slimhinder i næse og mund fordi gassen er tør.

Læs også afsnittet "*Hvis du har taget for meget Medicinsk oxygen Yara Praxair*".

Bivirkninger ved behandling på sygehus

Bivirkninger ses som oftest ved høje koncentrationer (mere end 70%) og efter brug over længere tid (mindst 6-12 timer).

- Sammenbrud af lungeblærene (alveolær kollaps)
- Smerte ved vejrtrækning, tør hoste, akut lungesvigt (akut respiratorisk distress syndrom, ADRS)

Følgende bivirkninger kan ske meget sjældent

- Blodmangel (anæmi), virkninger på lunger, hjertet, nyrerne og leveren

Bivirkninger i nyfødte

- Skader på nethinden (retina), som kan medføre nedsat syn, har blevet betragtet som en følge af terapi med oxygen ved koncentrationer over 40 %.

Bivirkninger ved behandling i trykkammer for hyperbar behandling (hyperbar oxygenbehandling)

- Sprængning af trommehinden, bihulesmerter, forbigående muskelsmerter og virkninger på centralnervesystemet fra kvalme, svimmelhed, angst, forvirring og muskelkontraktioner, til bevidstløshed og epileptiske anfald. Virkningerne på centralnervesystemet kan komme som følge af hyperbar behandling med mere end 2 atmosfærer i mere end et par timer. Ved højere tryk kan symptomerne opstå tidligere.

5. SÅDAN OPBEVARER DU MEDICINSK OXYGEN YARA PRAXAIR

Opbevares utilgængeligt for børn

Opbevares under 45°C.

Opbevar beholderen i et godt ventileret sted hvor den ikke udsættes for stærk varme

Hold beholderene tørre og rene

Må ikke tabes eller udsættes for stød

Bør ikke opbevares nær ved brændbare stoffer.

Brug ikke Medicinsk oxygen Yara Praxair efter den udløbsdato, der står på gasbeholderens etiket.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Medicinsk oxygen Yara Praxair indeholder:

- Aktivt stof: 100 % oxygen, kryogen (kemisk formel: O₂)
- Medicinsk oxygen indeholder ikke andre stoffer.

Medicinsk oxygen Yara Praxairs udseende og pakningsstørrelser

- Kryogene beholdere for hjemmeboende patienter, størrelser:
 - (Fyldt op af patienten eller sundhedspersonale): 0,3, 0,33, 0,38, 0,5, 0,6, 0,85, 1,2, 1,23
 - (Fyldt op af indehaveren af markedsføringstilladelsen): 10,7, 12, 15, 21, 21,6, 30, 31, 31,2, 36, 38,3, 40, 41, 46, 46,6, 60 og 196 liter.

Beholderne er koblet til et doseringsudstyr som tilpasser det flow, der er ordineret patienten.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

YARA Praxair Holding AS
P.O. Box 23, Haugenstua
N-0915 Oslo
Besøgsadresse:
Grenseveien 92, Helsefyr
N-0663 Oslo
Norge

Fremstillere

YARA Praxair AS
P.O. Box 23, Haugenstua
N-0915 Oslo
Norge

YARA Praxair A/S
Røde Banke 120
DK-7000 Fredericia
Danmark

Denne indlægsseddel blev senest revideret (01/2009)

Yderligere information om Medicinsk oxygen Yara Praxair på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.