

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Xeristar 30 mg hårde enterokapsler

Xeristar 60 mg hårde enterokapsler

Duloxetin (som hydrochlorid)

576179.01.02 08.2012

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere De vil vide.
- Lægen har ordineret XERISTAR til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

- Virkning og anvendelse
- Det skal De vide, før De begynder at tage Xeristar
- Sådan skal De tage Xeristar
- Bivirkninger
- Opbevaring
- Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Xeristar øger niveauerne af serotonin og noradrenalin i nervesystemet.

Xeristar bruges hos voksne til behandling af:

- depression
- angst (kronisk fornemmelse af angst og nervøsitet)
- diabetiske neuropatiske smerter (beskrives ofte som brændende, stikkende, sviende, jagende, skærende eller som et elektrisk stød. Der kan forekomme følelsesløshed i det angrebne område, eller påvirkninger såsom angrebning, varme, kulde eller tryk kan fremkalde smerte).

Deres læge kan vælge at fortsætte Deres behandling med Xeristar efter, at De har fået det bedre for at forebygge, at Deres depression eller angst skal vende tilbage.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE XERISTAR

Tag IKKE Xeristar hvis De

- er overfølsom (allergisk) over for duloxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se ”yderligere oplysninger”)
- har en leversygdom
- har svært nedsat nyrefunktion
- tager, eller inden for de sidste 14 dage har været i behandling med en MAO-hæmmer (monoaminoxidasehæmmer) (se ”Brug af anden medicin”)
- tager fluvoxamin, som normalt anvendes til behandling af depression, ciprofloxacin eller enoxacin, som bruges mod infektioner
- tager andre lægemidler indeholdende duloxetin (se ”Brug af anden medicin”)

Fortæl det til Deres læge, hvis De har forhøjet blodtryk eller en hjertesygdom. Hvis De skal tage Xeristar, vil Deres læge sige det til Dem.

Vær ekstra forsigtig med at tage Xeristar

I følgende situationer kan De muligvis ikke anvende

angstsygdom bliver værre, eller hvis de er bekymrede over ændringer i Deres adfærd.

Brug hos børn og unge under 18 år
Xeristar bør normalt ikke bruges til behandling af børn og unge under 18 år. De skal også være klar over, at patienter under 18 år har en forøget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (overvejende aggression, modsættende adfærd og vrede), når de tager denne type af medicin. På trods af dette kan Deres læge ordineret Xeristar til patienter under 18 år, hvis lægen skønner, at det er til patienten bedste. De bedes henvende Dem til Deres læge, hvis Deres læge har udskrevet Xeristar til en patient under 18 år, og De gerne vil diskutere dette. De skal fortælle Deres læge, hvis et af ovenstående symptomer opstår eller forværres hos en patient under 18 år, som er i behandling med Xeristar. Ydermere foreligger der endnu ikke data på langtidsikkerhed hos denne aldersgruppe hvad angår vækst, modning, kognitiv- og adfærdsudvikling ved brug af Xeristar.

- tager anden medicin til behandling af depression (se ”Brug af anden medicin”)
- tager et naturlægemiddel, som indeholder perikon (*Hypericum perforatum*)
- har en nyresygdom
- tidligere har haft krampeanfald.
- tidligere har haft mani
- lider af bipolar sygdom
- har øjenproblemer såsom visse typer af grøn stær (glaukom - forøget tryk i øjet)
- tidligere har lidt af blødningsforstyrrelser (tendens til blå mærker).
- har risiko for at få lavt indhold af natrium i blodet. (for eksempel hvis De tager vanddrivende medicin, især hvis De er ældre)
- er i samtidig behandling med medicin, som kan skade leveren
- samtidig tager anden medicin med duloxetin (se ”Brug af anden medicin”)

Xeristar kan give en følelse af uro eller manglende evne til at sidde eller stå stille. Hvis det sker for Dem, bør De fortælle Deres læge dette.

Selvmordstanker og forværring af Deres depression eller angstsygdom

Hvis De har en depression eller lider af en angstsygdom, kan De af og til få tanker om at skade Dem selv eller begå selvmord. Disse tanker kan forstærkes især i starten af behandlingen med antidepressiva, da det tager nogen tid før denne slags medicin virker, sædvanligvis omkring to uger, men af og til længere. De vil mere sandsynligt tænke på dette, hvis De:

- tidligere har haft tanker om at begå selvmord eller at gøre skade på Dem selv.
- er en yngre person. Erfaringer fra undersøgelser har vist, at der er en øget risiko for selvmordsadfærd hos unge under 25 år med en psykisk forstyrrelse, som bliver behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis De på noget tidspunkt får tanker om at skade Dem selv eller begå selvmord, skal De straks kontakte Deres læge eller skadestuen.

Det kan muligvis være til hjælp for Dem, hvis De fortæller en ven eller slægtning, at De har en depression eller en angstsygdom, og beder dem læse denne indlægsseddel. De kan bede dem om at fortælle det til Dem, hvis de synes Deres depression eller

angstsygdom bliver værre, eller hvis de er bekymrede over ændringer i Deres adfærd.

Brug hos børn og unge under 18 år
Xeristar bør normalt ikke bruges til behandling af børn og unge under 18 år. De skal også være klar over, at patienter under 18 år har en forøget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (overvejende aggression, modsættende adfærd og vrede), når de tager denne type af medicin. På trods af dette kan Deres læge ordineret Xeristar til patienter under 18 år, hvis lægen skønner, at det er til patienten bedste. De bedes henvende Dem til Deres læge, hvis Deres læge har udskrevet Xeristar til en patient under 18 år, og De gerne vil diskutere dette. De skal fortælle Deres læge, hvis et af ovenstående symptomer opstår eller forværres hos en patient under 18 år, som er i behandling med Xeristar. Ydermere foreligger der endnu ikke data på langtidsikkerhed hos denne aldersgruppe hvad angår vækst, modning, kognitiv- og adfærdsudvikling ved brug af Xeristar.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det aktive stof (duloxetin) i Xeristar bruges i andre lægemidler mod andre tilstande:

- diabetisk neuropatisk smerte, depression, angst og stressinkontinens

Brug af flere end et af disse lægemidler samtidig bør undgås. Spørg Deres læge, om De allerede tager andre lægemidler indeholdende duloxetin.

Deres læge bør afgøre om Xeristar kan tages sammen med anden medicin.
Start eller afbryd ikke behandlingen med medicin, det gælder også for medicin, som ikke er på recept samt naturlægemidler og kosttilskud, før De har talt med Deres læge.

De bør også fortælle Deres læge, hvis De tager noget af nedenstående medicin:

Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere):
De må ikke tage Xeristar sammen med en MAO- hæmmer eller inden for 14 dage efter afsluttet behandling med en MAO-hæmmer. Hvis De tager en MAO-hæmmer sammen med en række forskellige receptpligtige lægemidler, heriblandt Xeristar, kan det medføre alvorlige og endda livstruende bivirkninger. De skal vente mindst 14 dage efter, at De er holdt op med at tage en MAO-hæmmer, før De må begynde at tage Xeristar. De skal ligeledes vente mindst 5 dage, efter at De er holdt op med at tage Xeristar, før De må begynde at tage en MAO- hæmmer.

Medicin der kan virke sløvende:
Dette omfatter receptpligtig medicin ordineret af Deres læge inklusive benzodiazepiner, stærk smertestillende medicin, antipsykotika, phenobarbital og antihistaminer.

Medicin der øger niveauet af serotonin:
Triptaner, tramadol, tryptophan, SSRI-præparater (såsom paroxetin og fluoxetin), tricykliske præparater (såsom clomipramin, amitriptylin), pethidin, perikon og venlafaxin. Disse

typer medicin øger risikoen for bivirkninger. Oplever De uventede virkninger, mens De tager en af disse typer medicin sammen med Xeristar, skal De kontakte Deres læge.

Orale antikoagulantiaeller medicin, der påvirker blodpladerne:
Medicin, der fortynder blodet og modvirker dannelse af blodpropper. Hvis De tager Xeristar sammen med denne form for medicin, er risikoen for at De får blødninger muligvis større..

Brug af Xeristar sammen med mad og drikke
Xeristar kan tages med og uden mad. De bør udvise forsigtighed, hvis De drikker alkohol, samtidig med, at De er i behandling med Xeristar.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, inden De tager nogen form for medicin.

- Fortæl Deres læge, hvis De bliver gravid, eller hvis De prøver at blive gravid, mens De tager Xeristar. De må kun bruge Xeristar efter, at De har talt med Deres læge om de mulige fordele for Dem og de mulige risici for Deres ufødte barn.

De skal sikre Dem, at Deres jordemoder og/eller læge ved, at De tager Xeristar. Lignende præparater (SSRI'er) kan, når de tages under graviditeten, øge risikoen for en alvorlig lidelse kaldet persisterende pulmonal hypertension hos spædbørn (PPHN), hvilket gør barnet blåligt i huden og får det til at trække vejret hurtigere. Symptomerne opstår som regel indenfor de første 24 timer efter at barnet er født. De skal omgående kontakte Deres jordemoder og/eller læge, hvis dette sker for Deres barn.

Hvis De tager Xeristar i slutningen af graviditeten, kan Deres barn udvise visse symptomer når det bliver født. Som regel opstår de ved fødslen eller indenfor få dage efter fødslen. Symptomerne omfatter slappe muskler, skælven, spjætterri, spisebesvær, vejrtrækningsproblemer og krampeanfald. De skal kontakte Deres læge eller jordemoder med henblik på råd og vejledning, hvis Deres barn udviser nogle af disse symptomer efter fødslen, eller hvis De er bekymret for Deres barns helbred.

- Fortæl Deres læge, hvis De ammer. Det anbefales ikke at bruge Xeristar, mens De ammer. Spørg Deres læge eller apoteket til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xeristar kan gøre Dem søvnig og svimmel. De må ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller maskiner, før De ved, hvordan Xeristar påvirker Dem.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xeristar

Xeristar indeholder **saccharose**. Hvis Deres læge har fortalt Dem, at De ikke kan tåle visse sukkerarter, skal De kontakte Deres læge, inden De tager denne medicin.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE Xeristar

Tag altid Xeristar nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Xeristar er til oral brug. De skal synke kapslen hel og skylle den ned med et glas vand.

Xeristar begynder at virke hos de fleste patienter med depression eller angst inden for to uger efter behandlingens start.

Xeristars virkning indsætter hos de fleste patienter med diabetiske neuropatiske smerter inden for 1 uge efter behandlingens start.

Mod depression og diabetiske neuropatiske smerter
Den anbefalede dosis af Xeristar er 60 mg én gang daglig, hvorefter de fleste patienter vil få 60 mg en gang daglig, men Deres læge vil fastlægge den dosis, som passer til Dem. Dosis kan justeres op til 120 mg daglig afhængigt af Deres respons på Xeristar.

Mod generaliseret angst

Den sædvanlige startdosis af Xeristar er 30 mg en gang daglig, hvorefter de fleste patienter vil få 60 mg en gang daglig, men Deres læge vil fastlægge den dosis, som passer til Dem. Dosis kan justeres op til 120 mg daglig afhængigt af Deres respons på Xeristar.

Det kan være lettere at huske at tage Xeristar, hvis De tager det på samme tidspunkt hver dag. Tal med Deres læge om, hvor længe De skal blive ved med at tage Xeristar. Stop af behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis De har taget for meget Xeristar
Kontakt omgående lægen eller apoteket, hvis De har taget mere Xeristar, end lægen har ordineret. Symptomer på overdosering omfatter søvnighed, koma, serotonin syndrom (en sjælden bivirkning, som kan forårsage en unormal opstemthed, døsighed, klodsethed, rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, svedtendens og muskelstivhed), krampeanfald, opkastning og hurtigt puls.

Hvis De har glemt at tage Xeristar

Glemmer De at tage en dosis, skal De tage den, så snart De kommer i tanke om det. Hvis det allerede er blevet tid til Deres næste dosis, skal De springe den glemte dosis over og blot tage en enkelt dosis, som De plejer. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. De må ikke tage mere Xeristar pr. dag, end lægen har ordineret.

Hvis De holder op med at tage Xeristar

De må ikke holde op med at tage kapslerne uden at have konsulteret Deres læge, heller ikke selv om De har fået det bedre. Hvis lægen mener, at De ikke længere behøver at tage Xeristar, vil lægen bede Dem reducere dosis over mindst 2 uger, før De stopper behandlingen helt.

Nogle patienter, som pludselig holdt op med at tage Xeristar, oplevede symptomer såsom:

- svimmelhed, prikkende følelse som når noget sover, søvnforstyrrelse (livagtige drømme, mareridt, søvnløshed), træthed, søvnighed, rastløshed eller uro, angst, kvalme eller opkastning, rystelser, (tremor)hovedpine, irritation, diare, forøget tendens til at svede eller svimmelhed.

Disse symptomer er normalt ikke alvorlige og forsvinder inden for få dage, men hvis De oplever meget generende symptomer, skal De rådføre Dem med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Xeristar kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne er normalt milde til moderate og forsvinder ofte efter få uger.

- Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter)**
- hovedpine, søvninghed
 - kvalme, mundtørhed

- Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)**
- appetitmangel
 - søvnbesvær, opihidselse, mindre lyst til sex, angst, problemer med at opnå orgasme, mærkelige drømme
 - svimmelhed, følelse af ugidelighed, rysten, følelsesløshed, inklusive følelsesløshed eller prikken/ snurren i huden
 - sløret syn
 - tinnitus (opfattelse af lyd i øret, når der ingen lyd er)
 - hjertebanken
 - forhøjet blodtryk, rødmen
 - øget tendens til at gabe
 - forstoppelse, diarré, mavesmerter, opkastning, halsbrand eller fordøjelsesbesvær, luft i maven
 - øget tendens til at svede, (kløende) udslett
 - muskelsmerter, muskelkramper
 - smertefuld vandladning
 - problemer med at få erektion, ændret ejakulation
 - træthed
 - vægttab

- Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)**
- halsbetændelse, som forårsager hæst stemme
 - selvmordstanker, søvnbesvær, tænderskæren eller sammenbidte tænder, desorientering, manglende motivation
 - pludselig, ufrivillig spjætten eller sitren i musklerne, følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille, nervøsitet, koncentrationsbesvær, ændret smagsoplevelse, problemer med at styre sine bevægelser f.eks. koordinationsbesvær eller ufrivillige muskelbevægelser, *restless legs* syndrom (stærk uro og krybende fornemmelse i underbenene), dårlig søvnkvalitet
 - store pupiller, synsforstyrrelser
 - følelse af at være ”rundtosset” (vertigo), ørepine
 - hurtigt og/eller uregelmæssig puls
 - besvimelse, svimmelhed, uklarhed eller besvimelse efter at have rejst sig op
 - kolde fingre og/eller tæer
 - sammensnørret hals, næseblod
 - opkastning af blod eller sort tjærefarvet afføring (på grund af blod i afføringen), mave-tarmkatar, bøvsen
 - betændelse i leveren, som kan give mavesmerter og gulfarvning af huden eller i det hvide i øjnene

- natlig sveden, nældefeber, koldsved, øget følsomhed over for sollys, øget tendens til blå mærker
- muskelstivhed, muskelkramper
- besværet eller manglende evne til at lade vandet, besvær med at påbegynde vandladning, behov for vandladning i løbet af natten, behov for hyppigere vandladning end normalt, nedsat urinmængde
- unormal vaginalblødning, unormal menstruation herunder voldsom, smertefuld, uregelmæssig eller forlænget blødning, usædvanlig sparsom eller manglende menstruation
- brystsmertor, fald (oftest hos ældre), kuldefølelse , tørst, skælven, varmefølelse, unormal gangart
- vægtøgning
- Xeristar kan medføre bivirkninger, som du måske ikke er opmærksom på, f.eks. forhøjede leverenzymor eller forhøjede værdier af kalium, kreatinfosfokinase, sukker eller kolesterol i blodet

- Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)**
- alvorlige allergiske reaktioner, som forårsager åndedrætsbesvær eller svimmelhed og hævelse af tunge eller læber, allergiske reaktioner
 - nedsat aktivitet af skjoldbruskkirtlen, som kan forårsage træthed eller vægtøgning
 - dehydrering
 - (væskemangel) lavt indhold af natrium i blodet(oftest hos ældre mennesker;. Symptomerne omfatter bl.a. svimmelhed, svaghed, forvirring, søvnighed eller udpræget træthed eller kvalme og opkastning;. mere alvorlige symptomer er besvimelse, krampeanfald eller fald, syndrom med uhensigtsmæssig sekretion af antidiuretisk hormon (SIADH)
 - selvmordsrelateret adfærd, mani (overaktivitet, tanker, der løber løbsk og nedsat behov for søvn), hallucinationer, aggressivitet og vrede
 - ”Serotoninsyndrom” (en sjælden bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed, døsigheid, klodsethed, rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, tendens til at svede eller muskelstivhed), krampeanfald
 - øget tryk i øjet (grøn stær, glaukom)
 - betændelse i mundhulen, frisk rødt blod i afførringen, dårlig ånde
 - leversvigt, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)
 - Stevens-Johnsons syndrom, (en alvorlig lidelse med blærer i huden, munden, øjnene og på kønsorganerne), alvorlige allergiske reaktioner, som kan forårsage hævelse i ansigtet eller halsen (angioødem)
 - sammenbidte kæber
 - unormal urinlugt
 - symptomer på overgangsalder, unormal mælkeproduktion hos mænd og kvinder

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn

Brug ikke Xeristar efter den udløbsdato, der står på

pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

- Xeristar indeholder:**
- **Aktivt** stof: Duloxetin. Hver kapsel indeholder 30 eller 60 mg duloxetin (som duloxetinhydrochlorid).
 - **Øvrige** indholdsstoffer: *Kapselindhold:* Hypromellose, hypromelloseacetatsuccinat, saccharose, saccharosekugler, talcum, titandioxid (E171), triethylcitrat. *(se sidst i pkt. 2 for yderligere information om saccharose)* *Kapsellåg og -bund:* Gelatine, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), indigotin (E132), gul jernoxid (E172) (kun i 60 mg) og Edible Green Ink (30 mg) eller Edible White Ink (60 mg). *Edible green ink:* Syntetisk sort jernoxid (E172), syntetisk gul jernoxid (E172), propylenglycol og shellac. *Edible white ink:* Titandioxid (E171), propylenglycol, shellac og povidon.

Udseende og pakningsstørrelser
Xeristar er en hård enterokapsel. Hver Xeristar-kapsel indeholder pellets af det aktive stof med en belægning, som beskytter dem mod mavesyre.

Xeristar findes i 2 styrker: 30 mg og 60 mg. 30 mg kapslerne er blå og hvide med påskriften ”30 mg” og koden ”9543”. 60 mg kapslerne er blå og grønne med påskriften ”60 mg” og koden ”9542”.

Xeristar 30 mg findes i blisterpakninger med 7 og 28 kapsler. Xeristar 60 mg findes i blisterpakning med 28, 56, 84, 98, 100 og 500 kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen: Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Holland. *Fremstiller:* Lilly S.A., Avda. De la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Paralleldistributør og ompakker: New Neopharm BV, Wismarweg 22a, NL-9723 HB Groningen

Xeristar® er et registreret varemærke, som tilhører Eli Lilly and Company.

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Xeristar, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant.

België/Belgique/Belgien
Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

България
ТП ”Ели Лили Недерланд” Б.В. – България
тел. + 359 2 491 41 40

Česká republika
Eli Lilly ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Danmark
Eli Lilly Danmark A/S
Tlf: +45 45 26 60 00

Deutschland
Lilly Deutschland GmbH
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Eesti
Eli Lilly Hodings Limited Eesti filiaal
Tel: +372 6 817 280

Ελλάδα
ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ-ΑΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: +30 210 629 4600

España
Laboratorios Dr. Esteve S.A..
Tel: + 34 93 446 60 00

France
Lilly France S.A.S
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Ireland
Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Ísland
Icepharma hf.
Sími + 354 540 8000

Italia
Quintiles Commercial Italia srl
Tel: + 39 02 957941

Κύπρος
Phadisco Ltd
Τηλ: +357 22 715000

Latvija
Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 67364000

Lietuva
Eli Lilly Holdings Limited atstovybė
Tel. +370 (5) 2649600

Luxembourg/Luxemburg
Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Magyarország
Lilly Hungária Kft.
Tel: + 36 1 328 5100

Malta
Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 356 25600 500

Nederland
Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Norge
Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00

Österreich
Eli Lilly Ges.m.b.H.
Tel: + 43-(0) 1 711 780

Polska
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 (0) 22 440 33 00

Portugal
Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: + 351-21-4126600

România
Eli Lilly România S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000

Slovenija
Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: +386 (0)1 580 00 10

Slovenská republika
Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

Suomi/Finland
Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Sverige
Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800

United Kingdom
Eli Lilly and Company Limited
Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denne indlægseddell blev senest godkendt marts 2012

De kan finde yderligere information om XERISTAR på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.