

*Teksten er angivet på emballagen*

**INDLÆGSSEDDEL**  
**Tylan Vet. pulver til opløsning i drikkevand, til svin og**  
**fjerkræ**

Den nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

**1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF  
MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF  
VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR  
BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA**

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Elanco GmbH  
Heinz-Lohmann-Str. 4  
27472 Cuxhaven  
Tyskland

Lokal repræsentant:

Elanco Denmark ApS  
Lautrupvang 12, 1. th  
2750 Ballerup

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Elanco France S.A.S.  
26 Rue de la Chapelle  
68330 Huningue  
Frankrig

**2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN**

Tylan Vet.

**3. ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER**

1 g indeholder 1 g tylosintartrat.

**4. INDIKATIONER**

Infektioner forårsaget af tylosinfølsomme bakterier.

Se afsnit 12 vedrørende svinedysenteri.

**5. KONTRAINDIKATIONER**

Tylan Vet. pulver til opløsning i drikkevand bør ikke anvendes i besætninger, der leverer æg til konsum.

**6. BIVIRKNINGER**

Hos svin er observeret diarré, kløe, rødmen af huden, hævelse i endetarmen og prolaps.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

## 7. DYREARTER

Til svin og fjerkræ.

## 8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVÆJ

Til opløsning i drikkevand.

Kyllinger og kalkuner: Gives i drikkevandet i en koncentration på 0,5 g/l.

Grise: 5-10 mg/kg legemsvægt. Gives i drikkevandet i en koncentration på 0,5-1 g/8l.

Anvend ikke den færdigblandede opløsning i mere end 3 dage.

Behandlingsvarigheden må ikke være over 3 uger.

Vand, der indeholder tylosintartrat, må ikke efterlades eller bortskaffes, således at dyr, som ikke er i behandling eller vilde dyr har adgang hertil. Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

## 9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Pulver til opløsning i drikkevand.

## 10. TILBAGEHOLDELSESTID

Slagtning: Svin: 1 døgn.

Fjerkræ: 2 døgn.

Æg: 30 dage.

## 11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter Anv. før.

## 12. SÆRLIGE ADVARSLER

Drægtighed og diegivning: Kan anvendes.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug: Skal omgås med forsigtighed pga. risiko for allergi.

Særlige forsigtighedsregler for dyret:

Der er påvist høj andel af *in vitro*-resistens i europæiske stammer af *Brachyspira hyodysenteriae*, hvilket er tegn på, at produktet ikke vil være tilstrækkelig effektivt mod svinedysenteri.

Særlige forsigtighedsregler for den person, der administrerer lægemidlet: I tilfælde af kontakt med huden, vask grundigt med sæbe og vand. Hovedpine, astma, hoste, kløe i/omkring øjne, mavepine og irriterede luftveje kan ses efter kontakt med produktet.

## 13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OMNØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

## 14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

September 2020