

Proctosedyl® Rektalsalve

Hydrocortison 5 mg/g / cinchocainhydrochlorid 5 mg/g /
framycetinsulfat 10 mg/g / aesculin 10 mg/g

L90171A-02

Proctosedyl® er et registreret vare-mærke, der tilhører Aventis Pharma S.A.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Proctosedyl til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Proctosedyl
3. Sådan skal du bruge Proctosedyl
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Proctosedyl er et middel til lokal anvendelse i eller ved endetarmen. Proctosedyl indeholder flere virksomme stoffer med bl.a. kløestillende, smertestillende og bakteriehæmmende virkning. Proctosedyl anvendes til behandling af hæmorroider, kløe i og omkring endetarmsåbningen samt ved sår og rifter i endetarmsslimhinden.

Lægen kan have givet dig Proctosedyl for noget andet.
Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE OM PROCTOSEDYL

Brug ikke Proctosedyl

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for hydrocortison, cinchocainhydrochlorid, framycetinsulfat, aesculin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner over for specielt neomycin (aminoglykosider).
- Hvis du har en lokal infektion forårsaget af svampe, virus eller bakterier.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Proctosedyl

- Hvis du er allergisk over for framycetin, vil du også være allergisk over for alle andre stoffer i denne gruppe (aminoglykosider). Spørg lægen til råds.
- Ved længere tids brug af Proctosedyl på beskadiget væv kan det virksomme indholdsstof Framycetin blive optaget i kroppen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun bruge Proctosedyl efter aftale med lægen.

Amning:

- Proctosedyl går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

- Proctosedyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Proctosedyl
Proctosedyl rektalsalve indeholder lanolin, som kan give lokal hududslæt.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE PROCTOSEDYL

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Påføres 2-3 gange dagligt samt efter afføring.

Bør kun anvendes i kortere periode eller med mellemrum for at minimere risikoen for lokale bivirkninger.
Varighed af behandlingen bør ikke overstige 2 uger.

Børn: Proctosedyl bør ikke anvendes til børn under 15 år.

Brugsanvisning

Før du begynder, bør du vaske dine hænder grundigt.

Åbning af tuben:

Låget skrues af tuben.

Låget vendes om og trykkes på igen, så foliemembranen brydes.

Låget løftes af og tuben er åbnet.

Proctosedyl rektalsalve påsmøres i små mængder enten med en finger eller anvendes i endetarmen ved at skruer rektalspidsen på tuben. Rektalspidsen indføres i sin fulde længde gennem endetarmsåbningen og herefter klemmes der let på tubens nederste del, mens rektalspidsen trækkes ud igen. Efter brug rengøres rektalspidsen og hænderne vaskes grundigt.

Hvis du har brugt for meget Proctosedyl rektalsalve

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Proctosedyl rektalsalve, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering: Føleforstyrrelser ved endetarmsåbningen, svimmelhed, tinnitus, uklarhed, synsforstyrrelser, excitation i form af rystelser, forvirring, krampes, koma, nedsat

vejrtrækning, lavt blodtryk, langsom puls, hjertestop.

Hvis du har glemt at bruge Proctosedyl

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Proctosedyl kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter).

- Tynd endetarmsslimhinde hvor en brændende fornemmelse forekommer (ved langtidsbehandling mere end 4 uger).

Ikke almindelige bivirkninger:

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter).

- Kontakteksem, tynd hud, allergiske reaktioner.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Proctosedyl ved temperaturer over 25 °C.
- Brug ikke Proctosedyl efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Aktive stoffer:

Hydrocortison 5 mg/g,
Cinchocainhydrochlorid 5 mg/g,
Framycetinsulfat 10 mg/g og
Aesculin 10 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer:

Hvid vaselin, paraffinolie, lanolin, vandfrit.

Pakningsstørrelser

Proctosedyl fås i en pakningsstørrelse á 30 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af:

Abacus Medicine A/S
Vesterbrogade 149
DK-1620 København V.
Tel: +45 70 22 02 12
e-mail:
kundeservice@abacusmedicine.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08.2012.