

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Magenterol pulver til oral opløsning

macrogol 3350

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magenterol
3. Sådan skal du tage Magenterol
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Magenterol er et afføringsmiddel (laksativ) til behandling af langvarig forstoppelse. Magenterol anbefales ikke til børn under 12 år.

Macrogol 3350 blødgør afføringen og gør det lettere at tømme tarmen, så forstoppelsen lindres. Saltindholdet er med til at opretholde kroppens normale niveau af natrium, kalium og vand, mens du behandles for forstoppelsen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magenterol

Tag ikke Magenterol

- hvis du er allergisk over for macrogol 3350, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat, kaliumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Magenterol (angivet i pkt. 6)
- hvis du har hul på tarmvæggen
- hvis tarmen er blokeret (tarmobstruktion, tarmslyng)
- hvis du har en alvorlig betændelsestilstand i tarmen såsom colitis ulcerosa, Crohns sygdom eller toksisk megacolon.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis et af disse punkter passer på dig, så du kan få nærmere rådgivning.

Brug af anden medicin sammen med Magenterol

Visse former for medicin, f.eks. midler mod epilepsi, kan miste noget af deres virkning, hvis de bruges sammen med Magenterol.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug af Magenterol sammen med mad og drikke

Magenterol kan tages når som helst enten alene eller sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Magenterol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Magenterol indeholder kalium, natrium, sorbitol og svovldioxid

Et brev Magenterol indeholder 0,63 mmol (25 mg) kalium. Hvis du tager mere end ét brev dagligt, og du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Et brev Magenterol indeholder 8,1 mmol (187 mg) natrium. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Lemon-lime aromastoffet i Magenterol indeholder sorbitol (E420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Magenterol

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Voksne, børn (12 år og derover) og ældre:

Den anbefalede dosis er 1 brev 1-3 gange dagligt mod forstoppelse.

Tilberedning

Åbn brevet, og hæld indholdet i et glas. Tilsæt ca. 125 ml vand. Rør rundt, indtil pulveret er opløst. Drik opløsningen.

Behandlingens varighed

Du må normalt tage medicinen mod forstoppelse i højst 2 uger.

Du kan være nødt til, på lægens anbefaling, at fortsætte med Magenterol ud over de 2 uger mod vedvarende forstoppelse, eller hvis du har en sygdom, der giver forstoppelse (f.eks. Parkinsons sygdom eller multipel sklerose), eller hvis du løbende tager anden medicin, der kan give forstoppelse. I så fald kan lægen råde dig til at nedsætte dosis til 1 brev, som tages 1-2 gange dagligt.

Hvis du har taget for meget Magenterol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Magenterol, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

For meget af medicinen kan give alvorlig mavepine og udspiling af maven, opkastning (kvalme) eller diarré. Kontakt din læge eller apotekspersonalet, hvis dette sker for dig.

Hvis du har glemt at tage Magenterol

Hvis du har glemt en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, og dernæst fortsætte, som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Magenterol

For at få det bedste udbytte af Magenterol skal du altid tage hele behandlingen som anvist i denne indlægsseddel. Derved sikrer du, at forstoppelsen er helt overstået. Ellers vil du måske fortsat få de symptomer, der plagede dig.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 14 dage.

Spørg din læge eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hold op med at tage Magenterol, hvis du får en af følgende bivirkninger, og kontakt straks lægen eller skadestuen:

- tegn på allergi i form af udslæt, kløe, rødmen af huden, åndenød eller åndedrætsbesvær eller hævelse af ansigt, læber, tunge og hals.
- tegn på forandringer i væskebalancen eller elektrolytniveauet, hvilket viser sig ved hævelser (især i anklerne), svækkelse og tiltagende træthed eller øget tørst og hovedpine.

Følgende bivirkninger kan også forekomme:

- elektrolytforstyrrelser, især høje eller lave niveauer af kalium i blodet
- hovedpine
- hævelse af hænder, fødder og ankler
- mavesmerter
- diarré
- mild diarré (når du begynder at tage Magenterol – det holder normalt op, hvis du tager færre breve om dagen)
- kvalme
- opkastning
- fordøjelsesbesvær
- udspilet mave (oppustethed)
- maverumlen
- luft i tarmene
- ømhed i endetarmsåbningen (anus).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke Magenterol efter den udløbsdato, der står på æsken og brevet. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Tag ikke et brev Magenterol, hvis du opdager, at det er beskadiget.

Efter tilberedning kan opløsningen med Magenterol tildækkes og opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Brug opløsningen i løbet af 24 timer. Ikke anvendt opløsning skal bortskaffes efter 24 timer.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Magenterol indeholder

Aktive indholdsstoffer:

Hvert brev indeholder:

Macrogol 3350	13,125 g
Natriumchlorid	0,3507 g
Natriumhydrogencarbonat	0,1785 g
Kaliumchlorid	0,0466 g

Øvrige indholdsstoffer: vandfri kolloid silica, saccharinnatrium, appelsinaroma (som indeholder: aromastoffer og ekstrakter, naturlige aromastoffer, maltodextrin, akaciegummi, α -tocopherol) samt citron- og limearoma (som indeholder naturlig citronolie, naturlig pulver citronaroma, pulver limearoma, maltodextrin, mannitol, gluconolacton, sorbitol (E420), akaciegummi, vandfri kolloid silica).

Udseende og pakningsstørrelser

Magenterol er et hvidt pulver.

Et brev indeholder 13,8 g pulver, som er pakket i æsker med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 breve. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva Denmark A/S
Parallevej 10-12
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.nr. +45 44 98 55 11
E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren
Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEA's medlemslande under følgende navne:

Belgien:	Laxatrans Balance
Danmark:	Magenterol, pulver til oral opløsning
Finland:	Magenterol jauhe oraaliliuosta varten
Luxembourg:	Macrogol-ratiopharm Balance Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Polen:	Macroratio
Storbritannien:	Compound macrogol powder for oral solution
Sverige:	Magenterol pulver till oral lösning, dospåse
Tyskland:	Macrogol-ratiopharm Balance Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Østrig:	Osmolax Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2014.