

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dixarit® 25 mikrogram overtrukne tabletter

Clonidinhydrochlorid

09-2019
P568839-4

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dixarit
3. Sådan skal du tage Dixarit
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dixarit virker ved at påvirke blodtrykket og udvide blodkarrene i kroppen.

- Du kan tage Dixarit til forebyggelse af migræne. Dixarit kan ikke anvendes til akutte migræneanfald.
- Du kan tage Dixarit i mod hedeture i den menopausale fase, når du ikke tåler behandling med østrogen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dixarit

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Dixarit:

- hvis du er allergisk over for clonidinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dixarit (angivet i afsnit 6).
- hvis du har langsom puls som følge af syg sinus-knude eller har meget langsom puls med tendens til besvimelse (AV-blok).
- hvis du har arvelig galactoseintolerans, en særlig form for hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactoseintolerans.
- hvis du har arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption eller sucrase-isomaltasemangel.
- hvis du har en svulst i binyremarven (fæokromocytom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dixarit, hvis du har:

- hvis du har langsom puls som følge af hjerterytmeforstyrrelse (bradyarytmi) eller som følge af syg sinus-knude.
- hvis du har forstyrrelser i blodomløbet i kroppen eller hjernen.
- hvis du har en depression.
- hvis du har føleforstyrrelser og lammelser fortrinsvis i arme og ben, hvor vejtrækningen også kan rammes (polyneuropati).
- hvis du lider af forstoppelse (obstipation).
- hvis du har nedsat nyrefunktion (Dixarit udskilles fra kroppen igennem nyrene).
- hvis du har nedsat hjertefunktion eller alvorlig hjertesygdom. Du skal i de tilfælde overvåges omhyggeligt af din læge.
- hvis du bruger kontaktlinser. Dixarit kan nedsætte tåredannelsen.
- hvis du får medicin mod ADHD eller mod narkolepsi (sygdom, hvor man er unaturlig træt og pludselig falder i søvn), indeholdende methylphenidat. Du bør ikke anvende Dixarit samtidig, da der er set alvorlige bivirkninger som dødsfald.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Dixarit. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Så længe du får Dixarit, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.

Du skal ved nedsat nyrefunktion, have dit blodtryk kontrolleret jævnlige.

Børn og unge

Børn og unge bør ikke behandles med Dixarit.

Brug af anden medicin sammen med Dixarit

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- mod forhøjet blodtryk (betablokkere, calcium antagonist, ACE-hæmmere, diuretika).
- mod hjerterytmeforstyrrelser (digitalisglykosider).
- mod impotens (phentolamin eller andre stoffer indeholdende alfa2-receptor blokerende egenskaber).
- mod depression (tricykliske antidepressiva, neuroleptika med alfareceptor blokerende effekt).
- beroligende medicin.
- sovemedicin.
- mod sindslidelser.
- mod psoriasis, alvorlig nyresygdom eller leddegigt (ciclosporin).
- til udvidelse af blodkarrene (tolazolin).

Brug af Dixarit sammen med mad, drikke og alkohol

- Du må ikke drikke alkohol under behandlingen med Dixarit.
- Du skal tage Dixarit overtrukne tabletter med et glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

- Hvis du er gravid, må du kun tage Dixarit efter aftale med lægen. Clonidin passerer moderkagen og kan sænke pulsen på fosteret.

Amning

- Hvis du ammer, må du ikke tage Dixarit, da det går over i mælken. Tal med lægen.
- Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Dixarit er nødvendig. Tal med lægen.

Frugtbarhed

- Der foreligger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Dixarit kan give bivirkninger (svimmelhed, døsighed og/eller synsforstyrrelser) der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Dixarit indeholder lactose og saccharose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Dixarit

Tag altid Dixarit nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du skal stoppe med behandling, skal dosis nedsættes gradvis over 2-4 dage. Tal med din læge.

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er Voksne

1 tablet 2 gange dagligt (en morgen og en aften). Ved utilstrækkelig virkning efter 2 ugers behandling kan dosis øges gradvist op til 3 tabletter 2 gange daglig. Fuld virkning kan forventes efter 2 – 4 ugers behandling.

Brug til børn og unge
Dixarit bør ikke anvendes af børn og unge.

Nedsat nyrefunktion:
Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Dixarit
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dixarit, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer:
Indsnævring af pupillerne, døsighed, lavt blodtryk, højt blodtryk, langsom eller meget langsom puls, lav legemstemperatur, søvnliggende bevidsthedssvækkelse herunder koma, svækket vejrtrækning herunder åndenød, astma-lignende anfald, diaré.

Hvis du har glemt at tage Dixarit
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Dixarit
Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Du bør nedtrappe Dixarit over en periode på 2 – 4 dage, hvor du gradvist indtager mindre og mindre Dixarit. Pludselig ophør efter en længerevarende behandling med høje doser Dixarit kan medføre rastløshed, hjertebanken, hurtig blodtrykstigning, angst, nervøsitet, rysten, hovedpine eller kvalme, motorisk uro.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvortlige bivirkninger
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Hvide, ”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom). Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue (AV-blok). Ring evt. 112.

Ikke alvortlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Svimmelhed.
- Sløvhed.
- Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Dixarit i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
- Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk (ortostatisk hypotension).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hovedpine.
- Smerter i spytkirtlen.
- Forstoppelse, kvalme, opkastning.
- Træthed.
- Impotens (erektil dysfunktion).
- Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Søvnforstyrrelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue (sinus-bradykardi). Ring evt. 112.
- Føleforstyrrelser i arme og ben.
- Hududslæt, nældefeber, kløe.
- Utilpashed.
- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Mæredt og ændret forståelse af sanseindtryk (perceptive forstyrrelser).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (hyperglykæmi). Tal med lægen.
- Reduktion af tårevæskeproduktionen. Forsigtighed tilrådes ved brug af kontaktlinser.
- Tørhed i næseslimhinden.
- Mavekrampe, smerter, kvalme, opkastninger, blussen, færre afføringer end normalt vekslende med løse afføringer pga. pseudoobstruktion af tarmen.
- Hårtab.
- Udvikling af bryster hos mænd (gynækomasti).

Hyppigheden er ikke kendt:

- Langsom uregelmæssig hjertebanken (bradyarythmi).
- Nedsat evne til at se skarpt (akkomodationsforstyrrelser).
- Forvirring.
- Nedsat sexlyst.

Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Dixarit utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25°C.
Opbevares i blister i yderkartonen.

Tag ikke Dixarit efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dixarit indeholder:

- Aktivt stof: 25 mikrogram clonidinhydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphat, lactose, majsstivelse, silica kolloid, povidon, stivelse, magnesiumsterat, saccharose, talcum, akaciegummi, carnaubavoks, macrogol 6000, hvid bivoks, indigotin (E132) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser
Dixarit tabletter er runde, bikonvekse, blå og sukker-overtrukne.

Dixarit fås i en pakningsstørrelse á 112 overtrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V

Dixarit® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.

Denne indlægsseddel blev sidst ændret september 2019.