

Doxycyclin EuroPharma 100 mg tabletter

doxycyclin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doxycyclin EuroPharma
3. Sådan skal du tage Doxycyclin EuroPharma
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Doxycyclin EuroPharma er et antibiotikum af tetracyclingruppen.

Doxycyclin EuroPharma anvendes til behandling af:

- Infektioner forårsaget af bakterier, som er følsomme over for tetracycliner.
- Inhalationsinfektioner forårsaget af miltbrandbakterier.
- Borreliose, som er en infektionssygdom, hvor smitten overføres til mennesker via bid fra menneskelus eller flåter. Borreliose kan forekomme i flere varianter.

Lægen kan have givet dig Doxycyclin EuroPharma for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DOXYCYCLIN EUROPHARMA

Tag ikke Doxycyclin EuroPharma hvis

- du er overfølsom over for doxycyclin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du er allergisk overfor andre antibiotika, der indeholder tetracycliner.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Doxycyclin EuroPharma:

- Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat eller unormal leverfunktion eller ved indtagelse af andre lægemidler som påvirker leverfunktionen.
- Hvis du har nedsat nyrefunktion.
- Hvis du lider af en muskelsygdom (myasthenia gravis).
- Hvis du lider af en sygdom i immunsystemet (systemisk lupus erythematosus, SLE).
- Hvis du lider af porfyri (en arvelig sygdom, som medfører øget udskillelse af farvestoffer i blodet).
- Hvis du har nedsat eller ingen saltsyreproduktion eller er i behandling med lægemidler som nedsætter saltsyreproduktionen i maven, kan optagelsen af Doxycyclin EuroPharma nedsættes.
- Hvis du lider af refluxesophagitis (øget reflux af ventrikelinhold op i spiserøret).
- Hvis du er i behandling for en seksuelt overførbart sygdom, idet Doxycyclin EuroPharma kan maskere eventuel syfilis.

Vær opmærksom på følgende:

- Ved brug af antibiotika kan der forekomme overvækst af andre typer bakterier i tarmen. Kontakt derfor lægen ved langvarig eller voldsom diarré (også op til 4 måneder efter behandlingen med antibiotika er afsluttet).
- Ved langtidsbehandling med Doxycyclin EuroPharma bør der regelmæssigt foretages laboratorieundersøgelser af blod, nyre- og leverfunktionen.
- Der er set tilfælde af spiserørsskader (betændelse samt sårdannelse), hvilket kan forebygges ved at undgå at indtage tabletterne i oprejst stilling med en rigelig mængde væske (vand, mindst 100 ml) og undgå at indtage tabletterne lige før sengetid.
- Hos nogle personer opstår øget lysfølsomhed, derfor bør direkte sollys samt ultraviolet lys (solarium) undgås. Lysfølsomheden kan vare op til 5 dage efter behandlingen er afsluttet.
- Der kan opstå forøget tryk inde i kraniet, hvilket kan vise sig ved synsforstyrrelser. Kontakt lægen hvis du oplever dette.

Børn og unge

Dette lægemiddel må normalt ikke gives til børn under 12 år, da det kan påvirke knoglevæksten hos børn, dannelsen af tænder samt medføre permanent misfarvning af tænderne hos børn. I visse alvorlige tilfælde kan det dog være nødvendigt at behandle børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Doxycyclin EuroPharma

- Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
- Tal med din læge, hvis du tager
- Blodfortyndende lægemidler (f.eks. warfarin).
 - Lægemidler eller fødevarer, der indeholder jern, aluminium, calcium eller magnesium f.eks. syreneutraliserende midler, jernpræparater og mælkeprodukter. Der bør gå så lang tid som muligt mellem indtagelse af Doxycyclin EuroPharma og denne type lægemidler eller fødevarer.
 - Lægemidler af gruppen barbiturater, som anvendes fortrinsvist til søvnproblemer, nervøsitet, angst og som epilepsimedicin.
 - Carbamazepin og phenytoin (epelepsimedicin).
 - Lægemidler der indeholder penicillin. Samtidig behandling med Doxycyclin EuroPharma kan nedsætte virkningen af penicillinholdige lægemidler.
 - P-piller. Effekten af p-piller kan være påvirket.
 - Lægemidler som indeholder methoxyluran.
 - Lægemidler som indeholder isotretionin eller andre retinoider (behandling af acne).

Brug af Doxycyclin EuroPharma sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Doxycyclin EuroPharma i forbindelse med et let måltid og sammen med en rigelig mængde væske. Doxycyclin EuroPharma må ikke tages sammen med mælkeprodukter, da det kan nedsætte virkningen af Doxycyclin EuroPharma. Der skal gå længst mulig tid mellem indtagelse af Doxycyclin EuroPharma og mælkeprodukter. Doxycyclin EuroPharma bør ikke tages med alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid., skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du bør ikke tage Doxycyclin EuroPharma, hvis du er gravid, medmindre lægen finder det absolut nødvendigt. Der kan være risiko for fosterskade (påvirkning af skelet og tandudvikling) eller leverudvikling hos moderen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Doxycyclin EuroPharma, da Doxycyclin EuroPharma går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Doxycyclin EuroPharma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtige informationer om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Doxycyclin EuroPharma

Doxycyclin EuroPharma indeholder ricinusolie, som kan give mavebesvær og diarré.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DOXYCYCLIN EUROPHARMA

Tag altid Doxycyclin EuroPharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tabletterne bør indtages i oprejst stilling (siddende eller stående) sammen med rigelig mængdevæske. Du må ikke tage tabletterne sammen med mælk. Tabletterne må ikke tages lige inden sengetid.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 200 mg det første døgn efterfulgt af 100 mg 1 gang dagligt.

Brug til børn

Doxycyclin EuroPharma må normalt ikke anvendes til børn under 12 år. Dog kan Doxycyclin EuroPharma anvendes til behandling af visse alvorlige sygdomme hos børn ned til 8 år.

Inhalationsinfektioner forårsaget af miltbrand

Voksne: 100 mg 2 gange dagligt i 60 dage.

Børn over 12 år som vejer mindre end 45 kg: 2,2 mg/kg legemsvægt 2 gange dagligt i 60 dage.

Børn over 12 år som vejer 45 kg eller mere: Samme dosis som voksne.

Behandling af tilbagefaldsfeber overført af flåter og lus (borellia recurrentis og borrelia duttonii)

Voksne: 100-200 mg som enkelt dosis afhængig af sværhedsgrad.
For at nedsætte risikoen for vedvarende eller opblussende feber anbefales det at behandle med 1 tablet hver 12. time i 7 dage.

Behandling af de tidlige stadier 1 og 2 af borreliose (borellia burgdorferi)

Voksne: 100 mg 2 gange dagligt i 10-60 dage, afhængig af symptomer og effekt af behandlingen.

Børn over 12 år: 1-2 mg/kg 2 gange dagligt (maksimalt 100 mg/dosis).

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis ved stærk nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Doxycyclin

EuroPharma tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Doxycyclin EuroPharma, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Doxycyclin EuroPharma

Hvis du har glemt en dosis Doxycyclin EuroPharma, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Doxycyclin EuroPharma

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer ændrer sig, efter behandlingen med Doxycyclin EuroPharma er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Doxycyclin EuroPharma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Alvorlig blodmangel med træthed og eventuelt med gulfarvning af huden. Kontakt læge eller skadestue.
- Usædvanlige blødninger fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaktisk shock, med bl.a. hurtig faldende blodtryk af åndenød. Pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Alvorlig hududslæt med betændelse, kraftig afskalning og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
- Betændelse i hjertesækken, som kan vise sig ved feber, brystsmerte, åndenød, hoste og hævede ben. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Kraftig og blodig diarré pga. betændelse i tarmen. Kontakt lægen.
- Nyreskader eller nyresvigt med smerter, mørkfarvet urin og ophør af urinproduktion. Kontakt lægen.
- Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Kvalme

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Hovedpine.
- Opkastning, diarré, tungebetændelse.
- Udslæt, herunder hudreaktioner, som følge af lysfølsomhed.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Forværring af bindevævslidelsen Systemisk Lupus Erythematosus (SLE).

- Serumsygdom, som kan vise sig ved overfølsomhedsreaktioner med utilpashed, feber, udslæt og smerter.
- Udstående fontaneller (bløde områder på hovedet) hos spædbørn og øget tryk i hovedet hos børn og voksne (intrakranielt hypertension). Forøget tryk i hovedet kan medføre synsforstyrrelser og permanent nedsættelse af synet.
- Påvirkning af leverens funktion, herunder leverbetændelse. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge eller skadestue.
- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
- Øget indhold af urinstof i blodet (kan ses ved blodprøver).
- Hævede fødder, ankler og hænder.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Nældefeber.
- Susen for ørerne (tinnitus).
- Tendens til rødmen.
- Mavesmerter, appetitmangel, synkebesvær, sure opstød, halsbrand.
- Mangel på appetit (anoreksi).
- Svien bag brystbenet, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret.
- Sår i spiserøret. Kontakt lægen.
- Udslæt med røde pletter (nældefeber) afskalning af huden, rødmen, skøre negle.
- Muskel- og ledsmerter.
- Svampeinfektion i kønsdele eller anus.
- Tarmkatar (betændelse i tarmens slimhinder), diarre med slimet konsistens. Kontakt lægen.
- Sort-brun mikroskopisk misfarvning af skjoldbruskkirtlen uden påvirkning af kirtlens funktion.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.
E-mail: sst@sst.dk
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar lægemidlet i original emballage, da det er følsomt for lys.

Opbevar ikke lægemidlet ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Doxycyclin EuroPharma 100 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Doxycyclin 100 mg som doxycyclinmonohydrat.
Øvrige indholdsstoffer: Cellulose, mikrokrySTALLinsk; silica, kolloid, vandfri; natriumstivelsesglycollat; povidon; ricinusolie, hydrogeneret; magnesiumstearat.

Pakningsstørrelser

Doxycyclin EuroPharma fås i pakningsstørrelser á 10, 20 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen	Ompakket og frigivet af
EuroPharmaDK	EuroPharmaDK
Oddesundvej 39	Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N.	6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk