

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

PROCTOSEDYL®

Suppositorier

Hydrocortison 5 mg, cinchocainhydrochlorid 5 mg,
framycetinsulfat 10 mg, aesculin 10 mg

72104-01-02

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Proctosedyl® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Proctosedyl®.
3. Sådan skal du bruge Proctosedyl®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

- Proctosedyl® er et middel til anvendelse i endetarmen.
- Proctosedyl® lindrer smerter, hævelse, brændende fornemmelse og kløe i forbindelse med hæmorider og rifter i endetarmsslimhinden.

Lægen kan have givet dig Proctosedyl® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Proctosedyl®

Brug ikke Proctosedyl®

- hvis du er overfølsom over for hydrocortison, cinchocainhydrochlorid, framycetinsulfat, aesculin, eller det øvrige indholdsstof.
- hvis du tidligere har reageret allergisk over for aminoglykosider, specielt neomycin.
- hvis du har en lokal infektion der er forårsaget af svampe, virus og bakterier.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Proctosedyl®

- hvis du anvender Proctosedyl® på skadet væv, da indholdsstofferne kan blive optaget i kroppen.
- Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Proctosedyl®. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun bruge Proctosedyl® efter aftale med lægen.

Amning:

- Du kan bruge Proctosedyl®, selvom du ammer. Et af indholdsstofferne går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Proctosedyl® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Proctosedyl®

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Du skal anvende Proctosedyl® 2-3 gange dagligt samt efter afføring. Bør kun anvendes i kortere periode. Varighed af behandlingen bør ikke overstige 2 uger.

Børn:

Børn under 15 år må kun få Proctosedyl® efter lægens anvisning.

Brug altid Proctosedyl® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brugsanvisning

Vask hænderne og tag suppositoriet ud af plastlommen.

Før suppositoriet ca. 3 cm ind i endetarmsåbningen.

Forbliv i ro i et par minutter og vask herefter hænder.

Du kan anvende Proctosedyl® suppositorier alene eller sammen med rektalsalve.

Hvis du har brugt for mange Proctosedyl®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Proctosedyl®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

Føleforstyrrelser ved endetarmsåbningen, svimmelhed, tinnitus, uklarhed, synsforstyrrelser, eksitation i form af rysten, forvirring, kramper, koma, nedsat vejrtrækning, lavt blodtryk, langsom puls, hjertestop.

Hvis du har glemt at bruge Proctosedyl®

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Proctosedyl®

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Proctosedyl® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Tynd slimhinde i endetarmen, som giver en brændende fornemmelse (ved langtidsbehandling mere end 4 uger).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Eksem, tynd hud og allergiske reaktioner (krydsallergi mellem framycetin og andre aminoglykosider).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

- Opbevar Proctosedyl® utilgængeligt for børn.
- Opbevar Proctosedyl® i køleskab (2-8 °C).
- Brug ikke Proctosedyl® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Proctosedyl® suppositorier indeholder:

Hydrocortison 5 mg, cinchocainhydrochlorid 5 mg, framycetinsulfat 10 mg, aesculin 10 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Hårdfedt.

Pakningsstørrelser:

Proctosedyl® suppositorier fås i pakninger med 12 og 48 suppositorier.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Proctosedyl® er et registreret varemærke, der tilhører Aventis Pharma S.A.



721040102

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700